McGill MSS M 13
Bd 23
IV, 104.
Lahire

memoires
de
mathematique
et
De Physique

Contenant

Qui appartiennent à Mr Bavommez

Un traité des Epycycloïdes, et de leurs usages dans les mechaniques.

L'explication des principaux effets de la glace et du froid.

Une dissertation des differences des sons de la corde de la trompette marine.

Un traité des differens accidens de la vüe. diuisé en deux parties.

Par Mr. de la hire de l'academie Royale des Sciences.

A Paris
De l'imprimerie Royale
M. DC. XCIV.

Preface.

Il n'y a aucune partie de mathematique qui soit d'un plus grand usage dans la vie que les mechaniques: mais tous les traitez qu'on en a donnez jusqu'á present, n'ayant examiné seulement ce qui en geometrique dans cette science, sans avoir aucun égard a l'execution, il ne faut pas s'etonner s'il a plus part des machines dont les livres sont remplis se trouvent inutiles, et ne peuvent pas etre mises en usage. La figure des dents, des roües semblóit de si peu de consequence, qu'on l'avoit toujours negligé comme une chose qui ne regardoit que la pratique et qui devoit etre entierement abandonné a louvrier, quoyque ce soit en effet ce qui devroit etre le plus soigneusement examiné; car les frottemens etant plus ou moins grands, a proportion que les dents des roües qui font l'effort dans les machines, s'ecartent plus ou moins de la figure qui leur convient, les machines composées de roües dentées n'ont presque jamais l'effet qu'on s'étoit imaginé quand on n'en considere point l'execution. pour surmonter les frottemens on a tres souvent besoin de forces beaucoups plus grandes que celles qui sont necessaires pour le mouvement de la machine même. et c'est a quoy l'on ne fait ordinairement aucune attention.

J'ay donc cru qu'il falloit examiner avec une tres grand soin, quelle devoit etre la figure des dents des roües, puisque ce n'est que par ces dents que les —

roües agissant lune sur lautre; et que cét par lun moyen quon peut menager la force mouuante pour en tirer tout lauantage possible.

Jl y a enuiron vingt ans que jáuois commencé a trauailler a cet ouurage, et jáuois determiné dune maniere tres simple, que les dents des roües deuoient auoir la figure dune cycloïde, qui a pour base vn cercle, ecque lón appelle epicycloide; jen conferay pour lors auec messieurs auzout, picard, et Mariotte; mais quelques tems apres, jayant été admis dans lacademie, je trouuay les quadratures des epicycloides, lam de lespace que de la ligne ala maniere des anciens, comme je les donne dans cet ouurage et je les communiquay a lacademie. M.r huigens fit voir aussi celles quil auoit trouué par vne maniere fort differentes de la mienne, et dans le meme tems M.r labbé de Vaumesle qui demeuroit en normandie menuoya le resultat de ce quil auoit fait sur le meme sujet, en ne marquant que jauois été par la meme methode de M.r descartes qui suppose des polygones au lieu de cercles.

Jáy cru que les demonstrations Geometriques des proprietez de ces lignes, meritoient detre données au public, puis quelles auroient des usages si considerables dans les mechaniques, et quil etoit a propos de faire connoitre quelles meditations les plus abstraites de la geometrie etoient souuent tres utile dans la vie. je náy donné que quelques exemples de lápplication quil faut faire de ces lignes courbes aux dents des roües: mais je les ay choisis de telle maniere quils peuuent seruir de modeles pour toutes sortes de rencontres. entre autres jáy rapporté la Construction

dune roue horizontale qui ser a eleuer de leau
aucun frottement considerable, puisque tout son effor
vient de sa pesanteur, et que le frottement du pivot
sur la crapaudine qui est le seul qui se rencontre
dans cette machine, nest pas considerable, quand la
roüe trauaille, a cause quelle est soutenüe par les
quilles des pistons des pompes quelle fait mouuoir. je
fit faire cette roüe dans le chateau de Beaubec a
huit lieües de paris, a la place dune autre semblable
qui y auoit été autrefois construite par mr. Desargües.
et qui etoit entierement ruinée, mais je nay point seu-
que cet excellent geometre eut jamais rien expliqué
de la construction, et comme il ne seroit pas appliqué
a cette partie de Geometrie, je croi quil en auoit
seulement determiné la figure mechaniquement.
Mrs. Auzout, et Mariotte a qui le seigneur de ce
chateau seroit adressé pour auoir le trait des dents ou
ondes de cette Roüe, me le renuoyerent pour en
prendre soin, ne doutant point apres ce que je leur
auois fait voir quelques tems auparauant sur ce sujet,
que je ne la fisse executer dans toute sa justesse.

Jay cru enfin que je pouuois inserer dans le
meme endroit, ce que jay trouué sur les propositions
de m.r Hehirnaus de la ligne qui est formé
par les rayons reflechis dans vn quart de Cercle,
comme je lay fait voir a lacademie au mois de juin
1686. puis que cette ligne etoit Epicycloide.

Pour ce qui regarde les effets de la glace et du
froid, il me semble que le systeme que jay pris pour
expliquer ce que jay pû remarquer de considerable

ce sujet, satisfait si bien a tout quon pourroit
dire quil seroit vray s'il en pouvoit avoir quelque
connoissance certaine de la physique.

Ce qui arrive aux differens sons de la corde de la
trompette marine, a été si bien expliqué par le R.P.
Deschalles dans son cours de mathematique que je
n'aurois rien eu a y ajouter, s'il avoit fait attention a
toutes les particularités qui se rencontrent dans ces sons.
les experiences particulieres sur le son que j'ay ajoutés
m'ont un peu écarté du systeme de M.r perrault,
comme on le pourra voir dans l'excellent traité qu'il a
composé sur cette matiere.

Je me suis fort étendu sur le traité de la vüe, car
c'est une connoissance qui n'est pas moins utile que
curieuse, puisqu'elle nous fait voir que plusieurs
accidens de la vüe n'ont rien qui soit dangereux dans
la suitte, et qu'il n'est pas besoin la plupart du tems
de recourir a des remedes qui pourroient d'ailleurs nuire
a la santé. on y trouvera un grand nombre d'observa-
tions nouvelles que j'ay taché d'expliquer par les loix
de l'optique; mais pour ne rien omettre de considerable sur
cette matiere, j'ay été obligé de rapporter aussy quelques remarques
qui sont deja connus et assez communes. en l'année 1684. j'avois
deja publié dans nos journaux plusieurs choses que j'explique
dans la 2.e partie de ce traité: mais pour rendre cet ouvrage
plus complet, j'ay crû que je devois joindre cette partie a la
premiere et que je devois en meme tems apporter quelques
eclaircissemens aux difficultés qui restoient a ceux qui avoient
embrassé mon systeme de la vision et satisfaire aussi par
meme moyen aux objections que quelques uns y avoient
faites, les quelles m'avoient semblé de trop peu de consequence
pour y repondre en particulier.

traité.

Traité
Des Epicycloides.
et de leur usage
dans Les Mechaniques

Definitions

Si le cercle A B D roule sur la ligne A b d de quelque cercle, le point D qui on [illegible] D du diametre A D, decrira dans son mouuement [illegible] D, H I K L M D, one appelle Epicycloide.

Le cercle A B D on appele aussi generateur de l'epicycloide A B D, et la base [illegible]

Le cercle generateur roule au dehors du cercle de la base, l'Epicycloide en [illegible] exterieure, mais si le cercle generateur roule au dedans du cercle, l'Epicycloide on appellee interieure.

L'espace compris par l'Epicycloide et par la base, on appellei Espace de l'Epicycloide.

Dimension
De l'espace de l'Epicycloide

Lemme I.

Soit le demy cercle A P P B dont le diametre est A B et le centre K, apres mene la ligne P P parallele a A B et [illegible] P P [illegible]

non voudra du diametre AB prolongé soit mené les lignes CP, Cp;

Je dis que la somme des lignes droites CA, CP en a la somme des lignes droites CB, CP. comme la difference des lignes droites CB Cp., en a la difference des lignes droites CA, CP.; ou bien ce qui en la même chose; le rectangle sous la somme des lignes CA, CP, et sous leur difference, en egal au rectangle sous la somme des lignes CB, Cp sous leur difference.

DEMONSTRATION.

On scait que la difference de deux quarrez en egale au rectangle qui en fait la somme et de la difference des cotez des quarrez: Cela pourquoy le quarré sous le coté CA qui en Ca moins le quarré sous le coté CP, qui en Cf aura le quarré sous le coté PH, sera égal au rectangle sous la somme, et sous la difference des cotez CA, CP.



De même, le quarré sous le coté cp. qui en Ci aura le quarré sous le coté hp. moins le quarré de CB, qui en Cb, en egal au rectangle sous la somme et sous la difference des lignes Cp. CB.

Maintenant a cause des lignes [illegible]

et les autres perpendiculaires au diamètre AB, il est évident que le rectangle fg ou f² e, qui est égal au rectangle AH, HB ou bien Ah, hB est égal au quarré de HP, ou hp, la différence des quarrés CA, CP sera donc égale au gnomon dfA moins le rectangle fa.

Je démontre de la même manière [illegible] quarrés CP, CB est égale au gnomon [illegible] fe,

mais le gnomon bh est égal [illegible] égal au rectangle dm, avec le rectangle [illegible] et encore avec le rectangle bh, égal [illegible] pourquoy tous les rectangles fe, df A H pris ensemble sont égaux à la différence [illegible] CB mais il est [illegible] que les quatre [illegible] font le gnomon dfA moins le [illegible] ce qui est aussi égal à la différence des quarrés de CA, CP, ainsi pourquoy la différence des quarrés de [illegible] CB est égal à la différence des quarrés de CA et de CP. donc le rectangle sous la somme et sous la différence des côtés CB, CP est égal au rectangle sous la somme et sous la différence des côtés CA CP ce qu'il falloit démontrer.

Si la ligne droite P p. touche le cercle en L alors les deux points p p. ne font qu'un même point L et on démontrera la même chose que cy devant à savoir que la différence des quarrés de CA et CL sera égale à la différence des quarrés de CL et de CB.

On suivant la même méthode on démontrera les mêmes choses si le point C est pris dehors du cercle sur le diamètre non prolongé.

ALB sur son diametre AB prolongés alors la difference des lignes CA, Cp sera la meme que la difference des lignes CA, CH qui est AH et de meme la difference des lignes C[illegible] B, sera aussi la meme que la difference des lignes C p. C p, ne sont que comme une seule ligne.

Lemme II.

Dans le triangle CAU, les lignes droites PX, PG, BM. AV. coupent des parties du coté CA, en sorte que la somme de CA et de CP, CB sa difference BP

les trois lignes, la difference PA des premiers.



Je dis que les trapezes Mp. AK sont egaux entreux.

A cause des paralleles a la base AV, la somme de CA, Cp est a la somme de Cp CB. comme la somme de AV, PX est a la somme de pG, BM; on pourquoy la somme de AU, et PX, sera a la somme de pG, BM, comme PB est a PA,

Mais des points P et B, ayant mené les perpendiculaires PF, Bf sur AU, et sur pG, et ayant prolongé les lignes AU, pG, soit fait Ux, egale a PX, a GM, egale a BM, pour lors si l'on mene les trapezes AX, lignes droites px, Bm, les triangles PAx, Bpm, seront egaux aux trapezes AX, pM, mais aussi Bp. est a PA, comme Bf a PF: et pourquoy Ax, est a pm comme Bf, a PF, et les triangles APx, pBm, [illegible]

proportionelles aleurs hauteurs, on aura donc aussi les
trapezes AX, pM, egaux entreeux, puisquils sont egaux
aux triangles egaux APx, pBm, ce quil fallait demontrer

Lemme III

Soit le demi cercle AVEB, [illegible] diametre AB [illegible]
prolongé ou non prolongé soit pris le point C
soit mene quelque ligne [illegible]
diametre AB,





clle aux points V, E du centre C, et pour demi diametres
CA, CV, CE, CB, soient [illegible] les arcs de cercle AF, VPG, EpH
BI. qui rencontrent aux points FGHI. quelque ligne
droite CF menée du centre C,

je dis que les quadrilateres mixtes AFGP, pHIB sont
Egaux entreeux.

Soit la ligne droite Af Egale a la ligne AF, qui fasse
auec le diametre CA langle droit CAf. ayant mene
Cf quon tire aussi les lignes droites Pg, ph, Bi paralleles
a Af.

Il est evident par la construction que le triangle
CAf est egal au secteur CAF semblablement le triangle
CPg est egal au secteur CPG, et pourquoy si des Egaux
CAf, CAF on en oste les Egaux CPg. CPG les restes seront
[illegible] le quadrilatere

cercle A P G F. on demontrera de la meme maniere, que le trapeze p h i B, est egal a sa figure mixte p H i B.

Mais par le premier lemme la somme des lignes droites C A, C P, est a la somme des droites C p C B, — somme de la difference de C p C B, qui est p B, est a la [illegible] P, qui est a A P, en sorte que [illegible] somme de le trapeze A f g P sera egal au [illegible] p h i B, et la figure mixte A F G P, p H i B, que [illegible] et ainsi aussi —

On demontrera aussi la meme chose, si au lieu d'une droite D F on prend le seul point L qui soit la rencontre de la touchante parallele au diametre A B.

Lemme IV.

Si la circonference [illegible] cercle A B D, est divisée en parties egales entrelles aux points E F G B H I &c. que le nombre de ces parties [illegible] soit infini et indefini que sur le diametre A D, prolongé ou non prolongé on prenne le point Y, duquel comme d'un centre on decrive des arcs de cercle dont les rayons soient les distances, Y A, Y E, Y F, Y G. &c. et que la longueur de l'arc A d, decrit par le point A, soit egale a la circonference du demy cercle A B D, et que cet arc A d, soit divisé en autant de parties egales entrelles aux points e f g h, qui y en a dans le demy cercle A B D, et enfin ayant mené les rayons du centre Y aux divisions e f g, b h, &c. on aura le quadrilatere mixte A D X d [illegible]

Lacs mixtes qui [illegible] proprietez

A Cause des divisions Egales du Cercle ou je
mene par les points des divisions droites
KE, IF, HG, &c. Lesquelles [illegible]
DA du Cercle, Car pourquoy
quadrilateres comme dyRk
sont etant Egalement [illegible]
qui sont Compris
entre eux a [illegible]





x X p t en egal au quadrilatere d 3 f K, ou bien A u 19 q
et ainsi des autres,

il en resulte de la que dans chaque jeu comme
y x q et p f K, les quadrilateres egalement eloignez des
mes comme x X d 3 u sont aussi egaux entr'eux ces
drilateres x X et d u sont egaux, les quadrilateres
y f sont aussi egaux par le lemme precedent;
quand on ote des plus grands on oste les moindres —
et les quadrilateres x X d 3 u seront
egaux, et ainsi des autres.

N° V

Les mesmes choses estant posées comme cy devant
dans les mesmes figures selon mene la ligne diag.
D L M N O d composé d'un nombre indefini de petites
lignes droites qui dans le quadrilatere A D X d diuisé
en deux diagonalement [illegible] quadrilateres
qui sont dans la diagonale depuis l'angle D jusques
d, ce qui paroit dans la figure par les lignes D L, L M,
M N N O &c.

je dis que le quadrilatere A D X d en diuisé en deux
egalement par la diagonale D O d,

je ne fais pas de difficulté de supposer icy que les
petites diagonales, qui sont des lignes droites, diuisent en
deux egalement leurs quadrilateres particuliers, et que la
difference qu'il y a entre la veritable diuision, et celle
qui ne sauroit etre considerable, puis qu'on la peut
toujours trouuer plus petite qu'aucune grandeur donnée
a cause que les quadrilateres petits diuisez sont [illegible]
indefiniment petits, ce qui en [illegible] deux de.

l'usage des indivisibles.

Maintenant par ce qui en demontré dans le lemme precedent, il en evident que le quadrilatere AL en egal au quadrilatere XR. semblablement le quadrilatere eM, en egal au quadrilatere qq; le quadrilatere fN au quadrilatere 5P, et ainsi des autres car nous q tous les quadrilateres ensemble d'un coté de la diago DLMNOP, &c. seront
de l'autre coté, mais la ligne DLNOPd qui divise diagonalement tous les petits quadrilateres qui sont dans le demi-cercle en faisant deux demi en deux
en quadrilateres, à une coté diagonale on peut considerer comme une ligne courbe, divise deux egalement tout le grand quadrilatere ADXd, qu'il falloit demontrer.

Lemme

Si l'on suppose que le point q qui est pris sur le diametre AD en infiniment eloigné du cercle ABD, on aura des lignes droites perpendiculaires au diametre AD, au lieu des arcs de cercle qui passoient par le point DKIHA. dont AD en sera une, qui en posée egale à la circonference du demy cercle ABD, et qui en divisé en autant de parties egales entr'elles que la circonference ABD, et enfin au lieu des quadrilateres mixtes comme cy devant, on aura des parallelogrammes, qui etant également eloignez des extremes seront egaux entr'eux, et il s'ensuivra auss que la diagonale qui divise diagonalement tous les

[illegible] ra [illegible] grand parall[illegible] [illegible] [illegible] [

E 10 sera en L parceque les distances 10 12, DL sont egales; et par raison le point 13, sera en M et ainsi des suittes.

Mais depuis lorque E 10 on placé en ea, et le point 11 au point L le point V du cercle A B D, sera lare 11 z: car le demy cercle 8 11 e Repre ED 10; comme lare 10 D on egal a lare DK, par le lorsque le point 10 par le mou au point 8, le point V dans lare IKL [illegible] le [illegible]

[illegible] point 13 dans lare mIM [illegible] Mil sera egal a lare ml

Proposition 1.

Dans les figures precedentes il faut demontrer que lespace de la moitié de lepicicloide A b d 17 16 15 D en egal a la moitié du quadrilatere A b d X D joint au demy cercle ABD.

Jay montré cy devant que la ligne DMOQd diuisoit le quadrilateré mixte A b d X D, en deux egalement, il reste donc a demontrer que lespace DLOQd. 17 16 15 D compris par la ligne DMOQd, et par la moitié de lepicycloide D — 15 16 17 d en egal au demy cercle generateur DBA.

Par la Construction tout le demy cercle generateur en diuisé en quadrilateres mixtes comme m1Hn, et en deux trilignes DKl, rEA. mais aussi lespace DMOQd 17 16 15 17 D en diuisés par les memes cercles decrys du centre 17 en autant de quadrilateres et de trilignes quil y en a dans le demy cercle Generateur, on sçait que les arcs de chaque cercle compris tant dans le cercle generateur que dans lespace

égaux entre eux comme sont M ch dans l'espace ch
égal a sont M I, dans le demy cercle, ce qui . conduit
pour la fo de la cycloide, lon pourra voir la
quadrilatere mixte, comme L ch M, dans l'espace
mixte L K I m, dans le demy
lon pourra se fort reconnoistre
mais chacun de ces quadrilateres
considerer
ce
espace entre cette courbe
dement .

Lemme

On se servira dans cette demonstration de la
supposé que le point y
base A D laquelle base est une
ce le quadrilatere A d x D
egal au demy cercle generateur A B D pris quelque fois
ce qui paroit par la generation, lon pourra voir l'espace
A b d x b ch D sera egal au demy cercle ce qui est egal
au demy cercle pris trois fois, la ligne d b D dans ce
cas est appellée cycloide ou trochoide, et quelquefois
roulette .

Proposition 12.

L'espace de la cycloide entiere est a son cercle
generateur comme trois fois le diametre du cercle qui est la
base avec deux fois le diametre du cercle generateur
au diametre du cercle de la meme .

Il est [illegible] son cercle

generateur comme trois fois le diametre du cer-
qui en la base moins deux fois le diametre du
cercle generateur au diametre [illegible] en la
base.

Demonstration pour la precedente
Extraordinaire

Dans les figures precedentes [illegible]
de cercle decrit [illegible] et que

[illegible] A L X [illegible]

[illegible] moyen
proportionnel arithmetique entre la base de la base A b d
[illegible] du sommet D X et en arc soit appelle Φ en pour la
[illegible] angle fait de l'angle Φ comme de ligne droite a du
diametre ~~du cercle~~ A D qui ~~sera~~ du cercle generateur
sera egal au quadrilatere mixte D A d X donc la moitie
de ce rectangle qui en fait de l'arc Φ a du demy —
diametre du cercle A D qui est A C, avec la moitie
du cercle generateur [illegible] — egal a la moitié de
l'epicycloide A b d et le [illegible] D par la precedente proposition

I. maintenant a cause des cercles concentriques et des —
semblables secteurs de cercle γ A est a γ C, comme le
demy base A b d de l'epicycloide — a l'arc Φ.

II. endivisant γ A est a γ C, moins γ A, ce qui est A C,
comme la demy base A b d de l'epicycloide a l'arc
Φ moins la demy base A b d.

III. En composant γ A plus C A est a C A, comme A b d —
plus l'arc + Φ a l'arc Φ moins A b d,
+ moins A b d, ce qui est le seul arc

IV En triplant les antecedens 3 γ A, plus 3 C A, sont a C A —
[illegible] Φ [illegible] A b d.

V [illegible] γ A [illegible] C A, plus C A comme

ſA plus ꝛ CA, ſont a CA comme ꝛ arcs Φ moins Φ plus
ABd, ſe qui eſt ꝛ arcs Φ plus ABd a arc Φ moins
ABd.

[illegible] me proportion en raiſon alterne

A arc Φ moins ABd comme γA a ABd.

VII Conſequemment γA plus ꝛ CA. ſont a γA comme

[illegible] derniers termes de cette

[illegible] ꝛ AD

[illegible] la circonference du premier cercle ADX

generateur car la baſe Abd eſt egale a la circonfe-
re demy cercle ce qui eſt egal a l'eſpace de l'Epi-
cycloide par les precedentes demonſtrations ; et le ſecond de ces
termes ſera egal au demy cercle generateur. Con-
ſequemment le demy diametre γA de la baſe de
l'epicycloide pris trois fois avec le diametre CA
du cercle generateur pris deux fois ſeront enſemble
au demy diametre γA du cercle de la baſe, comme
l'eſpace de la demy Epicycloide exterieure et au
demy cercle generateur. et enfin doublant les termes
de cette proportion le diametre γA, de la baſe de
l'Epicycloide pris trois fois avec le diametre CA, du
cercle generateur pris deux fois ſeront enſemble
au diametre du cercle de la baſe comme tout
l'eſpace de l'epicycloide exterieure a tout le cercle
generateur [illegible] ce qu'il falloit
demonſtrer.

demonstration pour
l'epicycloide jnte.

I A cause des semblables Secteurs de cercles yA est a yC comme la demy base AbD de la jnteriеure a lare Φ.

II. En diuisant yA est a yA moins yC comme [illegible] Comme [illegible] Φ

III. Diuisant encore, yA moins CA est a CA comme AbD moins AbD plus lare Φ ce qui est le Seul avec Φ a AbD moins lare Φ.

IV, Et en triplant les antecedens 3 yA moins 3 CA est a CA comme 3 ares Φ a AbD moins lare Φ.

V. en composant 3 yA moins 3 CA, plus CA ce qui se reduit a 3 yA moins 2 CA sont a CA comme 3 ares Φ plus AbD moins lare Φ, ce qui se reduit a deux ares Φ plus AbD a AbD moins lare Φ.

VI mais par la seconde proportion en raison alterne, yA est a AbD comme CA a AbD moins lare Φ.

VII Et pourquoy 3 yA moins 2 CA sont a yA comme a. ares Φ plus la demy base de l'epicycloide jnterieure a AbD.

Mais les deux derniers termes de cette Septieme proportion etant multiplié par le quart du diametre par le cercle Generateur, le premier terme sera egal a la moitie du quadrilatere AVXD avec le demi cercle generateur, ce qui est egal a la moitié de l'espace de l'epicycloide interieure: pour le dernier terme il est egal au demy [illegible] de generateur, ce qui se evident [illegible]

de l'spiroyeloide en lygale a la circonference du
cercle [illegible] si lon double dans tous les cas
de cette dernière proportion on aura le diametre
[illegible] du vase generateur pris deux fois, ou a dire vingt fois
[illegible] du cercle generateur pris deux
[illegible] du cercle de la base
[illegible] un cercle generateur

[illegible]

[illegible] ycloides.

des [illegible] spiroydes

[illegible].

Soient les cercles EBF, FH qui se touchent exterieurement en F ayant joint les centres KC, par la ligne droite EKC, qui passe par le point touchant F, de l'extremité E du diametre FE ayant mené quelque ligne droite EB, prolongé jusqué l'autre cercle en H,

je dis que l'arc FH en plus grand en longueur que l'arc FB.



ayant mené FG qui touche les deux cercles en F et du centre K par le point B soit prolongé KBG jusqua la [illegible] FG en G, [illegible] touchante BD et la corde HF.

Dans le Triangle Rectangle EFA les angles FEA
pris ensemble sont egaux avec [illegible] que
l'angle FAE en moindre [illegible]
de l'angle FEA.

Maintenant a cause de la touchante BD
l'angle GBD, ou droit
GBA egal a l'angle KBA
il restera l'angle ABD, egal a l'angle FAE
les angles DBA, DAB, dans le triangle DAB, sont egaux
entr'eux et le triangle DAB sera isocelle, et par
consequent les cotez DA, DB seront egaux entr'eux
~~celui-ci~~ mais aussi les touchantes DB —
DF sont egales, donc FA, sera toute seule egale aux
deux ensemble FD, BD.

Dans le triangle FAH l'angle FAH en
obtus etant le supplement de l'angle de la base
du triangle isocelle ABD, en pour quoy l'angle obtus
FAH etant le plus grand de ceux du triangle, le
cotté FH qui luy en oppose sera aussi le plus grand
dans la corde FH et plus grande que les deux
touchantes ensemble FD, BD mais l'arc FH et plus
grand que la corde FH et l'arc BF et plus petit que
les deux touchantes donc a plus forte raison
l'arc FH sera plus grand en longueur —
que l'arc FB qui sera [illegible]
[illegible]

Lemme 11

Soient les deux cercles EFB, FHI qui se touchent
K dehors de ces cercles soit mené
une KBI, les rencontrant tous deux en B et
FHI. en plus grand en
B.

Soit mené EBH, par l'extremité E du
diametre EF et par le point B laquelle EBH
rencontre le cercle FHI au point H qui sera
necessairement entre le point I, et le point touchant
F; par le lemme precedent l'arc FH sera plus que
l'arc FB, et a plus forte raison l'arc FHI qui en plus
grand que l'arc FH sera plus grand que l'arc FB ce
qu'il falloit demontrer.

Proposition 1.e

Probleme

Trouver la Touchante d'une Epicycloide Exterieure

Soit l'Epicycloide Exterieure AHM dont la base en
le cercle GA, decrit du centre C, que le cercle IHAD.
generateur de l'Epycicloide soit posé en telle maniere
que le point decrivant H soit sur l'Epycicloide dans
le point par lequel il faut mener la Touchante

si par le Centre C du cercle de la base et par le
Centre O du cercle generateur on [illegible] la ligne
droite CAOI et si par l'extremité [illegible] diametre
AI. on mene la ligne droite IH qui [illegible]
rencontre la ligne droite [illegible] IH toujours [illegible]
au point H.

Si la ligne droite IH ne touche pas l'epicycloide
au point H, elle la coupera de [illegible] point H
et elle la rencontrera encore en quelque autre
point au dessus et au dessous du point H; ou bien
si après la rencontre en H elle ne rencontre plus
l'epicycloide, etant prolongée elle rencontrera
necessairement la base GA.

Premierement qu'elle rencontre si on
possible l'epicycloide en un point F different
du point H, et que ce point F soit au dessous
du point H en allant vers la base par
rapport au point H.

Soit placé le cercle generateur
dans la position PFBK en sorte que le
le point decrivant l'epicycloide se
trouve au point F, du centre C,
et pour Rayon CF soit decrit le
cercle FLE rencontrant au point L
le cercle generateur dans sa premiere



position, ou le point derniere etoit en H. Deplus soit menée la ligne droite IL. et du point P, qui est l'extremité du diametre PB qui etant prolongé passe par le centre C de la base, soit aussi mene PF, enfin du point I. soit mené la ligne droite IB, qui rencontre le cercle IHA, en Q.

La ligne IF rencontrera le diametre PBC au point X et l'angle PXI, exterieur du triangle PXF sera egal aux deux interieurs PFX, ou PFI, et FPX, ou FPC; mais aussi l'angle PXI en egal aux deux angles internes XIC, ou FIC, et ICX, ou ICP du triangle IXC, en pourquoy les deux angles PFI, FPC, sont ensemble egaux aux deux angles FIC, ICP pris ensemble. mais si de ces sommes egales on oste les angles FPC, LIC, qui sont egaux par la construction aux arcs FB et LA, qui sont egaux; il restera d'un coté l'angle PFI, qui sera egal aux deux angles ICP et FIL qui sont le reste de l'autre coté.

Par le lemme premier l'arc CA en plus petit en longueur que l'arc AB, en pourquoy l'arc

QA en auñ moindre que larc LH egala AB par la generation de l'epicycloide ; l'angle AIQ ou AIB ou BIC sera donc moindre que l'angle LIH ou FIL ; car ils sont au meme cercle ; C'est pourquoy les angles ICP, et FIL ensemble ou bien que le seul angle PFI.

MAINTENANT du poinct K ou la ligne droite IH rencontre le cercle PFB ayant mené KB l'angle KBP sera egal a l'angle KFP ou IFP puis qu'ils sont a la meme portion de cercle ; mais en angle KBP en moindre que l'angle IBP, car la rencontre K de la ligne droite IF auec le cercle PFB sera plus proche du poinct P, que la rencontre de la ligne droite IB. mais cet angle IBP etant exterieur au triangle IBC, il sera egal aux deux angles interieurs pris ensemble BIC, ICB ou ICP, j'ai pourquoy les deux angles BIC, ICP, seront plus grands que l'angle PFI, ce qui en absurde ; car on vient de demontrer que ces memes angles BIC, ICP ensemble etoient plus petits que le meme angle PFI ; il n'en donc pas possible que la ligne droite IH rencontre l'epicycloide en un poinct F au dessous de H.

A cette la meme demonstration pour la cycloide car par le premier lemme il s'ensuit que la portion AQ du cercle generateur est moindre que la portion

AB de la ligne droite qui en la base de la cycloide;
ce qui n'paroit dans la figure du lemme. ou
l'arc BF est moindre que la portion FA de la
toute entiere en F.

Semblablement que la ligne IH rencontre encore
la Epicycloide en un point F
au dessus de H.

Soit donc le cercle generateur dans la position
PFB ou le point decrivant soit en F. mais du centre
C ayant decrit l'arc FL qui coupe en L le cercle
generateur AHI qui en dans la
position ou le point decrivant
H en fait l'Epicycloide, il en evident
par la generation que l'arc LH doit
estre egal en longueur a l'arc AB
de la base.



Maintenant ayant mené IL en
PF, PQ & ZB, l'angle FXA exterieur
au triangle IXF sera egal
aux deux interieurs ensemble ~~FIC~~, FIA, PFI; semblablement, le meme angle FXA exterieur du triangle
CPX, en egal aux deux interieurs ensemble FPC, ACB,
ou PCI; dont la somme des angles FIA, PFI, en
egale la somme des angles FPC, ACB, ou PCI, -
Car pourquoy si a ces sommes egales l'on ajoute
l'angle commun LIF; les sommes seront encore egales

a sauvoir les trois angles ensemble FIA. LIF. PFI. et les trois ensemble FPC, LIF, ACB. mais langle FIA auec langle LIF seront egaux a langle LIA, ou a langle FPC; qui en egal a LIA, a cause quils sont aux memes positions de cercles egaux, LA, FB,: en pleus pourquoy langle LIA, auec langle PFI, sont egaux aux angles FPC, LIF, ACB, enfin si de ces sommes egales on en oste les angles egaux LIA, FPC, il restera le seul angle PFI, egal aux deux ensemble LIF, ACB;

Langle ZQP en egal a langle ZFP ou PFI, a cause que ces deux angles sappuyent sur la base commune PZ et qui sera toujours vray quand meme le point Z tomberoit au point F. Cest a dire si IF touchoit le cercle PFB, au point F ou si bien supposoit que Z fut au dessous de F cest pourquoy langle ZQP, en egal aux angles ensemble LIF ou LIH, et ACB.

Mais pour la generation de lepicycloide le barre AB en egal en longueur a la barre LH et pour le second lemme la barre BQ, en plus grand que la barre AB, cest pourquoy la barre BQ est plus grand que la barre LH et par consequent langle QPB est plus grand que langle LIH, ou LIF dont langle ZQP, qui en egal aux deux angles ensemble

LIF, ACB ; comme je lay demontré cy deuant
sera moindre que les deux angles EPB ou
EPC, + ACB : PCE.

Mais aussi dans le Triangle PEC langle
externe PEI est egal aux deux interieurs CPE,
PCE ou PCI, et langle ZEP est toujours plus
grand que PEI, Comparant donc langle ZEP. au plus
grand que les deux angles ensemble : CPE, PCE, ce
qui est absurde ; car jay montré cy deuant que le
mesme angle ZEP estoit moindre que les mesmes
angles CPE, PCE donc la ligne droite IH ne rencontrera
pas l'Epicycloide en un autre point comme F au
dessus de H.

Ce sera la mesme demonstration pour la
cycloide en considerant seulement que la position
AB de la base qui est une ligne droite est plus petite
que larc BE du cercle generateur.

Il reste donc seulement a demontrer que la ligne
droite IH apres sa rencontre H auec l'epicycloide ne
peut passer au dessus, et etant prolongé en rencontre
la base MA ; mais quelle la rencontre s'il est possible
en N. par la generation de l'epicycloide larc AM de
la base est en longueur a larc AH du cercle
generateur ; mais par le premier l'estant larc
AN du cercle de la base sera plus grand que

longueur que larc AH ou que son egal larc AM,
ce qui est absurde, car il nen est que pareille, cest pourquoy
la ligne IH ne rencontrera que la base au dedans
de lepicycloide par quel fallait demontrer.

[illegible]

THEME III.

Soient les deux cercles FAE, FRD, qui se touchent
en F, ayent leur convexités du meme costé, et que
le centre C du cercle FRD, soit hors le diametre
FE du cercle FAE. de lextremité F du diametre
FE ayant mené la ligne droite FAD qui
rencontre le cercle FAE au point A et le cercle
FRD au point D.

je dis que larc FRD est plus grand en
longueur que larc FA.

Du point E pour centre et pour rayon EF
egal au diametre du cercle EAF soit decrit le cercle
FB rencontrant la ligne droite FD en B lequel
touchera aussi les deux autres cercles dans
leur point touchant F. on scait que larc
FB est la moitié de larc FA, car langle FEB
est au centre dans lun et larc sur lautre il en
a la circonference, mais larc FA qui en

double de l'arc FB en dans un
cercle [illegible] l'autre en seulement
la moitié de l'arc, en pourquoy
si les arcs FA et FB sont en longueurs
égaux entr'eux



Soient B ayant mené BR qui
touche le cercle BF en B, et du point
R ou elle touchante rencontre le cercle
FD ayant mené la corde RD, RD sera plus
grande que la touchante BR puis que RD en
l'hypotenuse du triangle rectangle RBD. mais l'arc-
FRD en plus grand que l'arc FR avec la corde RD
et l'arc FR avec la corde RD en plus grand que
l'arc FR avec la touchante RB qui sont aussi
ensemble plus grands que l'arc FB ou que son
égal FA c'est pourquoy l'arc FD en beaucoup plus
grand que l'arc ~~EA~~ FA ce qu'il falloit demontrer.

Lemme IV.

Soient les deux cercles FS, FR qui se touchent
en F et qui ayent les parties convexes du même costé
et que le centre C du plus grand soit sur le diametre
prolongé du plus petit. si du centre C on mene la ligne
CRD qui coupe les deux cercles en R et en D.

Je dis que l'arc FR du plus petit en plus grand

en longueur que larc FD du plus grand.

Dans tout triangle comme CKR
on voit que la raison du côté



Cercle FD en au cercle FR ainsi larc FS a larc
FR a cause des angles égaux FCS, FKR : donc
en raison égale larc FS est a larc FR comme

donnée de l'arc F B on dans un
cercle [illegible] on seulement
la moitié de l'arc, en pourquoy



CRD qui coupe [illegible]

Je dis que l'arc FR du plus petit ou plus grand

en longueur que larc FD du plus grand.

Item un triangle comme CKR on scait que la raison du coté RK au coté CK plus grand que RK, est plus grande que la raison de l'angle KCR ou FCD a langle CRK. car les cotez des triangles sont entre eux comme les sinus des angles opposez aux cotez: mais un moindre sinus a plus grande raison a un plus grand sinus que langle reponant au petit sinus: Et pourquoy en composant la raison du coté RK ou FK a FK plus KC en adire a FC en plus grande que la raison de langle FCD a langle FCD plus langle CRK en adire a langle FKR.



Mais comme FK est a FC ainsi tout le cercle FR est a tout le cercle FD Et pourquoy la raison de tout le cercle FR a tout le cercle FD est plus grande que la raison de langle FCD ou de larc FD a l'angle FKR ou FCS. ou a larc FS car je suppose que CS est parallele a KR.

C'est pourquoy il faudroit prendre larc FQ plus grand que larc FD pour faire que la raison de cet arc FQ a larc FS fut semblable a celle de tout le cercle FR a tout le cercle FD mais comme le cercle FD est au cercle FR ainsi larc FS a larc FR a cause des angles egaux FCS, FKR: donc en raison egale larc FS est a larc FR comme

Car FS a car FQ, FR sera donc egale a FQ qui
est plus grande que FD donc aussi FR sera plus grande
que FD ce qui fallois Demontrer.

Proposition II.

Trouuer la touchante d'une
epicycloide ordinaire.
quelconque.

Or il y a trois Especes d'epicycloides interieures: la
premiere lors que le demi diametre du cercle generateur
est moindre que le demi diametre du cercle qui'on
en la base; la seconde lorsqu'il luy est egal; et
la troisieme lorsqu'il est plus grand. Or je montreray
a la fin de la Dimension des Epicycloides quentre les
interieures, celles qui sont de la premiere et
de la troisieme espece sont les memes
Car celle qui a le diametre de son cercle
generateur moindre le demy diametre du
cercle de la base, est la meme que celle qui
a au contraire le diametre du cercle de son
cercle generateur plus grand que le demy
diametre du cercle de la base, si le cercle de
la base est le meme, et que le cercle generateur
de cette derniere ait son diametre egal
a la difference qui est entre le diametre de la

[illegible] et le diametre du cercle generateur [illegible]
mineé : car pour quoy je prendray seulement icy
[illegible] doit le diametre du cercle
[illegible] que le demy diametre
du cercle de la base.

Pour ce qui est de la seconde Espece
des Epicycloides interieures et non ordinaire
droite egale au diametre du cercle de la
base ce que je demonstreray dans la suitte.

Soit l'Epicycloide interieure MH dont
la base est le cercle ABM qui a son centre en
C et que le cercle IHA [illegible] l'Epicy-
cloide soit placé de telle sorte sur la base que le
point generant H [illegible] Epicycloide
du centre C de la base ayant mené le rayon
CA j'engage point touchant A du cercle generateur
avec la base, lequel passera aussi par le
centre du cercle

Je dis que la ligne droite IH menée de
l'extremité I du diametre du cercle generateur
au point generant H touchera l'epicycloide
en ce meme point H.

Si IH ne touche pas
l'Epicycloide en H elle la
ren[illegible] a
[illegible] H [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
ejera la rencontre H
[illegible] [illegible]
ment [illegible] ABM.



Premierement que
la ligne IH rencontre
encore l'Epicycloide au point F au dessous
de H.

Soit placé le cercle generateur dans la position
PFB, dont [illegible] le point qui decrit l'epicycloide soit
au point F; et que dans cette position du cercle
generateur son diametre soit PB, qui etant prolongé
doit passer par le point C de la ligne B —
on le point touchant du cercle generateur et de
celuy de la base.

Du centre C et pour rayon CF soit decrit
l'arc de cercle FL qui rencontre en L le cercle
generateur ALHI, la ligne LH du cercle generateur
sera donc egal en longueur a la ligne AB du cercle
de la base par la description de l'Epicycloide
Enfin soit mené les lignes droites PF, IL, IB, et

le point Z, où la ligne droite 1H rencontre le
côté opposé PFB, soit mené B

L'angle CX1 extérieur du triangle PFX est égal
aux angles intérieurs pris ensemble PF1. FPB. Semblablement le même angle CX1. qui est aussi extérieur
du triangle 1BX. est égal aux deux intérieurs
ensemble CB1., B1F. et pourquoy les angles PF1
FPB [illegible] CB1 B1F,
ensemble, et à chacune, ajoutant à chacune la
langle B1A les trois angles ensemble PF1,
FPB, B1A seront égaux aux trois angles ensemble.
CB1, B1F, B1A, mais les deux angles B1F, B1A,
ensemble sont égaux aux deux angles ensemble
L1F, L1A, donc les trois angles ensemble PF1,
FPB, B1A, sont égaux aux trois angles ensemble
CB1, L1F, L1A.

De plus, par la contradiction l'angle L1A
est égal à l'angle FPB pourquoy etant otez
des deux [illegible], il restera les deux angles
ensemble PF1 F14 égaux aux deux angles
ensemble CB1, L1F.

Enfin l'angle B1A, exterieur du triangle
CB1, sera égal aux deux interieurs ensemble
ACB, CB1, et pourquoy les trois angles ensemble
PF1, ACB, CB1; seront égaux aux deux angles
ensemble CB1, L1F, et ayant osté le commun

CBI, de chaque somme, les deux angles ensemble PFI, ACB, seront egaux a langle seul LIF ou LIH

J'ay demontré dans le 16me theoreme que lare [illegible] AB qui [illegible] AIC [illegible] LIH.

[illegible] AIB exterieur des [illegible] CB [illegible] egal aux deux interieurs ensemble ACB; CBI, il sensuit que les angles ensemble ACB, CBI sont moindres que langle LIH.

Or, si les [illegible] PBZ. est moindre que langle PBI, ou CBI, donc la somme des deux angles PBZ ACB en sera moindre aussi que langle LIH mais langle PBZ est egal a langle PFZ ou PFI, et pourquoy la somme des angles PFI, ACB en moindre que langle LIH ce qui est absurde: car je viens de demontrer que cette meme somme est egal a langle LIH il n'est donc pas possible, que la ligne droite IH rencontre encore la circonference en un autre point F au dessous de H.

Voyons maintenant si cette meme ligne IH ne peut rencontrer en un point F au dessus du point H; s'il etoit ainsi soit comme dans le cas precedent le cercle generateur dans les deux differentes positions en AHI, et en BFP [illegible]

[illegible] ainſi l'arc AH ſera égal à l'arc AF, & ſi du centre C, & par le point F on mene l'arc FL qui rencontre en L l'arc AHI l'arc IL ſera égal à l'arc PF. enſuite on menera les lignes [illegible] IL PF, PI [illegible] IH [illegible] FP

L'angle exterieur CXP du triangle IFX eſt égal aux deux interieurs enſemble AIF, PFI. ſemblablement le même angle CXP exterieur du triangle APX eſt égal aux deux interieurs enſemble FPA, PAC. Dont pourquoy les angles AIF, PFI, enſemble ſont égaux aux deux angles enſemble FPA, PAC. mais ſi l'on ajoute à chaque ſomme les deux angles FIL, ACB, on fera encore des ſommes égales AIF, PFI, FIL, ACB, & FPA, PAC, FIL, ACB, mais la premiere ſomme ſe reduit aux trois angles AIL, PFI, ACB, & la ſeconde aux trois FIL, FPA, APB. car l'angle APB exterieur du triangle ACP eſt égal aux deux interieurs PAC, ACB. de plus les deux angles, FPA, APB, enſemble ſont égaux à l'angle FPB, or l'angle FPB, eſt égal à l'angle LIA. par la conſtruction; dont pourquoy les angles enſemble AIL, PFI, ACB, ſont égaux aux angles enſemble FIL, FPB. & ayant



ôté de chaque coté les angles egaux FPB, LIA, il
restera d'un coté les deux angles ensemble PFI, ACB qui
seront egal a l'angle FIL.

Le [illegible] le cercle generateur
PFI [illegible]
encore en Z au dessus ou au dessous de F, mais
dans tous les cas l'angle ZQP qui en egal a l'angle
ZFP ou PFI, est plus grand que l'angle PQC,
puisque les Intersections P et I des Diametres
sont differens entr'eux?

Mais l'angle PQC moindre que l'angle
PQZ etant joint avec l'angle PCQ ou ACB en
egal a l'angle BPQ exterieur du triangle PCQ -
donc la somme des angles BCQ, ou ACB, et PQZ -
ou PFI, sera plus grande que l'angle BPQ.

Mais aussi par le Lemme IV. l'arc BQ en
plus grand en longueur que l'arc AB de la base
qui doit etre egal a l'arc HL par la Construction
de l'epicycloide, et pourquoy l'angle BPQ en plus
grand que l'angle FIL, ou HIL; puisqu'il en appuyé
sur l'arc BQ plus grand que l'arc HL du meme
cercle generateur. il s'ensuit donc que la somme
des angles ACB, PFI, sera beaucoup plus grande
que l'angle HIL ou FIL ce qui en absurde, car

viens de demontrer que cette meme somme y etoit egale. la ligne droite IH ne rencontrera donc pas l'epicycloide au point F au dessus de H.

Enfin que la ligne droite IH ajoute la rencontre avec l'epicycloide en H puis en dessus la quitte et quitte en rencontre la base circulaire au point N [illegible] de la base [illegible] de l'epicycloide.

Car la somme III puisque IH en prolongeant vers le cercle AB en N fait AN de la base sera plus grand en longueur que la ligne AH, ce qui est absurde car la ligne AM qui est plus grand que la ligne AN doit etre egal a la ligne AH par la generation de l'epicycloide. et en tout ce qu'il falloit demontrer

Corollaire

On tire de cette proposition la methode de mener une touchante par un point donné comme D sur l'epicycloide, ayant du point C pour centre, qui en aussi le centre du cercle de la base, et pour rayon CD soit decrit la ligne DEF qui rencontre en E la circonference du cercle generateur AEB en quelque position [illegible]



et son diametre AB au point F, du point D ayant
tiré DG egal à EF soit mené la ligne CG qui
rencontre la base de l'epicycloide en H et ayant
fait HI egale au diametre AB du cercle generateur
la ligne ID sera la touchante cherchée. Car il
[illegible] par HI comme diametre du cercle
[illegible] ce cercle passera par le point
D donné.

Ce que j'ay dit de l'epicycloide, se doit aussi
entendre de la cycloide.

Lemme V.

Soit le demy cercle STAR dont le diametre
est SR et la circonference soit diuisée en tel
nombre de parties egales quon voudra, mais que ce
nombre soit pair, des points de diuision ayant mené
des perpendiculaires au diametre SR et des tangentes comme
TB qui soient terminées aux perpendiculaires les plus
proches qui sont au dessous.

Je dis que la somme des touchantes comme TB
sans compter la premiere qui est infinie, etant menée
par le point S et la derniere, sera plus grande que
la circonference du demy cercle sans y comprendre
le premier et le dernier avec de la diuision.

La touchante AM au point A est terminée en M et la


S
M
T
X
A
B
C
V
G
t
m
R

les touchantes XA et XT ensemble sont plus grandes
que l'are TA sont la somme des quatre lignes AX, TX,
BX, XM; ou les deux TB, AM qui leur sont egales sont
plus grandes que le double de l'are TA en quel sallon

Lemme VI.

Le meme etant donné comme dans le lemme
precedent, il faut demontrer que si les diuisions du cercle
sont indefiniment petites, la somme des touchantes coupés
comme cy deuant, sans auoir egard a la premiere et
a la derniere; ne differera pas sensiblement de la
circonference [illegible] sans y comprendre la
premiere et la derniere arc de diuision.

Car le lemme precedent les touchantes AM et TB.
sont ensemble plus grandes que le double de l'are
THA. par le point H qui coupe en deux egalement
l'are TA ayant mene LHE parallele a TM et
AB et KHI parallele a la corde; TA se touchante
en H il faut montrer que la difference entre la
somme de AM et TB et entre le double de l'are
THA est plus grande que le double de la difference
entre les quatre touchantes TE, HI, HK, AD, et entre
le double de la meme are THA; et cela etant
il sensuit que en diuisant toujours les arcs en
deux on aura toujours la somme des [illegible]



=proposé icy qui ne sera pas
sensiblement different de la
circonference du cercle puisque

que quelque petite
grandeur qu'on le soit.
Par la construction l'angle
XAB

donc dans le triangle XAB le coté XB sera plus
grand que XA ; mais DE est parallele a AB, donc
XD est a XE comme XA a XB et par consequent
EB sera aussi plus grande que DA.

Semblablement par la construction les cordes
AH, TH sont egales, donc le triangle HAT est
isocelle, mais HL parallele a AB ne tend pas au
centre du cercle, mais elle passe au dessus, l'angle
LA en plus grande que LT, et la ligne LE etant
parallele a AB, on aura TL a TE comme LA
a EB donc aussi EB sera plus grande que TE a
puisque LA en plus grande que LT, et de meme
a cause des parallels TM, LD, on aura AD plus
grande que DM car AL en plus grande que LT.

A cause des parallels TM, AB, LE on aura
BE a TE comme AD a DM, mais BE en plus
grande que TE et TE en plus grande que AD.

[illegible] TE [illegible] que TX ou AX [illegible]
egale [illegible] [illegible] de [illegible]
de AI [illegible] [illegible] IM, [illegible]

[illegible] BE, TE, AD, DM, & DM
[illegible], la [illegible] de ces extremes
BE, & DM, sera plus grande que la somme
[illegible] TE, AD,

Maintenant si de la somme de TB & AM,
on ote la somme de TE, AD, & TA, ou KI, il
restera BE & DM, moins TA ou KI, mais si de
la somme de TE, AD, & TA, on ote a TA ;
il restera TE AD moins TA,

mais aussi si aux deux restes BE & DM,
moins TA, & TE, AD moins TA on ajoute
la meme quantité TA, ces deux sommes a
sauoir BE, DM, & TE, AD auront encore entre-
eux la meme difference qu'ils auoient
auparauant.

Mais j'ay montré cy deuant que la
somme BE, DM, etoit plus grande que la
somme TE, AD, Ce pour quoy si de ces
sommes on ote la meme quantité TA, il reste
celle plus grande qui est BE, DM, moins TA,

sera plus grand que la reste de la plus petite
TE, AD moins TA.

[illegible]

car [illegible] TB, AM [illegible] TA
et 2 TA, la difference de la premiere a la
seconde qui est BE, DM, moins TA est plus grande
que la difference de la seconde a la troisieme
qui est TE, AD moins TA; il s'ensuit que la difference
de la premiere a la troisieme est plus grande que le
double de la difference de la seconde a la troisieme
ce qui est TB, AM, moins 2 TA, plus grande que le
double TE, AD, moins TA.

Mais la difference entre les quatre touchantes
TE, AD, HK, HI, et 2 TA, etant la meme que celle
qui est entre les deux TE, AD, et TA, car HK et HI,
sont ensemble egale a TA, il s'ensuit que TB,
AM, moins 2 TA, ou bien la difference qui est entre
TB, AM, et 2 TA sera plus grande que le double
de la difference qui est entre les quatre touchantes
TE, HK, AD, HI, et 2 TA.

Mais TB et AM ensemble sont plus grandes que
les quatre ensemble TE, HK, AD, HI; car si l'on ote
de ces deux sommes les quantités TE AD il restera
de la premiere BE, DM et de la seconde HK, HI, ou

la seule XI ou TA. mais TA est plus petite que les deux egales ensemble. TX AX dans le triangle TAX et TX et AX ensemble sont encore plus petites que TE et AD ensemble, car XE est plus grande que XD — puisque EB est plus grande que AD comme je le dis

Il s'ensuit donc que si les deux plus grandes qui sont les deux TB et AM, on ote deux fois l'arc THA, et si les ~~deux~~ plus petites qui sont les quatre TE, HK, HI, AD, on ote aussi deux fois le meme arc THA, ou quatre fois l'arc TH qui est encore plus petit que les quatre touchantes par le lemme precedent, la difference entre la somme TB, AM, et deux fois l'arc THA: donc la difference entre la somme des deux touchantes sera beaucoup plus grande que la difference entre la somme des quatre TE HK, HI, AD, et deux fois le meme arc THA: donc la difference entre la somme des deux touchantes TB, AM, et deux fois l'arc THA sera plus grande que le double de la difference entre les quatre touchantes TE, HK, HI, AD, et deux fois l'arc THA ou quatre fois l'arc TH.

Mais comme en diuisant toujours les arcs en deux on trouuera que la difference entre les deux touchantes et les arcs est plus grande que le double de la suiuante, il s'ensuit que on pourra

proposer de quantité qui soit moindre que la différence entre les tangentes coupées suivant la methode que je propose icy, et la circonference de cercle, car pour ce qui est de la premiere et de la derniere division, elles ne sont rien dans les grandes petites. et pourquoy la somme des retranchés par cette methode peut etre egale a la circonference du demy cercle. ce qu'il falloit demontrer.

Lemme VII.

Les mesmes choses etant posées comme cy-devant, il faut demontrer que la somme des parties comme AB, qui sont retranchés des perpendiculaires au diametre du cercle, entre la circonference A et la rencontre B de la touchante superieure TB qui en est la plus proche peut etre trouvé moindre que aucune petite quantité proposé que ce soit, et par consequent, les points comme B peuvent etre considerez comme sur la circonference du cercle.

Dans le lemme precedent, j'ay demontré que BE etoit plus grande que TE et que AD estoit plus grande que DM il faut demontrer maintenant que la somme des portions

HE, AI, DE, TK, des perpendiculaires au



diamètre du cercle, — Soyent les [illegible] menées — par les touchantes, TE, HI, AD, HK en moindre que la moitié de la somme des portions AB, TM, qui sont faites par les deux touchantes TB, AM,

Ayant divisé la corde AT en deux également en F, soit mené FR, parallele a AB qui rencontre les touchantes TB, AM, en R et en G, et des points — RG ayant mené RO, GN parallèles a AT ou a IK, EO sera plus grande que DN, parceque TB est inclinée a AB que AM, comme il a été demontré cy devant, c'est pourquoy si l'on ote de LO, egale a FR la quantité EO plus grande que ND, et ayant ajoûté a LN ou a FG la quantité ND, la somme LE, LD, sera moindre que la somme FR, FG c'est pourquoy LE, LD, ensemble sont moindres que la moitié de AB, TM ensemble lesquelles moitié sont egales a FR, FG, a cause que FR coupe en deux également TA et qu'elle est parallele a AB.

Mais LE, LD sont ensemble egales aux quatre

lignes droites HE, AI, ou LH : et HD, TK ou LH : Et pourquoy les quatres lignes droites HE, AI, HD, TK sont ensemble moindres que la moitié des — deux lignes droites ensemble. AB TM ce qu'il falloit demontrer.

Et comme on diuisant toujours les arcs en deux egalement, on demontrera la même chose : il s'ensuit que la somme des parties des perpendiculaires entre la circonference du cercle et les tangentes, pourra estre trouuée plus petite quelconque quantité proposée : et par consequent les rencontres comme B des touchantes et des perpendiculaires peuuent estre considerées comme estant sur la circonference du cercle dans les diuisions indefiniment petites.

Lemme VIII.

Dans le cercle DHB dont le centre est C, et dela touchante DA en D terminée au rayon CBA prolongé : ayant diuisé en deux egalement l'arc DB en H et ayant mené CHG terminée a la touchante DA.

Je dis que le double dela touchante DG ou ce qui est la mesme chose les deux touchantes ensemble DG, HR, aux points D et H, et terminées aux rayons CG, CA sont plus grandes que l'arc

DHB; mais que la difference de ces memes touchantes
a l'are DHB sera moindre que la moitié de la
difference entre la touchante DA et le meme are
DI.

VIII. Comme dans la section continüe des
ares, on demontrera toujours la meme chose
il suffit quon pourra trouver une somme des
[illegible] terminées aux rayons qui passent par
les points touchants des finissantes, laquelle aura
une difference a la circonference du demy cercle
moindre; que quelque quantité proposée, et par
consequent les touchantes puissent etre considerez
comme les ares du cercle dans la derniere
indefinimente petite.

Cette proposition a été supposée par plusieurs
Geometres mais comme je me suis proposé dans
ce traité de ne rien avancer sans etre demontré
geometriquement, j'ay crû que je la devois
expliquer aussi exactement que les precedentes.

Soit en premierement donné que la
touchante DA en plus grande que son are
DHB; lors la touchante BG en B rencontrera
la touchante DA en A, et elle sera perpendiculaire
en B au rayon CB, car pour quoy dans le triangle
rectangle GBA l'hypotenuse GA etant plus

grande que le coté GB; DA sera aussi plus grande que les deux touchantes ensemble DG, GB, qui sont plus grande que lare ~~DHB~~. CHB; Et pourquoy la toute lare DA sera plus grande que lare DHB.

Maintenant si nous la rencontre E du rayon CH de la corde DB on mene la perpendiculaire EI sur DA, et EF prallele a CBA; les angles IEG, GEF seront egaux entr'eux et aux angles DCG, GCA.

Mais si du centre D on decrit lare EO donc le rayon soit DE, DO ou DE sera plus grande que DI donc GO sera moindre que GI; mais GI,



en moindre que GF a cause des angles Egaux GEF, GEI, et que langle GIE en droit, Et pourquoy le double de GO, ce qui-en la difference entre la somme DG, HR ou le double de DG et entre DB ou le double de DE sera moindre que FO. mais FO est la moitié dela difference entre la somme DG, HR et DB sera moindre que la moitié dela difference entre DA et DB.

De plus la difference entre la somme DG, HR,

ou la somme des cordes DH,, HB, qui sont chacune plus grandes que DE moitié de DB, sera moindre que la ~~moitié~~ de la difference entre la tangente DA et les cordes DH, HB, lesquelles sont ensemble plus grande que la corde DB.

Mais deplus la difference entre les tangentes DG, HR, et les ares DH, HB, qui sont plus grandes que les cordes DH, HB, mais moindre que les touchantes DG, HR, sera bien moindre que la moitié dela difference entre la ~~touchante~~ tangente DA et les mesmes ares DH, HB, ou bien le seul are DB, comprins quoy la difference entre les tangentes et les ares qui leurs respondent se diminuera a l'infini, par la bisection continüe des angles ; et enfin cette difference sera moindre que quelque petite quantité proposée que ce soit et toutes les touchantes ensemble coupées par les rayons peuvent etre prises pour le demy cercle ce qu'il falloit demontrer.

Lemme IX.

Les mesmes choses etant posées comme dans la precedente ; je dis que la somme des portions des rayons HG BR, comprises entre

Les touchantes et le cercle en moindre que la moitié de la portion BA, du rayon Comprise entre le cercle et la touchante DA, et d'autant que cette diminution qui n'agit a plus de la moitié se fera toujours par la bissection continüe des arcs, il est evident que l'on pourra trouver une quantité, qui sera la difference entre des rayons entre les touchantes et le cercle, laquelle sera moindre quaucune autre quantité proposé que ce soit, doù il suit que dans la division du cercle en parties indefiniment petites les rencontres des touchantes avec les rayons peuvent etre considerés comme si elles etoient sur la circonference du cercle

Dans la construction DB est double de DE; donc BA est double de EF, mais EF rencontrant la touchante HR en K, EK sera égale a BR. mais aussi il est evident que la portion KF de cette ligne EF, est plus grande que HG Car pourquoy EK et HG ensemble, c'est a dire BR égale a EK et HG ensemble sont moindres que EF qui est a moitié de BA C'est pourquoy la proposition est evidente.

Lemme X.

J'ai démontré dans le lemme VI. que dans les divisions [illegible] petites, les positions de la circon=[illegible] sont sensiblement des touchantes. [illegible] la methode que j'ay proposée et que ces [illegible] pourroient être prises pour les arcs de cercle, il faut maintenant demontrer la même chose dans les [illegible] dans la cycloide.

Soit l'epicycloide PD: dont la base ou le cercle AE ou le cercle generateur BDA rencontrant l'epicycloide au point D, lequel ou le point decrivant, par les precedentes propositions la ligne droite BDA touchera l'epicycloide au point D.

Soit supposé maintenant que l'epicycloide en divisée en parties indefiniment petites comme DO, et soit mené les lignes droittes DC, OC au centre C de la base, ayant decrit l'arc de cercle OF du Rayon CO, et arc coupant le cercle generateur en F soit mené la corde OFIR qui rencontre CD en I. et la touchante DM en R. soit aussi DQ la touchante du cercle en D, qui soit terminée en Q a la ligne ZFM, menée par le point F. et perpendiculaire au diametre AB. par ce point F. soit l'arc DF sera indefiniment petit.

rayon CO mis à tort à la place de la corde.

mais à cause de la petitesse de l'arc FO la corde FO peut passer pour l'arc FO et pour touchante en F; ayant donc mené CF l'angle CFI sera considéré comme droit: mais aussi l'angle DCF étant indefiniment petit l'angle CIF ou DIR sera

...ille considere comme vn droit.

maintenant pour la generation de l'image comme face DF en a face FO, ainsi CA rayon de la base en a CF car le cercle generateur sera transporté sur face AS de la base, mais en egale en grandeur a face DF, le point D venant D qui en en descendu en F se trouvera transporté en O.



je dis que si on mene DA prolongée jusqu'au cercle de la base en V et qu'on tire CV, le triangle DCV sera semblable au triangle RQD; car l'angle ADb = ADB ...

mené le rayon KD du cercle circonscrit, l'angle KDQ sera droit; si l'on ote donc l'angle commun ADQ, les deux angles restans KDA, QDR seront égaux: mais les deux triangles isocelles KDA CAV les angles KDA, KAD, CAV, et CVA seront égaux: donc l'angle CVA, ou CVD, est égal à l'angle QDR. de plus DIR étant considéré comme droit, les deux angles ensemble IRD, et DRI, étant ensemble égaux à un droit, c'est à dire à l'angle ADR et si l'on ote le commun IDR, les deux restans ADI, ou VDC, et DRI seront égaux et par conséquent les deux triangles DCV RDQ seront semblables.

On aura donc CD, à CA, comme QR à DQ. mais j'ay démontré cy devant que CA est à CF ou CQ, comme DF ou DQ à FO ou QO; donc en raison égale CD à CQ comme QR à QO et en divisant CD moins CQ c'est à dire DI, est à CD, comme QR moins que QO c'est à dire OR est à QR et en raison alterne CD à QR, comme DI à OR; mais aussi CD est à QR, ~~de plus conséquent~~ comme QA est à DQ ou DF, donc CA est à DF comme DI à OR: et par conséquent le produit des extrêmes CA, OR est égal au produit des moyennes DF, DI.

Mais comme ce sera la meme chose dans toutes les divisions, et que toutes les differences DR sont ensemble egales au diametre AB, ce diametre AB dans multiplié par la ligne DF que je suppose etre la mesme dans toutes les divisions sera egal a toutes les differences OR multipliés par CA; donc CA est a AB comme DF a toutes les differences RO: mais la raison de CA a AB est determinée et DF etant indefiniment petite toutes les OR ensemble seront indefiniment petites, et par consequent les points R ne differeront pas sensiblement des points O ce qu'il falloit demontrer.

Lemme XI.

Le demy cercle BDA etant divisé en parties indefiniment petites comme DF et par les points de divisions comme F, ayant mené les lignes MFZ perpendiculaires au diametre AB et par l'extremité B du diametre AB et par tous les mesmes points de division comme D, les lignes droites BDM terminées en M aux perpendiculaires MF les plus proches au dessus.

Je dis que la somme de toutes les portions comme DM des lignes BDD dans le demy cercle est egale au double du diametre

AB.

la ligne droite DQ qui touche le cercle en
cercle en D rencontre la perpendiculaire FM
en Q, dis-je que le point Q tombe hors le cercle
different du point F, par le Lemme VII, mais



cette touchante DQ,
est perpendiculaire au
rayon KD et la ligne
droite AD, menée de
l'extremité A du diametre
est aussi perpendiculaire
a BDM, car pour que
les deux angles droits
KDQ, ADM, on oste
le commun ADQ, il
restera l'angle KDA.

egal à QDM. mais dans le triangle rectangle
ABD, la ligne droite DT, etant perpendiculaire
à AB, l'angle BDT, est egal à BAD, y mais aussi
à cause des parallele TD, ZM, l'angle BMZ,
qui est egal à BDT, sera egal à BAD, ou à KDA.
dans le triangle isoelle KDA, donc l'angle DMQ,
sera egal à QDM que j'ay demontré egal à
KDA, et par consequent le triangle QDM, est
isoelle, et semblable au triangle KDA, donc
il suit que les cotez DQ ou DF, à QM,
ou FM sont egaux.

A cause des triangles isoscelles semblables KAD, QDM, KD est a DA, comme DQ ou DF a DM - donc le ~~rectangle~~ rectangle de KD en DM est egal au rectangle de DA en DF, et la meme chose etant de tous les autres dans le demi cercle, la somme de tous les rectangles de DA - en DF. mais on scait que tous les rectangles de DA, en DF dans le demy cercle sont egaux a quatre fois le quarré du rayon, ou bien au quarré du diametre AB, Lequel quand la somme de tous les rectangles de KD en DM - ou ce qui est la meme chose le rectangle de KD par toutes les DM, sera egal au quarre de AB ou bien ce qui est la meme chose, au rectangle de deux AB en KD; enfin ces deux rectangles egaux ayant une hauteur commune qui est KD, leurs bases seront aussi egales a sçavoir toutes les DM et deux fois le diametre AB - ce qu'il falloit demontrer.

Proposition III.

Je dis que la grandeur de la ligne courbe de l'Epicycloide interieure est egale a une ligne droite qui a meme raison au diametre du cercle generateur une autre fois inscrit -

la somme des diametres de deux cercles a sauvoir le generateur a celuy de la base, au diametre du cercle de la base.

Soit la circonference du cercle generateur diuisé en parties comme DF indefiniment petites et que a cercle BDA soit posé en sorte



que son point decriuant D soit sur la circonference, par la precedente proposition la ligne droite BDR touche la circonference en D. ayant mené DA prolongée iusqua la circonference du cercle de la base en V., et le rayon KD aussi la touchante DQ en D, les angles ADB, KDQ seront droits. par le point F ayant aussi mené ZFQM, perpendiculaires au diametre DA et qui rencontre au point Q la

ligne DQ qui touche le cercle en D, et au
poinct M la ligne BR qui touche lepicycloide
au mesme poinct D; et par le poinct Q soit tiré
la ligne 1Q0 perpendiculaire a DC menée
du poinct D au centre C de la base, et que
cette ligne 10 rencontre la touchante DR au
poinct R.

Puisque les arcs DF de la circonference
du cercle generateur sont indefiniment petits
par le lemme VI on peut supposer la portion
DQ de la touchante egale a l'arc DF et
par le lemme VII. le poinct Q comme etant
sur la circonference du cercle au poinct F.
cecy etant posé le triangle DQM en isocelle
et semblable au triangle isocelle KDA. comme
je l'ay demontré dans le lemme XI, et pour-
quoy du centre C de la base ayant mené
CV, et les triangles AKD, ACV, etant semblables
~~et~~ le triangle ACV, sera semblable au
triangle DQM.

Mais l'angle ADR ou VDR. est droit par
la construction et la ligne RQ, etant
perpendiculaire a CD, les deux angles ensemble
CDR, DRI, seront egaux aun droit; si l'on oté donc
de cette somme a du droit VDR, le commun

CDR, il restera l'angle DBQ, egal a l'angle CDV; mais aussi les angles DQR, CVD sont egaux dans les triangles semblables comme j'ay demontré dans le X lemme.

Il s'ensuit donc de que DM est a DQ comme AV est a AC ou CV, et de plus que DQ est a DR comme CA, ou CV. est a VD. — et en raison egale DM est a DR comme — AV a VD; mais AV est a VD comme CA est a KC, a cause des triangles semblables ACV. AKD: donc DM, est a DR, comme CA — est a CK.

Ce sera la meme demonstration pour — tous les arcs du cercle; et pour quoy toutes les DM ensemble seront a toutes les DR ensemble, comme CA est a CK, mais toutes les DM dans le demy cercle sont egales a deux fois le diametre BA du cercle generateur par le XI. lemme: et pour quoy comme CA est a CK, ainsi deux fois le diametre BA a toutes les DR ensemble. or dans le demi cercle toutes les DR ensemble qui ne sont pas differentes des DO, par le lemme X, seront egales a la moitié de l'epicycloide, car les portions comme DR de l'epicycloide commencent a chaque arc du cercle comme DF et lorsque le point decrivant D. sera parvenu en O sur l'epicycloide, ce meme point

v sera parvenu sur la circonference du cercle en F
et alors lextremité du diametre du cercle generateur
qui etant prolongé passe par le centre C, sera en S,
et larc AS, sera egal en longeur a larc DF. le
diametre CA, sera donc a CK, oubien tout le
diametre du cercle dela base sera ala somme
des diametres du cercle dela base du generateur
comme deux fois AB, diametre du cercle generateur
ala moitié de lepicycloide, oubien comme equatre fois
le diametre AB atoute lepicycloide exterieure
ce quil falloit demontrer.

Ou ce qui en dela cycloide dont la base
est vne ligne droite que lon peut considerer
comme vne circonference de cercle dont le centre
est a distance infinie, alors de quelque grandeur
quon suppose le cercle generateur, linfinie
CA, pourra toujours etre considerée comme egale
a CK, qui est composé de linfinie, CA, et de
la finie AK Lon pourquoy a cause de ce rapport
degalité, la cycloide sera egale a quatre fois
le diametre de son cercle generateur,

Proposition IV.

La ligne courbe que lepicycloide interieure

et Egale ala ligne droite qui en a quatre fois le diametre de son cercle generateur, comme la difference des diametres des cercles dela base et du generateur, au diametre du cercle dela base.

Ayant fait la meme preparation que ci-deuant on demontrera que toutes les DM ensemble sont a toutes les DR ensemble comme CA est a CK, cest pourquoy la proportion en est euidente.



Scholie.

J'ay seulement considéré dans cette demonstration l'Epicycloide interieure lorsque le diametre du cercle generateur est plus petit que le demi

diametre du cercle de la base ; mais je le demontreray dans la proposition suivante que les autres Epicycloides interieures se rapportent a celles cy.

Proposition V.

Premierement je dis que lorsque le diametre du cercle generateur est egal au demi diametre du cercle de la base, l'Epicycloide degenere en ligne droite puisque ce n'est que le diametre de ce cercle.

Soit le cercle de la base DBE dont le diametre DAE, le cercle generateur soit AHB dont le diametre AB est egal au demi diametre du cercle de la base



Et que le point A decrive l'epicycloide pendant que le cercle AHB roule sur BOD.

puisque le diametre AB du cercle generateur est egal au demi diametre du cercle de la base, la circonference AHB du demi cercle generateur est egal au quart BOD du cercle de la base ; et dans quelque position que ce soit du cercle generateur AHB comme AFO,

je dis que le point F qui est la rencontre du cercle generateur et du diametre DAE est le point qui decrit l'epicycloide.

Le diametre AO du cercle generateur est le rayon AD du cercle de la base font langle OAD, qui sera a la circonference du cercle generateur et au centre du cercle de la base, mais le cercle de la base, mais le cercle de la base ayant la circonference double de celle de celuy de la base, les arcs OD, et OF seront egaux en longueur; et par consequent l'arc OB qui est le reste du quart de cercle DB sera egal a l'arc FA — qui est le reste du demy cercle OFA, mais si le cercle AHB en roulant sur BOD en parvient en O, il est evident que son point A sera uny en F car l'arc AF doit estre egal en longueur a l'arc BO, le point F sera donc le point decrivant qui est sur le diametre AD, cestera toujours la meme chose en quelque endroit que soit le cercle generateur, l'epicycloide en ce cas sera donc le diametre DAE ce qu'il falloit demontrer.

Secondement si le diametre AB du cercle generateur de l'epicycloide interieure est plus grand que le demy diametre CB du cercle de la base, mais plus petit que le diametre entier; je dis que l'epicycloide interieure est la meme que celle qui seroit

decrite par le cercle DFE dont le diametre DE est la difference entre le diametre AB du cercle generateur et le diametre GB du cercle de la base, et ce diametre DE etant plus petit dans ce cas que CB, on trouvera la grandeur de cette epicycloide par la quatrieme proposition.

Du centre C, qui est celuy de la base soit decrit le cercle AEI. dont le demy diametre CA soit egal a la difference entre le diametre AB du cercle generateur, et le demy diametre CB du cercle de la base, et soit le cercle generateur BFA, dans quelle position on voudra, comme AFB, ensorte que le point decrivant soit en F, et que ce cercle de la base en B. il est evident par la description de l'epicycloide que l'arc BH de la base entre le commencement H de l'epicycloide et le point B sera egal en longueur a l'arc BF du cercle generateur.



Par le point B a par le centre C de la base ayant mené le diametre BCA du cercle generateur et du point F au point A, ayant mené AF qui rencontrera en E le cercle AEI, soit tiré CE prolongé jusqu'a la base en D, on aura donc ED egale a AG qui est

La difference des diametres dela base et du cercle generateur

ED pour diametre, soit decrit le cercle EfD, je dis que
le cercle EfD, rencontre le cercle generateur BFA, en
son point F, qui decrit l'epicycloide, et que lare DH de
la base en egal en longeur a lare DF ou Df du
cercle DfE, et comme ce sera toujours la meme
chose en quelque endroit que le point decrivant F soit
placé sur l'epicycloide; il s'ensuit que l'epicycloide
peut avoir le cercle EFD pour generateur aussi bien
que le cercle AFB.

Les diametres BA, DE des deux cercles AFB, EfD,
sont ensemble egaux par la construction, au diametre
BQ du cercle dela base, en pourquoy les circonfe=
rences ensemble de ces deux cercles AFB, EfD,
sont egales ala circonferencé du cercle dela base
mais aeaux des angles egaux BAF, DEF, et que les
cercles, ABF, AIE, se touchent au point A, et que les
cercles AIE, EDf se touchent au point E AB sera
a AF comme AI, a AE et dememe AB sera a AF
comme ED a Ef, en supposant que la ligne AEf
rencontre le cercle EDf, au point f; an pourquoy
le diametre AB sera a AF comme la composé
des diametres AI, ED ala composé des cordes AE
Ef; mais AI, et ED ensemble sont egales a AB.
donc AE et Ef [illegible] a AF et par consequent

le point f en le meme que le point F et les deux
cercles BFA, DfE, se rencontrent au point F.

Si des points B et D on mene les lignes BF, DF au
point F commun aux deux cercles AFB, EFD, les lignes
faisant des angles droit BFA, DFE qui sont
chacun a leur dit cercle, il sensuit que ces deux
lignes ne feront quune seule BD.

Mais aussi les trois arcs BD, BF, DF sont semblables
car ils soutiennent des angles egaux a sauoir BCD,
au centre C, et BAF moitié de BCD a la circonference
et semblablement DEF egal a BAF a la circonference
et ces arcs etant entre eux comme les circonferences de
leurs cercles, il sensuit que les deux ensemble BF,
DF seront egaux a BD. mais pour la generation de
l'epicycloide l'arc BF en egal a l'arc BH, donc
l'arc DF en egal a l'arc DH; enfin la meme chose
etant dans toutes les portions de ces cercles il en
conclud que le cercle DFfE decrit la meme
epicycloide que le cercle AFB.

Troisiemement si le cercle generateur
a son diametre plus grand que celuy du cercle de
la base, l'epicycloide qui sera decrite par le cercle
generateur sera une epicycloide exterieure, qui
sera un autre cercle dont le diametre sera egal
a la difference du diametre du cercle generateur
et de celuy de la base.

V. Il sera facile de demontrer ce troisieme cas en la forme de la meme preparation que dans le precedent, c'est pourquoy je finiray cette proposition en avertissant qu'il y a des Spiracles dont les exterieures qui sont recomposé, et qui arrivent lorsque le cercle generateur est plus grand que celuy de la base, mais cela ne fait aucun changement a tout ce que j'ay demontré, on prendra garde seulement que dans les superficies de ces Spiracles redoublés on doit considerer les parties communes, et qui se reconnoissent comme telles estant separées

Lemme XII.

Si un segment de parabole ABD, compris entre l'extremité A de l'axe et quelque point B que ce soit, est coupé en parties indefiniment petites aux points D P &c. et que de ces points de division on mene des lignes P R, D a, &c. paralleles a AC, touchante au point A. lesquelles paralleles soient terminées aux touchantes menées par les points les plus proches au dessous comme B R, p a, D H.

Je dis que la somme de toutes les parties P R, D a, A H sera infiniment petite, et par consequent que on peut prendre les points R a H &c. comme

fits etoient sur la parabole.

Que la touchante BR soit prolongé jusqua la touchante AC au point C, duquel point C soit mené le diametre CD qui rencontre la parabole en D, et par le point D soit mené la touchante NDH et la ligne DG parallele a AC; il est evident par les proprietez de la parabole que DG, sera le quart de AC, et AH sa moitié, donc DG, et AH ensemble seront les trois quarts de AC.



maintenant si des points H et N, ou la touchante NDH rencontre les deux autres, on mene les diametres NP HE, et que par le point P on mene PR parallele a AC et Pa, touchante en P; et semblablement du point E que on mene EK parallele a AC, et EI touchante en E, je dis que la somme des lignes PR Da, EK et AI est egal aux trois quarts de la somme des precedentes DG, AH, Premierement par la meme proprieté de la parabole dont je me viens de servir, la touchante Pa, rencontrant en T la touchante ND, il est evident que si du point P on mene PX parallele a DN [illegible] que si-

du point P on menera PX parallele a DH, PX a DT ensemble seront egales aux trois quarts de DN, mais a cause des paralleles PX a DTN, les triangles PRX, Da T, sont semblables aux triangles DGN, et par consequent PR a Da, seront les trois quarts de DG, puisque DT a PX ensemble sont les trois quarts de DN; secondement on demontrera de mesme que EX a AI, ensemble sont les trois quarts de AH; et par consequent les quatre lignes PR, Da, EX, et AI. ensemble seront les trois quarts de ~~DH~~ DG a AH ensemble qui sont les trois quarts de AC.

Si l'on continue a mener des diametres par les points de rencontre des touchantes XT bI, et par les extremités de ces diametres des touchantes on aura huit lignes comme ZO, FL que on demontrera etre egales toutes ensemble aux trois quarts des lignes precedentes et ainsi en continuant on doublera toujours le nombre des lignes et leur somme ira toujours en diminuant dun quart de la precedente somme; ainsi pour quoy cette somme deviendra encore plus petite quaucune grandeur proposée ce qui restoit a demontrer.

Lemme XIII.

Ce que j'ay demontré dans le Lemme XI touchant

le rapport de DQ a DM, ou a DO, vers les parties
de la base de lespé cy droite
sera de meme pour les parties
au dessus du point D.



Cette proposition en
evidente puisquon peut
construire des triangles
semblables aux des lignes
paralleles des deux costez
du point D ce qui paroit
clairement par la figure.

Lemme XIV.

Soit le demy cercle AMCI. dont la circonference
soit diuisée en parties indefiniment petites comme
CI, IX: des points de diuision CIX ayant mené les
perpendiculaires CB, IE, XA au diametre AM et les
cordes AC, AI, AX qui rencontrent les perpendiculaires
des plus proches diuisions de dessus au point FR.

Ie dis dans quelque segment du cercle que
ce soit que toutes les portions ensemble des cordes
comme CF, IR, comprises entre la circonference
du cercle et la perpendiculaire superieure sont
egales au double de la corde AC, et par la meme
raison toutes les portions prises ensemble dans le demy

cercle sont égalés au double du diametre, qui est
aussi la corde du demy cercle.

Soit la parabole ADL dont l'axe AM soit
commun avec le diametre du demy cercle, auquel
~~parametre~~ parametre de cet axe soit aussi égal a
AM; ayant prolongé les perpendiculaires a l'axe comme
CB, IE XR jusqua la parabole aux points DXT les
portions DK, KT dela parabole seront indefiniment
petites, puisque celles du cercle qui leur respondent
sont supposé indefiniment petites, c'est pourquoy parle
lemme XII. les rencontres des touchantes dela parabole
comme DP, XQ, &c. avec les perpendiculaires superieures
IK, XT, ne different pas sensiblement des points de
la parabole KT et les portions des touchantes, comme
DK, KT, seront considerés comme des arcs dela parabole.



Par les points DK, &c. dela parabole, ayant mené
les lignes DN, KO, parallèles au diametre AM, lesquelles

rencontrent en H et en S, les perpendiculaires IK, XT, et ayant aussi mené dans la parabole les cordes AD, AX, qui rencontrent les mesmes perpendiculaires IK, XT, en Q et en V, premierement on aura les cordes AC, AI, AX egales aux ordonnés de la parabole, BD. EK &c. ce qui est connu par les proprietés de la parabole. Ensuitte comme AC, est a AE, ainsy AB est a AE, et comme AB est a AE ainsy BD est a EG, donc AC, est a AF, comme BD a EG, d'ou il suit que EG sera egale a AF et la difference des lignes BD, EG, qui est GH, sera egale a CF qui est la difference des lignes AC, AF.

On demontrera de meme que SV, sera egale a RI, et ainsi de suitte dans toutes les parties de l'arc AXC, du cercle et de l'arc ATD, de la parabole.

Maintenant a cause de la parabole puisque la tangente DP coupe AN en deux egalement en P, la ligne HG, sera aussi coupée en deux egalement en K par la mesme DP, de mesme VS, sera coupée en deux egalement en T. mais aussi il est evident que dans le segment ATD de la parabole, toutes les lignes KH, TS &c. sont ensemble, egales a AN ou a BD, car KH est egal a NO, et ainsi des autres — donc la somme de toutes les AH, VS, &c. qui — sont egales aux CF, IR, &c. seront ensemble egales

aux doubles de AN ou de DB ou de AC, qui leur sont
égale, ce qu'il fallois demontrer.

Ovoïdaire

Ce que je viens de demontrer des portions des cordes
CF, IR &c qui sont au dedans du cercle, sera aussi de
meme pour les portions de ces memes cordes prolongées
au dela du cercle comme IZ, XY &c

Car puisque je suppose les arcs comme CI, infiniment petits, les lignes CF, et IZ peuvent etre considerés comme paralleles, mais FI, et CZ sont aussi paralleles; donc CF et IZ sont egales.

Il s'ensuit donc de la que dans quelque arc que ce soit, comme AC, les portions des cordes comme IZ, XY ensemble sont egales au double de la corde AC; de meme que dans le demi cercle, elles seront egales au double du diametre AM, ce que j'ay demontré d'une autre facon et particulierement dans le 9eme onzieme.

On peut encore demontrer de meme 9eme d'une autre maniere sans le secours de la parabole.

Soit dans le demy cercle ACB, l'arc AC, et
quon voudra diuiser
en parties indefiniment
petites, comme AD, DX-
XZ &c si de l'extremité
M du diametre on mene
les cordes MD, MX, MZ,
&c aux points de diuision
de l'arc, on aura la
somme des rectangles, fait
sous chaque arc, la re-
au rectangle du diametre MA, et de la corde AC.



Car si la corde MD en prolongé jusques a la
touchante AG, menée par l'extremité A du diametre
et quon mene aussi les cordes AD, AX, AZ, &c qui
rencontrent les autres cordes, comme MD en H, MX en
L &c le triangle rectangle MAG sera semblable
au triangle rectangle MDA et le triangle rectangle
MAG sera semblable au triangle MXH, car ils
ont les angles egaux au point M, et par la meme
raison, le meme triangle rectangle MAG sera
semblable au triangle rectangle MZL et ainsi
des autres car pour quoy MA et AG comme MD
a AD, donc le rectangle MA, AD, est egal au rectangle
MD, AG, de meme MA est a AG comme MX est a
XH, donc le rectangle MA, XH sera egal au rectangle

AG, MX, de meme MA est a AG comme MZ a ZL;
et le rectangle MA ZL est egal au rectangle MZ AG, &
et ainsi des autres

mais comme la touchante AG peut etre consideree
comme la/ce meme AD comme il suit du lemme VIII.
il est evident que tous les rectangles ensemble sous
la/ce AD ou sous tous ses egaux DX, XZ &c sous
toutes les cordes MD, MX, MZ &c seront ensemble egaux
aux rectangles sous le diametre MA, & sous les portions,
AD, XH, ZL &c. des cordes menées du point A au point
de division; mais toutes les portions de cordes AD, XH, ZL,
&c sont ensemble egale a la corde AC; car AX, doit
etre consideree comme egale a AD, et a XH, ensemble
puisque AD, et AH, n'ont pas de difference sensible, l'angle
ADH etant droit, et l'angle DAH indefiniment petit
de meme AX et ZL, ensemble sont sensiblement egales
a la toute AZ; car AX, et AL sont sensiblement
egales entr'elles; l'angle AXL, etant droit et l'angle
AXL indefiniment petit, et ainsi de tous les autres
donc la derniere AC, sera egale a la somme de
toutes les parties AD, XH, ZL, &c.

puisque nous savons maintenant que le
rectangle sous le diametre MA, et sous la corde
AC, est egal a la somme de tous les rectangles,

Sous les cordes, MD, MX, MZ, &c. et sous chaque partie de l'arc, li des points de division CZX &c. on mene des perpendiculaires, CB, ZE &c. au diametre AM lesquelles rencontrent les cordes des divisions superieures aux points FR, &c. et si l'on mene aussi des points de division CZX. &c. des touchantes au cercle comme Cl. qui le terminent aux perpendiculaires superieures comme Cl. a la perpendiculaire, superieure ZE au point I, ce point I, pouuant etre pris pour le point Z de la division du cercle par le lemme VII et du centre K du cercle ayant mené KC, je dis que le triangle CIF en semblable au triangle MKC,

Car a cause de la touchante Cl, l'angle KCI- en droit et a cause du demi cercle, l'angle MCA- en aussi droit, si l'on oste donc de chaque droit l'angle commun KCA, il restera l'angle ACI, - ou FCI, egal a l'angle KCM, mais aussi a cause de la perpendiculaire CB, sur le diametre AM, l'angle ACB, ou son egal CFI en egal a l'angle AMC; car pourquoy l'angle CFI, en egal a l'angle FCI, puisque l'angle AMC, en egal a l'angle KCM et par consequent le triangle CIF en - isocelle et semblable au triangle ~~isocelle~~ isocelle MKC.

Mais a cause des triangles semblables CIF, MKC, comme KC, en a CM, ainsi IC, a CF; donc le rectangle KC, CF, en egal au rectangle CM, IC, on demon=trera de meme que le rectangle KC, ZR en egal au rectangle MZ, ZX, et ainsi de tout le reste.

Mais puisque j'ay demontré cy devant que tous les rectangles CM, IC, ZM, ZX, &c. sont egaux ensemble au rectangle MA, AC, il sensuit que tous les rectangles ensemble KC, CF, KC, ZR &c. qui seront egaux au seul rectangle sous KC, - et sous toutes les parties ensemble, CF, ZR &c. comme une seule ligne, sont egaux au rectangle MA - AC, enfin puisque MA en double de KC, - aussi toutes les parties ensemble CF, ZR &c. seront doubles de AC, ce qui falloit demontrer.

Corollaire.

Il s'ensuit aussi que toutes les ~~proportions~~ des - cordes comme ZO, XP, prolongés hors le cercle et terminés aux perpendiculaires, CB, IE prolongés aussi en O, et en P, sont egales prises ensemble au double de la corde AC; ce qui se voit quand il y a une touchante au point Z, les rencontres de cette

Touchante avec les perpendiculaires RX, BC, au diametre AM, ne seront pas sensiblement differente des points de division XC, de l'arc AC, a cause des parties de cet arc, qui sont indefiniment petites. par les lemmes precedens et par consequent les arcs ZC, ZX, etant egaux et etant supposez comme des lignes droites a cause des parallels RX, CO, les deux triangles ZXR, ZCO seront egaux et semblables, et par consequent ZR sera egale a ZO et ainsi de toutes les autres donc toutes les parties exterieures a l'exception seulement de la premiere exterieure qui est infinie, et a la place de laquelle il faut substituer la derniere interieure CF, mais dans les divisions indefiniment petites. une seule retranchée ne fait aucune difference sensible.

Proposition VI.

Dans une Epicycloide PD, dont le Sommet ou P et quelque arc PD le cercle generateur BDA, dans posé, comme que le point decrivant soit en D, et que le diametre AKB, dans cette position, tende au centre C, de la base.

Je dis que si l'on fait comme CA, rayon de la base

& du Rayon du cercle generateur, ainsi le double
de la corde BD, de l'arc BD, du cercle generateur
qui repond a l'arc PD, de l'epicycloide, en a une
quatrieme proportionelle, cette ligne sera Egale à l'arc
PD de l'epicycloide

J'ay demontré dans les propositions precedentes
III, IV, V, que pour toutes les Epicycloides et pour la
Cycloide toutes les DM ont mesmes raisons



= a toutes les DR, comme une seule DM a une

seule DR, et qui est comme CA a CK, mais par le lemme XIV, toutes les DM, dans l'arc de cercle BD, sont ensemble egales au double de la corde BD, mais aussi par le lemme X, toutes les touchantes comme DR, qui repondent aux DM, sont egales a portion de l'epicycloide depuis son sommet P jusqu'au point D; Cequ'il vouloit premierement chercher la quatrieme ligne proportionelle apres les trois CA, CK et la double de la corde BD, cette quatrieme sera la ligne egale a la portion de la corde BD.

Dans la cycloide puisque les points R M sont joints ensemble, la portion de la cycloide depuis son sommet P, jusqu'au point D, sera egales a toutes les DM, ensemble, c'est a dire, au double de la corde BD.

Corollaire

Il s'ensuit aussi de cette demonstration la meme chose dans les propositions III, IV, et V, pour la grandeur de l'epicycloide ou de la cycloide toute entiere, sçavoir que toute la demy epicycloide est egale a la ligne droite qui est quatrieme proportionelle apres CA, CK, et le double

de AB, qui en la corde de son demy cercle ou
son diametre; il faut ce qui en dela demy cycloide;
elle en egale au double de BA, car le point C,
qui en le centre de la base en a distance infinie de
elois CA, et CK, sont considerés comme egaleu
entr'elles.

De
L'euolution des Epicycloides
et dela Cycloide
Comme.

Soit une ligne DTFB, toujours courbe du meme
coté, autour d'laquelle soit appliquée une ligne
flexible, si l'on deueloppe en partie cette ligne
appliquée, en sorte que la partie AB entre son
extremité A, et la courbe en B soit tendüe et quelle
soit par consequent une ligne droite.

je dis que la ligne droite AB touche la
courbe au point B, dou elle commence a s'etendre.

La ligne decrite par l'extremité A, de
la ligne flexible qui en toujours tendue en
la deuelopant en dite decrite par leuolution
dela courbe DTFB.

Si la ligne droite AB ne touche pas la courbe en B, ou elle la rencontre, etant prolongée en E, au delà du point B, elle entrera dans la partie qui en concave, ou bien au dedans de la courbe. Soit donc pris cette courbe quelque point F, au dessus de la ligne droite, AB E; la ligne droite AF fera vne angle auec AB E et il se formera vn triangle mixte de deux lignes droites AB, AE, et de la portion de la courbe BE; mais de quelque nature que soit cette courbe, la ligne droite AB, et la courbe BF, ensemble seront plus grandes que la ligne droite AE, il n'en donc pas vray que la ligne flexible soit etendue depuis le point A jusques en B, et quensuite elle soit couchée sur BF. Ce qui est contre l'hypothese la ligne droite AB, touchera donc la courbe au point B.



Proposition 11

La ligne droite par l'evolution dans la cycloide en vne cycloide.

Soit la cycloide BDL qui a pour cercle

generateur F D E, dont le centre en P, a qui a
la base circulaire A E L, dont le centre en le point
C; le sommet de lepicycloide soit le point B.

Si du centre C, et du demy diametre C B, on
decrit le cercle B F M, qui soit la base dune
Epicycloide B G K, dont le cercle generateur soit
F G H, qui a pour diametre F H ou B I, quon deter=
minera en faisant comme C A, on a C P, ainsi
a E F ou a A B, a une quatrieme proportionnelle
E H ou A I. et ayant osté de A I, le diametre
A B du cercle generateur, il restera B I, ou F H.
qui sera le diametre quon cherche.

je dis que lepicycloide B G K en decrite
pour l'evolution de lepicycloide B D L.

Par la construction et par les propositions
precedentes de la dimension des lignes Epicycloides
il est evident que la courbe de la demy Epicycloide
B D L. en egale a la ligne droite A I, ou L K,

Soit maintenant une ligne flexible. accommodée
autour de la demy Epicycloide B D L, dont une
portion depuis le point D jusqua au sommet B soit
etendue dans la ligne droite D G, cette ligne
droite D G, par le lemme precedent touchera
l'Epicycloide au point D, Cequ'il pourquoy si l'on pose le
cercle generateur de l'Epicycloide dans la position

FDE, ou le point decriuant, dont en D, il est=
constant par la proprieté des touchantes des Epicy=
cloides, que la ligne droite DG, touchante passera
par l'extremité F du diametre EF, dans la position
FDE du cercle generateur,



Ayant prolongé CEF, jusques H au cercle IHK,
concentrique au cercle de la base qui a été decrit
sur le demi diametre CI, sur FH pour diametre
soit decrit le demi cercle FgH. je demontre que
l'extremité G, de la ligne flexible étendüe depuis
le point D sera sur le cercle FgH.

Si le point G n'est pas sur le cercle FgH, que la
ligne droite DFG, rencontre s'il est possible le
cercle FgH, en quelque point, g; soit donc mené
Hg. alentour du demy cercle FgH, en quelque point

langle FgH en droit, et les triangles rectangles EDF, FgH, seront semblables a cause de langle egal au point F, Ainpourquoy EF sera a FH, comme ED, a Fg; et en composant EF sera a EF, plus FH, ~~comme FE a Fg. en composant EF~~ ce qui en EH comme DF, a DF, plus Fg, ce qui en Dg; et en doublant les antecedens 2EF, ou 2AB- seront a EH ou AI, comme 2FD a Dg.

Par la proposition 6. de la dimension des Cycloides et par la construction comme 2AB- sont a AI, ainsi CA, en a CP, mais comme CA- en a CP, ainsi le double de la corde DF en la grandeur de la portion DB, de lepicycloide laquelle portion par leuolution en egale a la ligne droite, DG; Ainpourquoy en raison egale 2AB, sont a AI. comme 2DF, a DG; mais je viens de demontrer que 2AB, sont a AI, comme 2FD sont a Dg, donc 2DF sont a DG, comme 2FD sont a Dg, et par consequent DG, sera egale a Dg. Dont le point g, de rencontre de la ligne droite DFG, du cercle FgH sera lextremité a decette ligne.

Il reste maintenant a demontrer que le point G est sur lepicycloide BK donc FGH en le cercle generateur; par la construction CA, en a CP, comme 2AB, sont a AI, en diuisant CA, en a CP, moins

CA, ce qui en AP, comme 2AB, en a AI, moins 2AB; mais en doublant les consequens CA, en a 2AP, ce qui en egal a AB, comme 2AB en a 2AI, moins 4AB, et en composant CA en a CA, plus AB, ce qui en CB, comme 2AB, a 2AI, moins 4AB, plus 2AB, ce qui en 2AI, moins 2AB ou seulement 2BI, comme il paroit dans la figure. mais en prenant la moitié des termes de la derniere raison, CA, en a CB, comme AB a BI. mais auſſi comme CA en a CB, ainsi la longeur de l'arc AE a la longeur de l'arc BF,

Maintenant par la generation de l'epicycloide BDL, l'arc de la base AE en egal en longeur a l'arc du cercle generateur FD, mais a cause que les deux cercles FDE, FGH se touchent en F la ligne DFG, coupe les deux arcs ſemblables, FD, FG, dont les longueurs conservant entre elles la meme raiſon que celle des cordes FD, FG ou celle des diametres FE, FH; donc l'arc FD en a l'arc FG, comme FE, a FH, ou bien comme AB, a BI, qui en auſſi comme CA, a CB, ou comme l'arc AE en egal a l'arc BF, mais l'arc AE en egal a l'arc FD, donc l'arc BF en egal a l'arc FG, du cercle FGH, et par conſequent le point G, en celuy qui decrit l'epicycloide BGK. ce qu'il falloit demontrer

Pour les Epicycloïdes interieures on demontrera la meme chose en changeant seulement la forme du raisonnement. et pour la cycloïde il en faudra de voir par cette meme demonstration que la ligne qui en decrite par son evolution est une cycloïde egale a celle dont elle en evolue.

Corollaire 1.

Il s'ensuit aussi par hypothese que les trois lignes CA, CB, CI, sont en proportion continuë, car CA etant a CB comme deux AB a AI, on diuisant et doublant les consequens CA, sera a 2 CB, moins a CA, comme a AB a 2 AI. moins 4 AB; mais 2 CB, moins 2 CA, sont egaux a 2 AB ou bien a AB; et comme 2 AB a 2 AI, moins 4 AB, ainsi AB, a AI moins a AB, componendo ainsi CA est a AB comme AB. a AI moins 2 AB; mais en componant CA est a CA, plus AB ce qui est egal a CB, comme AB a AB plus AI, moins 2 AB, ce qui est egal a BI, et en raison alterne CA est a AB comme CB a BI, enfin en componant CA est a CA - plus AB ce qui est egal a CB comme CB a CB - plus BI. ce qui est egal a CI.

Il en encore Iuridont que la ligne qui en decrit par l'evolution du cercle, en la derniere de toutes les epicycloides exterieures, en adire-elles donc le centre du cercle generateur en a distance infinie, ou bien celle qui en decrit par l'extremité d'une ligne droite qui roule autour d'un cercle en le touchant ce qui revient a l'evolution du cercle.

Il en faille a demontrer que la superficie de la figure de cette espece d'epicycloide lorsque la ligne decriuante a parcouru le cercle entier de la base, ou bien ce qui revient a la meme chose, la figure decrit par l'evolution du cercle entier sans y comprendre le cercle dont on fait l'evolution en egale au triers du cercle qui a pour rayon la circonference du cercle dont on fait l'evolution: ce que je dis du cercle entier se doit entendre demence de quelque partie que ce soit de cette figure. car la figure decrite par l'evolution de quelque arc de cercle sans y rien comprendre de ce cercle et egal aux tiers du secteur de cercle qui a pour rayon la circonference de cet arc, et donc l'arc en semblable a celuy dont se fait l'evolution, ce sera aussi le

meme chose pour lévolution dun are plus grand que le cevele entier.

Pour ce qui en dela ligne courbe de cette Epicycloide ou bien de celle qui en decrite par lévolution dun cevele entier ou de quelque are que ce soit elle sera toujours egale a la moitié dela circonferencé du cercle ou de lare dont on prend le tiers de la superficie, pour la superfice dela figure decrite par lévolution.

De l'usage
Des Epicycloides dans les mechaniques
Proposition 1.

Soit la ligne droite AD dela longeur determiné et mobile sur un plan autour de son extremité A, et sur le meme plan une autre ligne droite CB indeterminée vers B, et mobile sur ce plan autour de son extremité C; si lextremité D, dela ligne AD en emportée en E, et en R, par la ligne CB, qui se meut sur le point C.

Je dis que si les lignes AD, CB etant placés sur la ligne CA que joint les centres de mouvement et les points D et B, etant posé lun sur l'autre, il

y a deux puissances egales entr'elles qui agissent
dotou leur effort sur leurs lignes aux point D et B,
cest a dire avec une direction a angle droit, les
puissances seront en equilibre, mais si les lignes
changent de position comme AD en AE et CB
en CBE, les puissances egales a X, etant appliquées
toujours de la meme maniere a leurs lignes et aux
memes endroits ne seront plus en equilibre, mais pour
faire lequilibre il en faudra une autre Y plus grande
que X appliquee en B sur CE et cette puissance
Y doit etre d'autant plus grande que la ligne
CBE sera plus eloignée de CA.

Du centre C et demy diametre CD ou CB ayant
decrit le cercle BB, il est evident que CE est plus
grande que CB. mais du point E ayant mené
EG, perpendiculaire a AE, et EFM, perpendiculaire
a CE, et pour le point A, ayant aussi mené HAM,
parallele a CE, si de quelque point F de la ligne
EF, on tire la ligne FG parallele a CE si de
quelque point F de la ligne EF on tire la ligne
FG, parallele a CE, les deux triangles FEG, MEA,
seront semblables car ils sont rectangles, et leurs angles
au point E sont egaux ensemble a un droit a cause

de l'angle droit AEG.

Si l'on suppose maintenant la partie FF infiniment petite, il est evident que la ligne CE ne peut se mouvoir de E en F autour du point C sans faire mouvoir AE jusques G autour du point A. mais il s'ensuit des loix de la mechanique, que pour faire equilibre entre la puissance X appliquée a l'extremité E du levier AE laquelle se meut selon la ligne EG et entre la puissance Z, appliquée a l'extremité E du levier CE.



Laquelle se meut selon la ligne EF, il faut que X soit a Z comme EF a EG, c'est a dire comme AM, a AE, enfin si l'on suppose une puissance Y appliquée en B sur le levier CE au point B, il est evident que pour faire equilibre entre Z et Y, il faut que Z soit a Y comme CB, a CE; il s'ensuit donc que pour faire equilibre entre X appliqué en E a l'extremité du levier AE et Y appliqué en B, sur le levier CE. —

il faut que X soit a y dans la raison composée de AM, a AE, et de CB a CE, qui est la meme que celle du rectangle AM, CB au rectangle AE, CE, mais dans le triangle rectangle AME, le Coté AM, etant toujours plus petit que l'hypotenuse AE, et par la Construction CB, etant aussi toujours plus petite que CE, il s'ensuit que la puissance y sera toujours plus grande que la puissance X et que plus les lignes CE AE seront eloignés de la ligne AC qui joint les centres de mouvement, plus la puissance y doit etre grande pour faire equilibre avec la puissance X,

On peut aussi demontrer la meme chose d'une autre maniere en se servant du principe commun de la balance ou du levier. Car si sur MA prolongée on prend AH egale a AE, et qu'on considere CE et MAH comme deux leviers horizontaux dont les points d'appuy soient en C, et en A, et qu'a l'extremité E du levier CE il y ait un poid appellé Z, ce poid fera le meme effort sur le point E du levier coudé HAE, que sur le point M du levier droit ou balance HAM. ou il est evident qu'il faut au point H un poids X, qui soit au poids Z comme AM a AH ou AE soit egale, mais maintenant si au lieu du poids Z appliqué en E a l'extremité de CE, on substitue un

poids Y appliqué ~~aaaa~~ au point B de ce même
levier CE, pour y faire le même effort que Z en E.
il faudra ~~pour faire équilibre~~ que la raison composé
~~de celle de~~ que Y, soit a Z, comme CE a CB
dont le poid X, sera au poids Y, pour faire équilibre
dans la raison composé de AM a AE et de CB-
a CE comme ey devant dont il suit ce qui-
étoit proposé.

Voltaire

Il s'ensuit de cette démonstration que une puissance
appliquée en B a l'extremité du levier CB, n'agira
pas également contre une autre puissance appliquée
en D a l'extremité de la ligne AD en la rencontrant
a son extremité D quand ces lignes seront différemment
posées, les puissances étant toujours appliquées aux
mêmes points de leurs lignes CB, AD et y agissant
perpendiculairement, mais qu'il en faudra une
d'autant plus grande que la ligne CB sera plus
éloignée de CA.

On doit aussi entendre le contraire, la puissance
qui agit étant appliquée a l'extremité D de la
ligne AD: car cette puissance doit être moin-
dre quand la ligne [illegible] D est plus éloignée,

de AC, que quand elle en en plus proche.

Proposition II.

Les mesmes choses etant posées comme dans la precedente, je dis que si sur la circonference du cercle BB, comme base on decrit l'epicycloide BH dont le cercle generateur DER, ayt pour rayon la ligne AD, la ligne courbe de cette epicycloide etant jointe au rayon CD de la base et ne faisant avec elle qu'une mesme ligne mixte, comme dans la position ou elle a été decrite, en quelque endroit que soit placé CB hors de CA, et l'extremité D de la ligne AD etant posé sur l'epicycloide en E la puissance X qui en appliquée en E a l'extremité de AE. comme elle doit dans la proposition precedente, sera en equilibre avec la mesme puissance X, qui en appliquée en B, a l'extremité B de la ligne CB, et qui agit sur le point E par le moyen de la courbe de l'epicycloide BE.

Il en faut voir dans cette figure pour la formation de l'epicycloide, que dans quelque position que soit la ligne CB, qui en jointe a l'epicycloide, les arcs BB seront toujours—

Egaux en longeur aux arcs DE du cercle DER. en pour quoy en quelque endroit que soit CB. la puissance appliqué, en B ne pourra remuoir par vn arc BB sans faire remuoir lautre puissance appliqué en E a lextremité du leuier AE par vn arc EE egal en longeur a larc BB, dou il suit que ces puissances dans egalles, elles demeureront en equilibre; ce qui fallois demontrer.



ON peut aussi faire cette demonstration comme dans la precedente proposition, et lon trouuera que la meme methode qui a conduit a vne inegalité de puissances nous mene icy a legalité par les raisons Composées. Car si lon suppose quà lextremité E du leuier AE il y ait la puissance X, qui agisse selon EG perpendiculaire a AE, et quau point E a lextremité de CE, il y ait vne puissance V qui agisse selon EF perpendiculaire a CE; il est euident par la nature de lEpicycloide que la ligne MNE menée par lextremité N du diametre DAN, au point E touchera lepicycloide en ce point, et quainsi

lorsque le point E de l'extremité du levier CE aura parcouru un espace EF indefiniment petit, le meme point E de l'extremité du levier AE sera parvenu en G, ou la ligne FG, parallele a EN rencontre EG, perpendiculaire a AE, car la petite portion FG, de la touchante EN peut etre considerée.



comme la courbe elle meme. mais ayant mené FC, qui rencontre le cercle BB en L, l'arc SL, du cercle BB entre CE et CF, sera egal en longueur a EG par la nature de l'epicycloide. car quand le point E de l'epicycloide sera parvenu en G, le commencement de l'epicycloide B sur la circonference du cercle BB, sera parvenu en O en sorte que l'arc BO sera egal a SL.

La puissance X, parcourera donc l'espace EG, quand la puissance V, parcourera EF, et pour faire l'equilibre entre les deux puissances, il faut que X soit a V, comme EF a EG, en a dire en raison reciproque des chemins parcourus: mais enfin si l'on suppose la puissance Y, au point S ou au point B, sur la circonference du cercle BB, et qu'elle fasse equilibre avec la puissance V. il faudra que V soit a Y comme CB a CE: donc la puissance X sera a la puissance Y dans la raison composée de EF a EG. qui est la meme que EF a SL ou que CE a CS ou CB et de CB, a CE. mais cette raison composée est une raison d'egalité; en pourquoy les puissances X et Y doivent etre egales pour faire equilibre entre elles, etant appliquées comme on la suppose: ce qu'il falloit demontrer.

Si l'on veut aussi se servir dans cette demonstration du principe commun de la balance, et considerer les puissances comme des poids suspendus aux extremitez des bras ou des leviers ayant mené EBK perpendiculaire a la touchante ME qui agit contre le point E du rayon AE et par les points A et C, les lignes HAM, et CKB, parallele a EN et que AH soit egale a AD ou AE, si l'on considere HAM, et CKB, comme deux bras de la balance dans la

situation horizontale, et que le poids X soit suspendu en H, et le poids Z au bout de la ligne KE, et enfin le poids Y a l'extremité B de CB, le poids Z agissant egalement dans tous les points de la ligne comme en E M, ou en K, il est evident que pour faire equilibre entre X et Z, il faut que X soit a Z comme A M a A H; et pour faire equilibre entre Z et Y, il faut que Z soit a Y comme C B a C K; donc la raison du poids X au poids Y sera composée de celle de A M a A H ou A E et de celle de C B a C K qui est celle du rectangle A M, B au rectangle A E, C K, qui sont une raison d'egalité, car les deux triangles A M E, ou A M B, et C K B, sont semblables, c'est pourquoy A M est a A E comme C K a C B et le rectangle A M, C B est egal au rectangle A E, C K: le poids X doit donc etre egal au poids Y pour faire equilibre ce qu'il falloit demontrer.

Corollaire

De ce que je viens de demontrer de l'Epicycloide decrite sur le cercle B B pour base et pour cercle generateur D E dont le rayon A B se doit entendre de meme si l'epicycloide etoit decrite sur le cercle D E pour base et que son cercle generateur fust le

cercle BB qui a pour rayon CB, car le mouvement sera toujours egal dun coté au dautre.

Proposition III.

Comment on peut faire l'application du mouvement egal aux machines.

Soit le cercle BOL dont le centre en C et un autre cercle DEF dont le centre en A, sur le cercle BOL comme base, et pour cercle generateur DEF, soit decrit lepicycloide BVH et soit diuisé la circonference du cercle BOL en un nombre tel quon voudra des parties, comme icy en huit aux points BKL &c. et en chacun de ces points soit appliqué une portion de lepicycloide BVH en KI, LM laquelle soit la meme que la lepicycloide auoit été decrite en commencant aux points KL &c.



mouvement &c.

On peut prendre aussi une grande portion de
l'epicycloide quon voudra comme BVH et faire par
ce moyen moins de divisions au cercle. la figure
BVHG, sera celle dela dent d'une roüe qui
terminera par une ligne droite HG qui tend au
centre, C, du cercle ou par quelle autre ligne on
voudra, ce qui ne importe pas, puisque cette partie
dela dent ne doit faire aucun effet. on peut aussi
couper un peu lespace entre deux dents comme
DNO, affin de laisser plus de liberté a la rencontre
des parties de lautre roüe DEF.

On peut donc former une roüe sur le modele
de ce cercle avec ses dents et la faire mouvoir
sur le centre C,

Maintenant si lon applique une autre roüe
devisée celle ci dont le centre soit au point A-
dans la ligne horizontale AC, et q au lieu de
dents sur la circonference DEF, on applique
seulement dans ~~autre~~ creux le contour des cheuilles
DEF, qui que je suppose dabord indefiniment
petites et perpendiculaires au plan dela roüe; il
est certain par la precedente proposition que
dans quelque position quon mette la roue BOL-
dont les dents rencontrent les cheuilles de cette
roüe DEF, il y aura equilibre; elles seront mouvantes

appliqués aux circonferences de ces deux roües sont
egales entr'elles.

Soit donc pour cet effet un poids Q suspendu
à la circonference de la roüe BOL, egal au poids
R. suspendu et appliqué à la circonference de la roüe
DE, les deux poids demeureront donc toujours en
équilibre en quelque maniere que les dents de la
roue BOL rencontrent les chenilles de la roue
DEF.

Mais si l'on applique un poids P, à la circon-
ference d'une autre roüe ST qui ait son centre
commun avec celuy de la roüe BOL et qui soit attachée
avec elle, ce poids P dans ce poids Q comme CB a
CS. ce poids P sera encore équilibre avec le poids R
dans toutes les differentes rencontres des deux roües
car le poids P faisant equilibre avec le poids Q
il sera aussi equilibre avec le poids R.

Proposition IV.

Les choses etant disposés comme dans la
precedente, je dis qu'il n'importe pas que les divisions
de la roüe BKL soient egales entr'elles, en sorte
que les dents soient à egales distances l'une de
l'autre ni les chenilles DEF sur la circonference

de leur roüe.

Il n'importe pas qu'il y ayt une ou plusieurs dents de la roue BKL qui agissent tout ensemble sur les chevilles de la roüe DFF, car il n'y aura toujours que la même force qui sera appliqué contre celle de la roüe DEF; s'il n'y en avoit qu'une comme BVH, toute la force du poids P agiroit contre celle du poids R en rencontrant la cheville D; s'il y en avoit deux tout ensemble comme BVH et KI dont la premiere agit sur la cheville D, et l'autre sur la cheville E il est evident par la construction de ces dents que KI, feroit autant d'effort sur la cheville E contre le poids R, que BVH sur la cheville D contre le meme poids R, et par consequent l'effort du poids P se distribueroit également a ces deux dents donc chacune contrebalanceroit la moitié du poids R ce seroit la meme chose s'il y en avoit trois ou plus qui agissent tous ensemble.

Ainsi il n'importe point qu'il y ayt une ou plusieurs dents qui travaillent tout ensemble et il est indifferent quelle partie de la dent rencontre la cheville contre laquelle elle agit puisqu'elle y fera toujours une même effort, ce qui ce qu'il falloit demontrer.

Proposition V.

La Machine etant disposée comme cy deuant pour faire equilibre entre deux poids P et R. je dis que si lón augmente la force mouuante de la roüe BKL, ou bien ce qui en la meme chose, silon ajoute quelque poids Z au poids P, cette force ou ce nouueau poids agira egalement dans toutes les differentes rencontres de la roüe dentée EKL auec DEF, sur la force ou sur la puissance, ou enfin sur le poids R appliqué a la roüe DEF.

Puisque pour faire equilibre entre le poids P augmenté du poids Z, et le poids R, il ne faut qu'augmenter le poids R dun poids Y, qui soit au poid Z qui fait laugmentation du poids P, comme CS, a CB et alors les deux poids R et Y, ensemble faisant par tout equilibre auec les deux poids P et Z ensemble, il est euident quen quelque position que ce soit des deux roües; le poids Z fera toujours equilibre contre le poids Y. et par consequent les deux poids P et Z ensemble prendront toujours dune mesme force contre le seul poids R laquelle est mesurée par le poids Y. puisquil ne manque

que ce poids pour faire equilibre, ce qui-
falloit demontrer.

Proposition VI.

Il peut plaire la superficie des deux roües
dans un mesme plan, au lieu des cheuilles qui
etoient attachées sur la roüe DEF, on peut faire,
des dents a lextremité de cette roüe, et leur donner
quelle figure on voudra, mais alors les dents de
laultre roüe dont la figure doit en epicycloide,
doiuent auoir une figure composé de celle de lepicy
cloide, et de celle dela dent proposé. cette figure
composé de cette la formera comme je lex
pliqueray dans les exemples suiuans.

1 Exemple.

la plus simple de toutes les figures en la circulaire,
cest pourquoy je propose dabort la figure des dents
dela roüe BEF en cercle. soit la roüe BEF qui a
son centre en A, laquelle ait des dents de figure
circulaire comme BOP, et dont les centres soient du
cercle DGM qui ait son centre commun auec celuy
dela roüe A. soit le centre C de laultre roüe. ayant
mené la ligne droitte CA qui joint les centres des deux

roüe, et qui rencontre en B le cercle BEF, du
centre C, et pour rayon CD soit decrit le cercle
DI. sur lequel comme base soit formé lepicycloide
DVH qui a DGM, pour son cercle generateur.
maintenant si dautres les points DVH de lepicycloide
comme centres, on decrit des cercles ONL egaux au
cercle qui forme les dents dela roüe BEF, la ligne
courbe ONL qui touchera tous ces cercles et qui
sera parallele a lepicycloide formera la figure
dela dent de la roue BK, en adire la partie de
la dent qui agit contre la partie dela dent
circulaire quelle rencontre dans son mouuement
car pour les autres parties des dents qui ne se
rencontrent point, jay dja dit quon pouuoit leur
donner qelle figure on vouloit, mais on doit toujours
choisir celles qui rend plus fermes et plus propres
a resister a leffort du mouuement.



je dis maintenant que il ya des puissances

Egales appliquées a ces roües dans les distances de
leurs centres CD, AD, en quelque endroit que les dents
se rencontrent il y aura parfait Equilibre, il faut
seulement observer que les rencontres de ces dents
doivent etre toujours au dessous de la ligne AC.

Par la III. proposition en quelque endroit que
l'Epicycloide DVH, soit appliquée au point D, de la
roüe DGM, en le faisant mouvoir autour du centre
A, il y aura Equilibre entre les puissances Egales. —
Car si l'une des puissances faisoit mouvoir l'autre
elle luy feroit parcourir une espace Egal a celuy
qu'elle parcouroit elle meme. or par la Construction
de la dent ONL on voit que la ligne Courbe ONL.
rencontrant le cercle BZP, fait avant avancer le
point D, que si l'epicycloide DVH le rencontre
car la distance entre l'epicycloide DVH et la
Courbe ONL en par tout elle du demi diametre
de la dent circulaire BZP.

Par exemple que le centre de la dent D
soit venu en G, et que l'epicycloide DVH soit
placé en IG, son point G etant joint au centre
de la dent circulaire, il en evidence, que l'arc DI.
du cercle de la base sera Egal en longueur a l'arc
DG du cercle generateur DGM, mais alors la Courbe
ONL sera placé en, o,n,l, et la dent circulaire Enp, qui

et son centre en a touchera neccessairement au point
, n, la courbe o n l; car la plus courte distance du
point a de l'epicycloide a la courbe o n l, sera dans
le point touchant, n, du cercle E n p, et de cette courbe.
ainsi lorsque le point D de l'epicycloide sera
parvenu en 1, le point O de la courbe sera parvenu
en , o, tare O o, etant egal a tare D 1, et la courbe
o n l, qui rencontre la dent circulaire en n, aura
fait avancer son centre en a, sur l'epicycloide
1 D, et par consequent tare D G, sera egal en
longueur a tare O o ou D 1,

J'ay dit que les dents ne devoient commencer
a se rencontrer qu'au dessous de la ligne A C, c'est
a dire que la courbure O N L n'est propre pour
agir sur la dent circulaire que depuis que le
point O de la courbe O N L sera venu en D,
et par consequent cette courbe O N L ne
commencera a agir contre la courbe de la dent
circulaire qu'au point Z, ou elle en coupe
par le cercle D G M, et elle continuera toujours
a la rencontrer dans la partie Z P, en descendant
au dessous de la circulaire jusqu'a ce
qu'elle sorte de son mouvement, ligne A C. Or
pour que cette courbure rencontre toute la partie Z B de

la dent circulaire, pour qu'elle ne soit inutile dans ce
mouvement, et la terminer [illegible] cercle ZD, on
pourroit aussi terminer la dent de l'autre roüe
par la courbe LNO, et par le cercle OD qui
feroit le fond de la dent, mais dans cette construc-
tion on doit distribuer les dents de telle maniere
dans chaque roüe, qu'elles ne commence a se
rencontrer que dans la ligne AC, et qu'elles ne
s'embarassent pas les unes les autres, ce qui sera toujours
facile a faire.

On doit remarquer que la courbe LNO,
par laquelle la epicycloide commence tou-
jours hors le cercle ODI, et ensuitte qu'elle
entre au dedans, et enfin qu'elle en sorte le dia-
metre de son cercle generateur en plus grand
que OB, ce qui on [illegible] a demontré par la
generation de l'epicycloide, mais je ne considere
icy que la partie ONL, de cette courbe qui
est au dehors du cercle ODI, lorsqu'elle
en sort.

On doit toujours eviter dans les dents des
roüe de faire qu'elles travaillent au dessus de

la ligne AC, qui joint leurs centres, à cauze
que le frottement y en fort grand, et quaie
contraire il nest pas presque considerable au
dessous, je suppose aussi que le mouuement des roües
soit de dessus en dessous de la ligne AC. cepen-
dant selon que les dents de ces roües
trauaillent en se rencontrant au dessus de AC,
il faudra les former comme je lenseigneray
dans la suitte, apres auoir expliqué la methode
generalle pour former la dent dune roüe en
differentes manieres elle de lautre, etant toujours
donné la mesme..

11 Exemple.

Publier du centre D. de la dent circulaire
proposé, comme dans lexemple precedent, je
prens un autre point tel que je voudray comme
B sur cette dent, et par le moyen de ce point
je trouueray la figure de la dent BNN qui
doit trauailler auec la proposé; mais pour
faire que la dent proposé agisse ou trauaille
dans le plus de parties quil sera possible, on doit
choisir le point de cette dent qui peut etre le

plus proche du centre C de l'autre roüe dans le mouvement de ce point choisi autour du centre A, de la roüe auquel il est attaché et ce point sera le point B dans cet Exemple.



Du centre C et rayon CB soit decrit le cercle BK qui sera la base de l'epicycloide BVI, donc le cercle generateur en BGG, decrit du centre C, et qui a pour rayon AB, ensuitte du centre A ayant mené les rayons AG, du centre C, et pour rayons CG on decrira les cercles GV qui coupent l'epicycloide en V, et par les points V on menera les lignes VHI, qui feront les angles CVI, egaux aux angles CGA. enfin sur les lignes VHI, on appliquera la figure BZ de la deuxieme partie de la

meme maniere qu'elle en appliquée a la ligne
AB, en faisant convenir le point B, au point V, -
et lon tracera la ligne courbe BNN qui touchera
les courbures de la dent proposée dans toutes les positions
differentes ce qui revient a la meme chose pour
le cercle, que si lon prenoit sur VH les grandeurs
VH egales a BD, rayon du cercle de la dent pro=
posée, et que des points H pour centre on decrivit
les cercles N egaux a ceux de la dent.

On voit manifestement par cette formation
de la courbe BNN que dans quelque position quelle
rencontre la dent circulaire, le point B de cette
courbe BNN, dans au dessous de AC, il y aura
partout equilibre entre deux puissances egales
appliquées a ces roües dans les distances CB, AB, de
leurs centres CA; car on demontrera comme dans
lexemple precedent que dans quelque position que
la courbe BNN, soit appliquée a la dent cir=
culaire, elle sera en disposition de faire parcourir
au point B sur le cercle BG un espace egal a
celuy que ce meme point B, parcourt sur le
cercle BK, par exemple si le point B, a parcouru
lespace BK sur le cercle BK, ce meme point B
sera venu en G par le moyen de lequilibre

BV, qui sera posée en K u, ainsi la courbe BNN
sera placé en K n, et son point N sera appliqué
au point, n, dela dent circulaire BZ transportée
en G n, qui aura son centre en, h, sur AG, et
par conséquent la courbe K n, qui agit sur la
dent circulaire G n, au point, n, fait autant autant
le point G, que fera l'épicycloide si elle etoit
placée en K G, et jointe ala courbe K n.

Il en faut de même voir que si la dent dela roüe
BK en formé comme la courbe BNN, elle
commencera a agir sur la dent circulaire,
BZ au point B sur la ligne AC, car aussitot
que le point B dela courbe BNN sera parvenu
a AC, et quil touchera le point B. dela dent
circulaire, les deux dents commenceront a agir lune
contre lautre et a mesure que la dent BNN,
descendra les points differents N / s'appliqueront
en differens endroits dela dent circulaire BZ.

On remarquera que si lon prend les
lignes VH1, égales a BA, tous les points 1 seront
dans la circonference du cercle A11, qui a son
centre en, C, et de plus que tous les points 1, seront
les centres du cercle generateur de lepicycloide
dans les differentes positions ou il devra les -

On peut enfin prendre le point B pour le commencement de lepicycloide en quel endroit on voudra, ou au dedans ou au dehors de la dent au lieu de le prendre en B sur la courbure de la dent proposee comme on a fait dans cet exemple et lon trouvera toujours une courbure pour la dent qui doit travailler avec celle qui a été proposé, et qui doit faire pour tout equilibre entre deux puissances egales, ce que lexpliquerons dans les exemples suivans.

III exemple.

Soit la dent rectiligne ZD qui fait avec le rayon AZ langle constant AZD et soit le point D de cette dent qui doit commencer a travailler avec la dent de lautre roue BK. ayant pris quelque point B dans la ligne ADC, qui joint les centres et qui passe pour le point D determiné quon y a placé en faisant mouvoir la dent AZD sur son centre A. ou bien si le point D netoit pas determiné sur la dent ZD et quon eut donné le point B de position par rapport a la ligne ZD,

a quon eut donné le point F on trouvera par rapp.
a la ligne ZD ou a langle AZD ayant mené AB
qui coupe ZD en D, on posera la ligne AB sur la
ligne AC, et on decrira le cercle BK du centre C,
et pour rayon CB. ce cercle sera la base de lepicycloide
BHM dont le cercle generateur en BG decrit de
centre A sur le rayon AB.



Ensuitte a tous les points a du cercle BG ayant
mené les rayons AG, et du centre C et pour rayons
CG ayant decrit les arcs de cercle GV qui rencontrent
en V lepicycloide BVM, je mene, CV, et ensuitte VHI,
qui fait langle CVI egal a langle CGA sur VI
japplique la ligne HZ de la mesme maniere que
DZ en appliqué a BDA, en disant que VH en
prise egale a BD et que langle VHZ en egale
a langle BDZ. les lignes Hz, se trouvant coupant
toutes on menera une ligne courbe DN qui les

touchera, et la DN sera la figure de la dent
que lon cherche et qui doit etre appliqué a la
roüe BK.

Il est Evident par ce qui a été demonté cy-
devant de la formation des secondes dents sur les
premieres qui sont données que la courbe DN de
la dent appliqué a la roüe BK rencontrant la
dent rectiligne DZ. au dessous de la ligne AC,
et commençant au point D, fera par tout a-
quilibre entre deux puissances egales appliqués
a ces deux roües dans les distances de CB et AB en
adire aux extremités de leurs rayons, car si lon
suppose que la ligne CB ayt transporté le point
B, jusques K, la epicycloide BVM, sera placé en
KG, et la ligne AB sera placé en AG, en-
sorte que l'arc BG, sera egal en longueur a l'arc
BK par la propriété de la epicycloide, mais
alors dans cette position la dent sera en A.S.D,
et la courbe DN etant porté en E.n, son
point, n, qui est le meme que le point
N touchera la dent en, n, et comme dans
tous les points comme G et K, le mouvement
sera egal il y aura aussi partout equilibre

entre les puissances égales.

ON remarquera qu'on ne doit pas déterminer la longueur de la face rectiligne ZD de la dent vers D, car il pourroit arriver dans quelque cas que la courbe DN ne pourroit pas être touchante à toutes les lignes HZ, car ces lignes HZ ne s'entrecouperoient pas, leur extrémité H étant déterminé, et ne rencontrant pas la suivante, et si l'on menoit la ligne courbe DNN par tous les points comme H, il arriveroit qu'il n'y auroit que l'extremité D de la dent qui travailleroit et qui ne laisseroit pas de faire le mouvement égal mais ce n'est pas ce que l'on sert proposé icy.

IV^e^ Exemple.

On peut faire encore une autre sorte de dent rectiligne dont la face tende au centre de sa roüe, et par ce moyen la dent qui agira contre celle cy n'aura pas sa face si inclinée au cercle sur lequel elle est attachée que dans les exemples precedens à cette

forme de dent en vne des plus faciles a executer dans les grandes machines et des plus commodes pour le mouuement



Soit la face FD de cette dent rondelle qui tende au centre A de la roüe et qui soit posée dans la ligne ABC, qui joint les centres des roües. par quelque point B de la ligne AC, et du centre C, soit decrit le cercle BK qui est la base de l'epicycloide BV, dont le cercle generateur en BG decrit du centre A. et du rayon AB, ayant mené tous les rayons AG et les lignes CG. qui soient les rayons des cercles GV, qui rencontrent l'epicycloide en V, on fera langle CVI egal a langle CGA, enfin on menera la courbe DNN, qui touchera toutes les lignes VI dans leurs differentes

positions, et qui sera la figure de la dent qu'on doit appliquer a la roüe BK. cette dent DNN rencontrant la face FD, dans toutes les differentes positions, fera partout Equilibre entre deux puissances Egales appliquées a leurs roües dans les distances de CB et AB, car la courbe DNN etant posée en, dn, qui en touche au rayon CK, et rencontrant la face AFD de la dent proposé en, n, dans la position AG, fera le meme effet sur le point G, que l'epicycloide DV, placé en KG comme je l'ay fait voir fort au long dans les exemples precedens.

Il en faut de meme parce que j'ay expliqué cy devant, qu'il ne sera pas plus difficile de former la dent que l'on cherche, celle qui est donnée etant de toute autre figure que la circulaire ou la rectiligne, comme parabolique, hyperbolique et meme en Epicycloide.

Proposition VII.

On peut decrire l'epicycloide sur une base qui sera Concentrique a la roüe qui porte la dent proposé, et par le moyen de cette Epicycloide

on trouuera la figure dela seconde dent comme dans la proposition precedente.

Soit ZD dela figure dela dent proposé qui en appliqué ala roüe Z dont le centre en A. et sur cette premiere dent soit marqué le poinct D, qui doit commencer a trauailler auec la seconde dent, quon doit appliquer a lautre roüe. Soit placé la dent Z.D en la faisant tourner auec sa roüe au tour du centre A, en sorte que son poinct D soit sur la ligne AC, qui joint les centres des deux roües, dans cette position dela dent ZD ayant marqué quelque poinct B oulon voudra sur la ligne AC, du centre A et pour rayon AB on decrira le cercle BG — qui sera la base de lepicycloide BV dont le cercle generateur en BK decrit du centre C, et du rayon CB.

Il en suidera par ce qui a été demonstré cy deuant que lepicycloide BV etant attaché au rayon AB fera autant auancer le poinct B du rayon CB, que ce mesme poinct B auancera sur le cercle BG, dans quelque position que soit lepicycloide, comme si elle en transportee en GK, laire BK sera egal en longueur a laire

B G, et cela etant par tout de meme la difference de ces arcs sera aussi egale en longueur; en sorte que si l'epicycloide en placée en G K. le point G ne sauroit sauancer de quelque espace que ce soit sur son arc B G qu'il ne face autant auancer le point K sur son arc B K.



Maintenant autour les points K du cercle B K. ayant mené les rayons C K et ensuitte A K et du centre A et rayon A K ayant decrit l'arc K V qui coupe l'epicycloide en V, et la ligne A C, en F. on fera l'arc K L. egal a l'arc V F et l'on menera L A qui coupera l'arc B G en G; dont il est euident que la portion B V de l'epicycloide peut etre accommodé en G K.

Ayant fait l'angle C B I egal a l'angle C K A. et B I. etant egale a K A on fera aussi l'angle B I 9,

egal a langle KAG, et sur gI. egale a AB ou
a AG on appliquera la courbe ENz dela dene
DZ donné dela meme maniere quelle on appliqué
sur BA, comme si on ly avoit transportée ensorte
que le poinc B soit posé en g et le poinc D en E.

Enfin la courbe dela dene proposée dans toutes
les positions differentes formera un autre courbe
NND, par une ligne qui les touchera toutes
qui sera la figure dela fronde dont que lon
cherche, et qui doit etre appliqué ala roüe
BK ou au rayon CBD dela maniere quelle on
decrite.

Il est evident que cette courbe NND fera
autant avancer le poinc B. sur bn arc
BG, que ce meme poinc G, B, savancera
sur BK, car lors que le poinc B sera placé
en K la courbe ND fera avancer la dene
ZD en Snd, parce que le poinc, n, de cette
courbe qui rencontre la dene dans la position
Snd la rencontre dela meme maniere, et dans
le meme endroit que le poinc N qui la
formé; ainsi le pricycloide sera dans la
position GK et par consequent deux parties
egales etant appliquées a ces deux roües dans les

distances de leurs Rayons AB, CB, ils agiront plus tout également et feront équilibre dans toutes les rencontres des dents des deux roües.

Proposition VIII

Application d'une Roulette au lieu de dent a la roüe dune machine.

J'ay fait remarquer dans la proposition sixieme que la seconde dent ne doit commencer a travailler avec la premiere que sur la ligne AC parce que les roüis ayant leur mouvement du dessus au dessous de cette ligne les faces des dents qui se rencontrent en secartant lune de lautre ne se frottent quen glissant ce qui n'apporte pas un empechement sensible a dans le mouvement, au lieu que lors que le frottement se fait par la rencontre des parties qui rentrent lune sur lautre, il empeche le mouvement en fort considerable et cest ce que lon doit

principalement entier dans les machines.



Voicy vne construction particuliere pour les dents des roües dune grande machine. ou les faces qui se rencontrent ne font que se toucher sans frottement, et de qui en outre ne se fait que sur vn axe ou pivôt.

La construction de ces dents est la meme que celle du premier exemple de la proposition VI, mais l'application en est differente, dans la proposition VI, la dent circulaire est proposée en arrestée sur la roüe, mais dans celle cy est vne roulette qui est mobile autour de son centre D, sur vn aissieu ou cheville placée a lextremité du rayon AD. et-

n'y aura donc point dans cette machine d'autre frottement que celuy de la roulette BZP, sur son aissieu, car sa circonference s'appliquera par tout sans frotter sur la courbe de l'autre dent ONL.

Il est evident que cette application de roulette ne peut apporter aucun changement a ce que j'ay demontré de la dent circulaire dans la proposition VI. et que l'effet de la machine sera le meme. car il n'importe pas que la courbe ONL. rencontre le cercle OZP, de la roulette ou de la dent qui a meme figure, puis que son centre O fera toujours le meme chemin.

Proposition IX.

Construction d'une machine pour eleuer de l'eau. sur la forme precedente.



LMOI, est une grande roüe faite de grosses

pieces de bois assemblés les unes avec les autres a
laquelle on posé horizontalement, laxe ou larbre
AB de cette roüe en une grosse piece de bois qui
le meut par le bas sur son pivot p sur une
crapaudine, etant seulement entretenue par le
haut dans une moise affin quil demeure toujours
a plomb., cette roüe et dentée ou ondé par le
bord a la maniere des roüis de rencontre des
horloges ordinaires, et il ny a que cinq dents comme
O I, qui agissent en passant par dessus la roulette
H S qui est mobile sur son aissieu, C. cet aissieu
tient au bras D C, qui est aussi mobile au tour de
son aissieu D, lequel est arresté ferme a quelque
assemblage, le bras D C, est joint et attaché a la
portion du cercle D E F. ensorte quils ne peuvent
se mouvoir lun sans lautre. sur lepaisseur de
laxe E F, il y a une double chaisne platte H G, =
attachée vers le haut en E, et cette chaisne a deux
anneaux a son extremité qui soutiennent laxe
de fer qui porte le piston dune pompe ou foulante.
le leuier ou bras N, de cette machine passe
dans larbre en B, et peut etre arresté plus lon
ou moins a la roüe pour etre plus ferme, il y a
deux roulettes comme celles que je viens de dire

qui sont opposés diametralement sous la roüe et qui doivent toujours agir alternativement, car par la disposition des roulettes lorsque lune se trouve dans le fond ou creux de londe, lautre se trouvera sur le haut. mais la roüe tournant de O en 1. la roulette descendra dans la rencontre de la partie O Q de londe et elle remontera dans lautre. on ne doit considerer que la partie O Q de londe, car il ny a que celle la qui travaille pour faire baisser la roulette qui éleve le piston de la pompe refoulante, et qui soutient tout le poids de leau, la roulette remontante dans lautre partie de londe ne fait aucun effort contre la roue car elle suit seulement la sinuosité de la donc netant elevée que par la pesanteur du piston - et de son axe et du triangle D E E qui retombent en bas par leur propre poids quon peut rendre a peu prés egal a celuy de la roulette.

Tout leffort de la roüe ne se fait que par la pesanteur entiere que si elle est aussi - pesante que le poids de la colomne deau quón doit soutenir dans le corps de pompe, la distance des leviers etant compensé, il est evident quelle ne fera pas un frottement considerable sur son pivot p; mais il faut quelle soit toujours plus pesante

qu'elle ne puisse pas sortir de la crapaudine,
car autrement elle travaillerait sur les
deux roulettes tout a la fois, ce qui fait
buter.

Le nombre des dents de cette roüe doit
etre impair, afin qu'il y ait toujours une des deux
roulettes opposées qui travaille et que la puissance
qui meut le levier N jagnisse toujours également
et non par sauts, comme il arrive a la plus part
des machines qui nont qu'une ou deux roües, car
en cela que consiste la principale adresse
de la construction des dents et de la position
des roulettes: car quoique lon suive toujours
la regle dans la forme des dents, il faut
avoir egard aux proportions de la hauteur
et de la longueur des dents avec le diametre
de la roüe.

On doit remarquer quil nest pas possible
que la face des dents ou des ondes de la roüe
travaille par tout sur la roulette a lgale
distance de laxe de cette roüe, a cause que le
mouvement de la roüe est circulaire et horizontal
et que celuy de la roulette est vertical ou a plomb,
car il arrive que lorsque les dents rencontrent la
roulette en egalement eloignée de laxe de la roüe

il en sera plus proche quand la roulette sera dans
la moitié de sa descente, ce qui sera facile a
connoitre, dans le plan: cette difference d'eloignement
causera un peu de frottement de la place de la dent
avec celle de la roulette; mais ce sont de ces
defauts qu'il n'est pas possible d'oter entierement
dans les machines, et l'on doit regarder celles qui
en ont moins, ou de moins considerables comme
les plus parfaites.

POUR la construction des dents de la grande
roüe de cette machine, on les doit considerer
comme si elles etoient dans le meme plan que celuy
de la roulette, et quand on en aura determiné la
figure, on l'appliquera sur la roüe a l'endroit ou
la roulette la rencontre en la servant d'un profil
ou calibre taillé de la figure de la dent.

Ayant donc determiné le centre D du mou-
vement du bras DC de la roulette RS, et la
grandeur DC, de ce bras, du centre D et pour
rayon DC, on decrira le cercle CE auquel on
menera la ligne touchante ABC, en C; sur
la ligne BA pour base, et pour cercle genera-
teur CE, on decrira la cycloide CVV et par
tous les points VV comme centres on decrira

les cercles N egaux a celuy de la roulette; je
dis que la ligne courbe SNN qui touche tous
ces cercles sera celle de la figure de l'onde.



Si l'on s'imagine que la ligne droitte BA
se meut de B vers A sur elle mesme avec la
cycloide CVV qui luy est attachée, il est evident
que chaque point B de la ligne BA fera autant
de chemin que le point C, en fera autour du
centre D etant meu par la cycloide VV. car si
le point C de la ligne BA est transporté en T par
l'espace CT, la cycloide CV sera placée en TE.
et le point C sera parvenu en E sur l'arc de
cercle CE; mais par la generation de la cycloide
l'arc CE est egal en longueur de la ligne droitte
CT, sur elle mesme et l'autre fait mouvoir le point
C autour du centre D, feront pour tout l'equilibre

car on doit considerer la ligne droite BA comme la circonference dun cercle dont le centre est a linfiny.

Mais maintenant si au lieu du point C du rayon DC, on applique la roulette circulaire RS, qui a son centre en C, il est evident par la construction de la courbe SNN, quelle fera le meme effet sur le centre C de la roulette rencontrant sa circonference, que si la cycloide CVV rencontroit seulement ce point C: car le centre C dans posé en E le point N de la courbe SNN sera posé en n, en sorte que En, sera la plus courte distance du point E a la courbe.

Dans la construction des dents de cette machine on ne se sert pas de toute la courbe SNN, formé sur la cycloide entiere, mais seulement dune partie et de celle quon voudra, car autrement il faudroit que les ondes fussent trop grandes . on peut donc prendre par exemple la partie du milieu NX, de toute la courbe SNXE, qui est formé sur la demy cycloide CVI ainsi le fond de la roue sera formé par le cercle de la roulette dans

la position NZP, et sa pointe sera au point X.
on pourra donner a peu prs la mesme figure
a la partie de londe qui remonte et ne travaille
pas ; affin que la roulette puisse rouler plus
doucement en remontant dans le fond.



ON doit remarquer que lorsque la roulette sera
parvenue a lextremité X de londe, le centre M de la
roulette nest pas le plus eloigné quil peut etre
du point X, cest adire que la ligne MX nest pas
perpendiculaire a BC, mais comme le point X
doit etre une ligne parallele a BC, il travaillera seul
sur la circonference de la roulette jusqua ce que le
point M soit parvenu dans la ligne MX perpen-
diculaire a BC, le cercle M de la roulette decrira
donc dans cet endroit un petit arc de cercle egal
a celuy de la roulette et il arrivera que le point

X de londe semouvera un peu dans la fuitte du
travail, ce qui narriveroit pas si lon se servoit de
toute la courbe NXF, car londe ne feroit pas une
pointe a son extremité F comme au point X, a
cause que la touchante de la courbe en F est
parallele a BC, il est evident que le travail du
point X seul durera dautant plus de temps que la
roulette sera plus grande, car lair que le point
M decrira sera plus grand pour amener ce point
M, dans la ligne droite pour X perpendiculaire a BC,
que si le rayon de la roulette etoit plus petit, il y a
encore une incommodité dans la grande roulette
car elle fera de plus grands balancements
d'un coté et d'autre sous londe, a cause quelle
se meut sur deux points, dont l'un en son
pivot, et l'autre en celuy dubras et de la
portion de cercle qui porte la chaisne
ce qui ne seroit pas si considerable dans
une petite roulette. mais si la roulette
etoit fort petite il faudroit prendre une plus
grande portion que la courbe NN pour
former londe, afin d'avoir toujours
la meme elevation dans le piston
de la pompe.

Il en faille a voir que la chaisne qui en attachée a la portion de cercle sert a faire clauer le piston toujoods a plomb ; ce qui en dan - ger bon usage dans ces sortes de pompes ; car autrement la caisse qui porte le piston etoit seulement attachée avec levier mobile autour dun aisieu comme il y a dans cette machine, il arriveroit que le piston seroit tiré tantot dun coté tantot de laitre, et frotteroit inegalement dans le corps de pompe en travaillant ce qui le gasteroit en tres peu de temps, comme je lay remarqué en quelques rencontres.

Propsition X.

On peut aussi appliquer les mesmes constructions aux aisles ou bras de larbre des moulins qui ont leur roüe verticale et qui sont a poudre, a papier a foulon, a forge, &. ou il faut eleuer des pistons ou pilons, a peu pres comme on le voit representé dans cette figure suivante.

Elle represente seulement icy deux de ces pistons, mais on en peut mettre autant quon voudra

ou autant que le moteur de la roüe en pourra faire marcher : il faut toujours mettre deux aisles opposées comme A, B, et C, D, pour travailler sur chaque piston, afin que lorsqu'une de ces aisles comme B aura quitté la roulette E du bras du piston et qu'il en tombé aussitot l'autre aile A qui en opposé, a B commence a le relever.



6, Il faut aussi observer que s'il y a deux pistons, il faut que les aisles qui appartiennent a chacun soient appliquées alternativement a l'arbre de la roüe, comme on le voit icy ou l'arbre en a quatre parce a cause qu'il y a quatre aisles et deux pistons, et ou les aisles A et B sont appliquées a deux faces opposées a l'arbre, et les deux autres aisles C et D qui appartiennent a l'autre piston sont appliquées aux deux autres faces opposées

de ce mesme arbre. s'il y auoit donc trois pistons
de six ailes, il faudroit tailler l'arbre à six pans, et
s'il y en auoit quatre il faudroit y en faire huit, a
moins qu'on n'appliquast deux pistons sur une
mesme face, et alors il ne faudroit que la moitié moins
de face à l'arbre, mais il faudroit obseruer de ne
pas mettre de suitte les ailes qui seroient
appliquées a la mesme face, mais de les entremesler
avec celles a fin que l'effort se distribuat
egalement sur l'arbre c'est a dire que les pistons
deux ne fassent pas de suite.

je ne represente dans cette figure qu'une des
manieres de rendre le mouuement egal qui en
donne une figure courbe aux ailes qui
sont attachés a l'aisseu de la roüe et de mettre
des roulettes au bout des bras des pistons; quoy-
qu'il y en ayt encore une autre en faisant les bras
des pistons de figure courbe, et en appliquant
les roulettes au bout des ailes droites de l'arbre
ou aisseu de la roüe; mais j'expliqueray ces deux
manieres dans la construction de ces courbes.

je ne donne pas icy tout l'assemblage de cette
machine ni la maniere d'en fortifier toutes les pieces
cela alla bien de ce qui regarde la mechanique d'un

faire voir la disposition, le reste apartenant
a l'art de charpenterie.

Premiere maniere.

Cette premiere maniere d'appliquer
la courbe a cette machine en elle-
en representée dans la figure precedente.
Soit le point C, le centre de l'arbre de
la grande roüe et CA, la distance depuis
ce centre jusqu'au manche des pistons
sur la ligne droite CA ayant determiné
le point B, qui en l'extremité AB des
bras du piston, et qui en le centre de la
roulette qu'on applique a l'extremité de
ce bras et du centre C, et pour rayon
CB, ayant decrit le cercle BD, on formera
l'spiroyde BVV, sur ce cercle BD, pour
base, le cercle generateur ayant son centre a
distance infinie, c'est a dire, que la circonference
de ce cercle en une ligne droite, et que
l'spiroyde BVV, en la derniere de toutes

qui est aussi la ligne courbe decrite par lévo-
lution du cercle, comme je lay remarqué cy-
deuant.



Ensuite de tous les points V de cette epicycloide
ayant decrit des cercles N egaux au cercle EF de
la roulette, la courbe ENN, qui touchera tous
les cercles sera la forme du bras de larbre de la
roüe.

En suiuant la meme methode de demonstra-
tion dont je me suis seruy cy deuant, il est euident
quen quelque position que soit le bras ENN,
de larbre en tournant au tour aussi C, il
y aura toujours egalité de mouuement entre le
centre de la roulette qui est clouë a plomb et le
point B qui se meut autour du centre C. Car
si le centre de la roulette B est transporté en H

suivant la ligne BH parallele a AG et perpendiculaire a AC, par la courbe ENN transportée en Lnn, autour du centre C, il est evident que le point H se trouvera sur l'epicycloide BVV, transportée en KH avec la courbe ENN transportée en Lnn; car la plus courte distance du point H a la courbe Lnn, sera egale au rayon de la roulette EF, mais par la formation de l'epicycloide BV ou KH l'arc BK de sa base sera egal a l'arc de son cercle generateur qui en rey la ligne droite BH qui représente aussi le chemin du centre B de la roulette pendant que ce meme point B a decrit l'arc BK. mais les chemins BK et BH etant egaux et les puissances egales appliquées en B font tirer agir a l'extremité B du levier CB, et l'autre a l'extremité B du levier infini BA. on determine a quelle distance on voudra en A, car la longueur des leviers ne doit pas etre considerée quand les puissances sont appliquées directement l'une a l'autre, il s'ensuit qu'il y aura par tout equilibre entre les deux puissances egales.

On ne consulte point icy les frottemens du manche du piston au long de sa coulisse pour le faire aller a plomb, car on suppose que ces corps sont infiniment polis, et que les frottemens n'empechent en aucune façon le mouvement, ce que j'explique fort au long dans un traité que j'ay composé sur cette matiere.

Deuxieme Maniere.

Dans la Seconde maniere il faut que le bras du piston soit de figure Courbe, et que la roulette soit appliquée a lextremité du bras de larbre de la roüe.

Soit donc comme cy deuant le manche du piston AG et le centre de larbre C, ayant mené la perpendiculaire CA sur AG, on marquera sur AC, le rayon AB de la roulette, et par le poinct B on tirera la ligne BE parallele a AG qui sera la base de la cycloide BVV dont le cercle generateur aura la grandeur CB pour rayon. Si de tous les poincts V. de cette cycloide on decrit des cercles N egaux a celuy de la roulette, la ligne courbe NN qui touche tous ces cercles sera la figure du bras Courbe qu'on doit appliquer au manche du piston.

Il est evident par la generation de la cycloide que si lon fait mouvoir la cycloide BV, sur la base BE en quelque endroit quelle soit placée comme en E D H, lextremité B du rayon CB etant transportée par la cycloide en D, lare BD, sera egal en longueur a la ligne droite BE de la base; mais si au lieu de la cycloide on employe la Courbe NN on voit clairement

Comme dans les propositions precedentes que cette courbe fera faire le meme chemin au point B de l'extremité du rayon CB en rencontrant la roulette AE. qui a son centre en B. car la courbe, n,n, qui rencontre la roulette ne peut faire dauantage son centre que dela distance de ce centre ala cycloide qui est celle du rayon dela roulette.. nait comme les mouuemens sont par tout egaux il y aura equilibre entre les deux puis[illegible] les appliquez comme dans lexemple ci dessus, qui ne demande pas vne plus longue explication apres ce que iay dit des autres machines.



Il y a seulement dans ce cas vne difficulté pour la construction de cette machine, car comme il faut que la roulette prenne le bras du piston dessus par dessous, si le bras de laibre qui porte la roulette etoit

droit ; il rencontreroit la courbe auant que la
roulette la touchas ; il faudra donc courber ce
bras a peu pres comme la ligne HKD le montre
afin que la roulette commence a rencontrer la courbe
FNN, quand son centre B sera dans la ligne CA.
mais comme il est difficile de faire ces sortes de
courbes HKD, si ce n'est auec des fers, on pourroit
aussi le seruir d'un bras tout droit qui portaroit le
centre D de la roulette ; mais alors il faudroit que
ce double, et que la roulette fut appliquée
entre deux a l'extremité, et le bras double de
piston FNN passeroit entre ces deux pieces droites
qui porteroient la roulette.

Il faut obseruer icy comme dans toutes les autres
machines que la roulette soit petite, car lorsque
le bras courbe qui la rencontre cesse de trauailler
par une ligne perpendiculaire menée du centre
de la roulette a cette courbe il deuroit cesser de
la rencontrer, ce qui n'est pas possible a cause
qu'on ne se sert que d'une partie de la courbe.
il arriue donc que l'extremité de ce bras trauaille
encore par la pointe sur la roulette, on la faisant
tourner sur son centre jusqu'a ce quelle soit entierement
echappée, et dans ce moment l'equilibre entre
les puissances ne se trouue plus ; ce qui ne doit

deffaut dela machine, quon ne peut suiter
quon ne peut diminuer quen faisant la roulure
dun peu diametre.

Proposition XI.

De la longeur a dela disposition des dents
des roues.

J'ay dja demontré quil nestoit pas necessaire
que les dents fussent egalement distantes sur la
roue lorsquelles ont la figure regulliere quelle
conuient pour agir toujours egalement bien sur lautre
soit quil nyen ayt quune, soit quil y en ayt plusieurs
qui travaillent, les puissances appliquées a ces roues
agiront toujours dans la meme raison lune a
legard de lautre. mais il faut prendre garde que
lorsquune dent comme ONL laquelle on coupé en L.
cesse de travailler sur lautre
dent PZ, cella dire lorsquelle
touchante en L dela courbe
ONL, en outre touchante au
meme point L dela courbe
PZ, delautre dent, il faut quil
y en ayt deja deux autres des
deux roues qui travaillent ensemble; car
autrement lextremité L dela dent NL, rencontrant



encore par son seul point L la courbe PZ, ne la feroit par mouuoir comme auparauant, et les mouuemens des deux roües ne seroient plus egaux entre eux; il nen pas possible dans ce cas de rectifier ce mouuement en cherchant la figure qui conuiendroit aux dents de la roüe A. pour faire que le point L trauaillat egalement sur la dent PZ dans le meme point ou elle a deja été rencontré par la courbe NL. mais lorsquune autre dent commence a trauailler ou quelle trauaille deja quand le point L cesse de trauailler regulierement sur la dent PZ, ce point L cesse aussi de rencontrer la dent PZ, parceque la roüe a laquelle elle est attachée est mûe toujours dun mouuement egal par la rencontre des autres dents de la roüe, C qui luy font faire plus de chemin que ne feroit le point L tout seul; car cette roüe A fera toujours le meme chemin que si la dent PZ etoit rencontré par la courbe ONL. prolongée. le point L sceartera donc alors de la dent PZ et ils ne trauailleront ensemble quautant quils pourront y trauailler regulierement ce qui est un des plus grands auantages de la machine.

On doit aussi bien prendre garde que les dents dune roüe ne rencontrent pas celles de la seconde roüe

au dessus des poins ou il doivent commencer
travailler, en adirez vers A, au dessus de la ligne
AC, qui joint les centres des roues pour les raisons
des frottemens, comme je lay deja remarqué ey
devant, car les frottemens qui se font des corps
qui rentrent lun sur lautre sont toujours tres
grands, et aux au contraire qui se font en
echappant sont tres peu considerables. Ce pourquoy
on doit disposer les dents de telle maniere quelles
ne s'embarassent pas avant que de commencer
a travailler et ne leur donner quune longueur
et une profondeur convenable pour pouvoir
se degager facilement lune de lautre.

On remarquera encore comme j'ay fait
que la partie de la dent qui ne travaille pas
peut avoir telle figure quon voudra et quon
doit seulement chercher, celle qui luy donne plus
de fermeté et qui peut servir au degagement.
cependant il en est a propos comme font les
ouvriers dans les montres ordinaires de donner
aux dents une meme figure des deux coste
tant pour les accoutumer a faire ces dents
toutes egales, que pour servir aussi aux mou-
vements des roues, quand on les fait tourner dun
sens contraire a celuy qui leur est naturel

pour l'usage de la machine, et qu'on en obligé de faire aller souvent en la construisant et en la demontant.

Examen de la courbe formée par les rayons reflechis dans un quart de cercle.

Il y a déja plusieurs années que monsieur de Tschirnhaus ayant eu l'agrement du roy pour assister aux conferences de l'académie des Sciences, il y fit voir quelques nouvelles decouvertes qu'il avoit faites dans la geometrie. mais comme la chose dont il s'agissoit regardoit les quadratures de quelques lignes courbes et leurs touchantes et que l'on ne pouvoit pas facilement expliquer dans les assemblées; la Compagnie commit Monsieur de Cassini, Monsieur Mariotte et moy pour examiner en particulier les propositions de monsieur de Tschirn. nous nous assemblames pour ce sujet a l'observatoire et monsieur de Tschirn. nous montra d'abord ce qu'il avoit trouvé touchant la ligne courbe qui se forme par les rayons reflechis qui tombent

Dans vn quart de cercle parallelement a lun de ses demi diametres : il nous proposa une generation particuliere de cette ligne par vne autre voye que par la reflexion des rayons et ensuitte il nous voulut demontrer quelle etoit la grandeur de cette ligne courbe par rapport au diametre du quart de cercle dans lequel elle se decrit, mais comme la methode dont il se servit pour sa demonstration etoit vne espece d'evolution fort differente de celle des autres, nous fusmes surpris de voir qu'il se servit dans son traité des pendules, et qui ne nous sembloit point geometrique, n'ayant pas demontré quelque lemme qui devoit preceder cette evolution, on termina les conferences particulieres sans aucun de nous demeurer d'accord de la verité de la proposition de monsieur de Athirni ; pour mon particulier j'insistay fort sur ce qu'il pouvoit trouver une autre voye de demonstration que celle de l'evolution dont il se servoit ; si sa proposition etoit veritable, et je l'assuray qu'il auroit pu meme la demontrer a la maniere des anciens, mais il soutint toujours que s'il avoit pu trouver cette demonstration par la meth. des des anciens il auroit eu a meme tems la quadrature de cercle. Depuis ce tems la il a fait imprimer dans les

Journaux de Lipsic de l'année 1691 page 364.
la proposition qu'il nous auoit faite sur la ligne
courbe qui est formé par les rayons reflechis dans
vn quart de cercle, y ayant donné ces litres Inuenta
noua, exhibita parisiis Societati Regiæ Scientiarum
a D. Ol. ce qu'il explique ensuite en ces propres
termes auec les figures suiuantes

Vt conceptus qius magis Exprimatur, per-
radios MV, OV, RV, &c. repræsentat radios solis
incidentes in corpus aliquod concauum (vide
fig: 1:) OC, RF, SG. exhibent
radios reflexos; qui efficiunt
infinitas intersectiones in
punctis ACFGH. &c. adeo ut
formetur hinc poligonum
constans ex lineolis, AC, CF,
FG, GH &c.



Verum si distantiæ illæ. MO, OR, RS, &c. concipi-
antur infinitè exiguæ, poligonum ACFGH &c. exhibebu
lineam curuam cujus tangentes erunt radii reflexi
et punctum A. erit focus in quo radii reflexi in
corpore concauo comburuntur, (lege comburunt).

Interim quia non sufficeret, si quis observauerit
saltem hinc lineas curuas sic formari, nisi et
scientifice determinetur, cujus sint naturæ: methodum
exhibeo generalem, ope cujus curuæ talis formatæ
ex intersectionibus radiorum reflexorum geometricè

possint determinari; et ut exemplum cujus
methodi hujus generalis, in specie tantum descripti
tionem curvæ illius, qua formatur a radiis solaribus
in speculo ordinario sphærico, hac ratione.

Sit data quarta pars quadrantis CDE fig: 2.
describatur semi circulus AGE, hoc facto ducatur
linea quacumque, veluti FD, parallela ad AC;
tunc pars DG intercepta
intra quadrantem CDE et
semicirculum AGE, secetur
bifariam in puncto H; et
sic pretendit autor quod
punctum hoc H sit aliquod
ex infinitis qua constituunt
curvam BHE a radiis reflexis
formatam; ex que sequitur quod focus B debeat esse
in loco medio radii AC.



Monsieur de Tschirnhaus nous auroit obligé
de nous donner la demonstration de ce qu'il avance;
car la generation de cette ligne est très simple, et elle
merite bien une autorisé d'une demonstration. n'est
comme il temoigne qu'il n'a pas le loisir de s'appliquer
a ces sortes d'ouvrages, j'ay cru que j'eusse plaisir
de donner une au public telle que je la pourrois
trouver a la maniere des anciens, car j'etois persuadé
qu'il en avoit une par le calcul qui exprimoit la

l'on de cette courbe. pour y pouuoir parueniir j'ay
jugé qu'il fallait d'abord connoître la tangente de la
ligne courbe decrite, comme il dit par une maniere
Geometrique, afin de pouuoir trouuer ensuitte plus
facilement la longueur

Proposition 1.

Soit donné la ligne courbe BHE decrite par une
infinité de points comme H qui ont été trouuez par la
methode precedente et soit donné le point H sur cette
courbe par lequel il faut tirer la ligne HI, qui
touche la courbe au point donné H.

Par ce point H soit mené la ligne DHGF
parallele au demi diametre AC. du quart de cercle
laquelle ligne rencontre le quart de cercle et le
demicercle aux points D et G, par ces points D et G
soit mené les touchantes DI, GI; tant au quart de
cercle quant demi cercle lesquelles se rencontrent en I.
Je dis que la ligne IH menée de ce point de
rencontre I par le point H de la courbe qui
diuise en deux egalement la ligne DG, par la
generation) touchera la ligne courbe BHE dans
ce mesme point H.

Si la ligne HI, ne touche pas la courbe BHE
au point H, elle la coupera, et elle la rencontrera
en quelque autre point comme L, ou bien l'ayant

rencontré au poinct H, elle passera outre [illegible] au dedans
sans la rencontrer. mais supposons dabord quelle la
rencontre en quelque autre poinct comme L.

(D) au poinct L, layant mené la ligne droite
MLN parallele a AC, qui rencontre au poinct O & P,
le quart de cercle et le demy cercle, par la generation
le poinct L diuisera en deux egalement la partie
PO, de cette ligne compriſe entre le quart de cercle
et le demi cercle, mais a cause que la ligne IG —
touche le demi cercle au poinct G, elle rencontrera
la ligne OP, hors le demi cercle au poinct N.
et par consequent la partie LN sera plus —
petite que LP; LN sera donc aussi plus petite
que LO; cependant a cause que la ligne ID IV,
touche le quart de cercle au poinct D elle rencon-
trera la ligne OP, hors le quart de cercle au
poinct M et par consequent LH sera plus grande
que LO qui en egale a LP, elle sera donc
aussi beaucoup plus grande que LN qui en plus
petite que LP.

Dans le triangle IDG la ligne MN, qui est
parallele a DG rencontrant les cotés ID, IG prolongez
en M & en N sera coupée au poinct L par la
ligne IH prolongée en mesme raison que la
ligne DG: mais cette ligne DG est coupée en H en
deux parties egales MN sera donc aussi coupée en

L en deux parties egalles, il sen suit consequent L N sera egalle a L . . nous avons demonstré cy dessus que L N. etoit beaucoup plus petite que L M ce qui est une absurdité; cenpourquoy il nest pas vray que la ligne 1H puisse rencontrer en quelque autre poinct la courbe BHE.

Si lon disoit que la ligne 1H rencontre la courbe en un autre poinct vers 1; on feroit la mesme demonstration que nous venons de faire, doulon concluroit une semblable absurdité.

Mais silon dit que cette ligne droitte 1H apres avoir rencontré la courbe au poinct H passe vers les parties interieures de la courbe, en coupant en dedans et quelle ne la rencontre point que dans le seul poinct H auquel elle la coupe; on tombera toujours dans une absurdeté semblable a la precedente; car si lon suppose que la ligne 1H ne rencontre pas la courbe BHE, il faudra neuslairement quelle rencontre le demi diametre AC, entre le poinct B de la courbe qui divise en deux egalement AC, et entre le poinct S. ou la touchante 1G, prolongé rencontre AC. soit donc T le poinct de rencontre de la ligne 1H prolongé et du demi diametre AC, il est evident que les touchantes 1D, 1G- rencontreront le demi diametre AC, lune au poinct R, et lautre au poinct S. et que BS. sera beaucoup plus petite que BR, car le poinct B coupe en deux

Egalement la ligne A C, mais la ligne IH coupe
aussi en deux egalement la ligne
SR, au point T qui en au dessous
B, en pour quoy TS sera beau=
coup plus petite que nous venons
de demontrer plus petite que
BC, ; TS sera donc de beau=
coup plus petite que BR qui
en plus grande que BC et
encore beaucoup plus petite que
TR. plus grande
que BR: TS sera donc toute ensemble plus petite
que TR et Egale a la meme TR; ce qui en absurde
il nen donc pas possible que la ligne IH entre au
dedans de la courbe sans la rencontrer, il reste une des
deux demonstrations precedentes que la ligne IH
touche la courbe au point H ce quil falloit
demontrer.



Il faut voir maintenant, si cette touchante IH
et le rayon reflechi dun rayon parallele au demi dia=
metre AC, lequel touche la courbe des rayons reflechis
au point H.

Proposition II.

Je diuis le rayon AE en trois parties Egales donc
AE en est une, et par le point F je mene la ligne FD,

parallele AC qui coupe le demi cercle AGE au
point G, je diuise ensuitte GD en deux parties egales
au point H, lequel point sera sur la courbe de M. de
Tschirn. Maintenant pour les points G et D, je mene les
tangentes GI, et DI, tant au demi cercle AGE, qu'au
quart de cercle CDE; par le point de rencontre I de
ces deux tangentes et par le point H je tire la ligne
HI qui doit toucher la courbe au point H par la
premiere proposition si la ligne courbe decrite par la
methode de M.r de Tschirn. en celle des rayons reflechis
la ligne IMH sera vn rayon reflechi qui la touchera
au point H, que cela soit fait en possible



Dav le point M ou la touchante IH rencontre le
quart de cercle CE, j'abbaisse la perpendiculaire
ML sur AE, et je mene le demi diametre AM, main-
tenant dans le quart de cercle ayant mené de
centre A le demi diametre AD, et dans le demi cercle
AGE de son centre K le demi diametre KG; je dis

que les angles ADF, KGF, ou son opposé au sommet DGT sont Egaux. par la Construction AF en double de FK, et le quart de Cercle CME ayant son rayon ou double de celuy du demi cercle AGE, l'angle ADF ou CAD sont Egal, qui a pour son sinus la ligne AF sera Egal a l'angle KGF qui a pour son sinus la ligne FK; car les sinus seront entr'eux en meme raison que les diametres des cercles ou sont les angles; c'est pourquoy a cause de les angles Egaux ADF, et KGF, ou son opposé au sommet DGT et a cause des angles droits ADI, KGI, ou son opposé IGI lesquels sont Compris par les demi diametres et les tangentes, on aura les angles DGI, et GDI, aussi entr'eux et le triangle IDG sera isoselle. C'est pourquoy la ligne IH qui coupe en deux Egalement la base du triangle isoselle IDG sera perpendiculaire a cette base DGF et sera aussi perpendiculaire a LM.

Qui fait que par l'hypothese le point H est sur la Courbe, et que par la premiere proposition la ligne HM touche cette Courbe au point H, la touchante MH etant le rayon reflechi donc MH et le rayon direct le demi diametre AM. Coupera neantmoins l'angle LMH Compris par ces deux rayons en deux Egalement C'est pourquoy l'valeur des angles AML, AMH sera la moitié dun droit, et le triangle

rectangle A M L sera isocelle, et la ligne M E sera
egal a la ligne M C

ayant diuisé la ligne A M en deux egalement
en N sur M N pour diametre je decris le cercle
N O M, qui coupera M H au point O; et je
dis que ce point O, est entre les points
M et H; car premierement N O, qui fait
l'angle N O M, droit au demi cercle, sera per-
pendiculaire a M H; N O sera donc parallele
a F D.

secondement puis que A E en le tiers
de A E, et que le triangle A F Q en rectangle
et isocelle si l'on diuise A E ou A M en six parti-
es la ligne A F en sera deux aussi bien que F Q;
dont pourquoy A Q sera la racine de 8. egale
aux deux quarrez de A F et F Q; mais la
ligne A N qui en la moitié de A M vaut 3.
dont le quarré en 9. dont pourquoy la racine
de 9 etant plus grande que la racine de
8. A N sera aussi plus grande que A Q; et
N O etant parallele a Q H le point O tombera
entre M et H.

Il reste que la ligne I H. touche la Courbe
au point H, toute autre courbe doit passer

au dessous de cette ligne AH, j'dis que si l'on prend quelque point comme R entre H et O on pourra mener une touchante RP à la courbe, laquelle touchante passera toute au dessus de la ligne MR depuis son point R. cette touchante RP rencontrera le quart de cercle au point P, et le plan cercle MON au point T. des points P et T je mene des lignes au point N, dont l'une formera le triangle ANP qui aura son coté NP, plus grand que le coste NA; à cause que NP est plus grande que NM perpendiculaire au cercle; et par consequent la plus petite de toutes celles qu'on peut mener du point N; en pourquoy l'angle PAN sera plus grand que l'angle APN; mais l'angle PNM exterieur au triangle APN est egal aux deux interieurs opposez PAN, APN; en pourquoy l'angle PNM, sera plus petit que le double de PAN, et à plus forte raison l'angle TNM, qui n'en est que partie de l'angle PNM sera plus petit que le double de l'angle PAN. ayant ainsi la ligne TO l'angle TOM etant egal à l'angle TNM à cause qu'ils sont tous deux de la mesme portion de cercle, il s'ensuivra que l'angle TOM



sera plus petit que le double de langle PAM.

Suivant l'hypothese de Mr. Rehivn. la ligne RP etant une touchante en quelque point que ce soit, cette touchante rencontrant le quart de cercle au point P sera le rayon reflechi du rayon SP parallele a AC, et ayant mené le demi diametre AP langle d'incidence APS sera egal a langle de reflexion APR; mais langle APS etant plus grand que langle AML de la quantité de langle PAM, aussi langle SPR double de langle APS sera plus grand que langle LMR qui en aussi double de langle AML, du double de langle PAM. a cause des paralleles ML, PS. langle RYL en egal a langle RPS etc plus grand que langle au triangle RMY, langle RYL exterieur en egal aux deux interieurs RMY ou RML, et MRY ou MRP. Comme donc langle RPS en plus grand que langle RML de la quantité de langle MRP. langle MRP sera donc double de langle PAM; mais langle TOM en plus grand que langle TRM ou PRM, langle TOM sera donc plus grand que le double de langle PAM.

Il s'ensuivroit donc que l'angle TOM seroit plus grand que le double de langle PAM, et tout ensemble plus petit que le double du meme angle PAM comme nous avons demontré en

devant, ce qui est une absurdité manifeste; car
pourquoy le point H ne sauroit etre sur la ligne
MH le point touchant de cette ligne avec la
courbe qui est formé par les rayons reflechis quand meme
cette ligne MH n'estoit une touchante; et par consequent
la courbe decrite par la methode de mons. de
Tschirn, n'est pas celle qui est formée par les rayons
reflechis dans un quart de cercle comme il le
pretend.

Je ne scay pas par quelle voye il auroit trouvé
que la ligne courbe decrite par sa methode qu'il
appelle Scientifique, etoit celle qui est formée par
les rayons reflechis dans le quart de cercle; mais il
faut bien que cette methode soit fausse ou qu'il le
soit glissé quelque erreur dans son calcul; nous
demontrerons dans la suitte que cette ligne MH est
veritablement touchante de la courbe des rayons
reflechis et que le point O est le point touchant.
et par consequent que cette courbe rencontre
la ligne DF au dessous du point H.

Il a fait imprimer depuis un traité qui
a pour titre, Medecina mentis et corporis,
ou apres avoir proposé plusieurs generations de lignes
courbes qui sont fort ingenieuses, il promet de donner
dans son lieu les demonstrations de leurs proprietez -

ou sur toute de leurs tangentes, quil mesagne à trouver dune maniere soit simple, mais quoy quil dise, page 94. Habituum per totam mathesin universalem, aliudque utilius theorema, aut praestantior tangentes determinandi methodus? ce quil faut entendre seulement dans les pieces de courbes quil propose. je crois quon doit voir auparavant ? ce quil avance ce aussi certain que la proposition que je viens dexaminer.

jl dit ensuitte en parlant de cette methode. (quis crederet eam hactenus alios latuisse, non toc diuersos hac in re conatus, postquam primum mathematicis, quanta hac sint utilitatis vrete innotuit; sed facilia multa ingeniosissimos etiamnum fugiunt, qua tamen permagni sunt momenti. oportet autem vt theorematis adeo generalis demonstratio sit perquam facilis, iam quibusdam ex parte explicui et suo loco tradam.

jl ajoute quil demontrera sur les courbes quelques proprietés particulieres quil nonce par ordre vers la fin delas page 95: il parle en ces termes. hinc infinitis nouis inuentis omnes matheseos particulares scientiae excultabuntur. sic innumeras nouas Geometria superficies, solida, ac his similia poterit formare: arithmetica infinitas nouas

progressiones; Astronomia novas hinc vesperiet
curvas quæ repræsentabunt planetarum suorum
vias, sive concipiant eos in epicyclis, sive alia qua-
cunque ratione moveri. Dioptricam quod attinet, ut et
Catoptricam, innumera quoque in iis nova oriuntur,
unum horum in actis Eruditorum quæ Lipsiæ eduntur
publice exhibui Specimen, cujus etiam demonstrationem
viris ingeniosis privatim communicavi. Horum ego
jam fontes genuinos aperio, ex quibus hæc infinitis
poterunt locupletari modis.

Novi equidem quendam de veritate primarii
Theorematis, nempe in quo ostendo solis radios
incidentes in curvam et inde reflexos suis intersectio-
nibus curvas formare, radiis semper æquales, dubitasse,
et mihi relatum esse, etiamnum dubitare; quia vero
demonstrationes hæ jamdudum fuere probatæ a D.
Hugenio et D. Leibnitio, qui absque dubio inter
primos nostri ævi mathematicos numerantur, pauca
his moneo: præstat pergere.

Il n'y a personne qui puisse douter que les
courbes formées par les intersections des rayons du
soleil reflechis lorsqu'ils tombent au dedans d'une
courbe, ne soient egales a des lignes droites, non plus
que toute autre sorte de courbe, et le cercle meme
mais la difficulté est de demontrer quelle est la
grandeur de cette ligne droite egale a la courbe

par rapport a quelque ligne droite donnée et donne, [illegible] de connoitre la circonference du cercle par rapport a son diametre.

Dans l'exemple que j'ay rapporté cy devant monst. de Tchirnh. voulant nous faire voir un echantillon de sa methode pour trouver des lignes droites egales aides courbes, nous proposa celle qui en formée par les rayons du soleil reflechis dans le quart de cercle, sans nous parler alors de la maniere de la decrire, et il nous dit qu'elle etoit egale aux trois quarts du diametre du cercle: car disoit il selon couche un fil au long de cette courbe BHE, et quensuitte ayant plié ce fil avec une pointe vers quelquun des points du quart de cercle comme en M, ce fil etant tendu depuis M jusqua la courbe en H et le reste de ce fil comme ML etant mis parallele a AC, son extremité L se rencontre sur la ligne AE; et cela etant de mesme par tout il arrivera que lors que le fil sera entierement developpé des dessus la courbe le point M sera en C, et le point L au point A; mais le fil etant plié depuis B jusquen C il sensuivra que toute la courbe BHE sera egale a la ligne AC plus CB.

Quoyqu'il soit vray que
l'on commence par le
developper le fil qui en couche
sur la courbe en le tenant
toujours tendu par son extremité
E, ce fil touchera toujours la
courbe ou ce qui en la meme
chose representera une touchante, et alors l'extremité
de ce fil par levolution ou developpement de la
courbe BHE decrira une autre ligne courbe,
mais il ne sensuit pas pour cela que ce fil etant
replié au point comme M ou il rencontre la quan
de courbe, et etant etendu paralldement a AC,
decrive par son extremité comme si la ligne droite
AE; et quand meme la courbe BHE seroit egale
a AC, plus BC, il ne sensuivroit pas non plus que
ce point L. parcouru la ligne droite AE. enfin
quoyque monr. de Tchirn. puisse dire je connois
trop bien quelle on lexactitude de mrs leurs
rugens et leibnits pour pouvoir me persuader
quils se soient contentez de sa parole au lieu
de demonstration; car il fallois demontrer comme
jay fait a la fin de ce traité que le point
L. doit toujours se rencontrer sur AE dou il
suit aussi que la portion HE de la courbe
BHE en egale aux deux lignes droites H'M et



ML. j'entre ensemble. mais il semble que mons.r de tschirn. n'en avoit point d'autre demonstration que l'experience qu'il en avoit faite comme il disoit.

j'aurois fait peu de chose d'avoir seulement montré que la methode de mons.r de tschirn. pour decrire la courbe des rayons reflechis en faisoit: si je n'en donnois rien une veritable aussi simple que celle qu'il propose et plus grande puisquelle determine a meme temps la tangente de la courbe et le point touchant et j'en fais la demonstration geometrique a la maniere des anciens. depuis je demontre quelle est cette courbe et j'en donne toutes les dimensions tant de son espace que de la ligne avec quelques autres proprietez singulieres qui ne sont que de consequences tirés dune proposition universelle pour toutes les courbes de cette nature.

Pour avoir dabord une idée distincte de la ligne courbe qui est formée par les rayons de Soleil reflechis au dedans dun vase de verre lorsque ces rayons sont paralleles a lun de ses diametres, il la faut considerer comme celle qui termine lespace dans lequel il ne tombe aucun rayon reflechi, comme nous avons dans les Sections coniques des espaces terminez par

les lignes perpendiculaires aux [illegible] dans les-
quels elle tombe [illegible] aires.

Proposition III.

Generation de la courbe formée par les rayons du soleil reflechis dans le quart de cercle.



Soit un quart de cercle ACME et un rayon direct LM parallele au demi diametre AC, et qui rencontre le quart de cercle au point M. Soit acheve tout le cercle CMED, et ayant prolongé le demi diametre CA. jusques D, par le point M soit mené le diametre MAG. Si l'on fait l'arc GF. double de l'arc GD la ligne FM sera le rayon reflechi du rayon direct LM: mais ayant partagé

L M, en deux parties ègales au point I. et ayant pris sur
M F la grandeur M H ègale a M I, ie dis que le
point I est un des points de la courbe requise ou le
rayon reflechi M H touche cette courbe.

Demonstration.

Premierement il est evident que langle A M F.
est ègal a langle A M L, et par consequent que
le rayon M F est le rayon reflechi du rayon M L.
car a cause des paralleles A C, M L, langle M A C,
ou son oppose D A G, sera ègal a langle G A D.

Secondement ayant partagé A M en deux
parties ègales en N soit decrit sur N M comme
diametre, le cercle N H M I: ie dis que les points
H et I. que nous avons marquez cy deuant sont
aussi sur ce mesme cercle. au triangle rectangle
M A L. les costez M A, M L. sont coupez en deux
ègalement en N et en I. par la construction:
Et parce que la ligne N I, sera perpendiculaire
a M L et cet angle droit N I M, sera neccessairement
au demi cercle N I M, donc le point I. sera
~~necessairement au demi cercle~~ sur la circonference
du cercle N H M I, on demontrera de mesme que le
point H est aussi sur ce mesme cercle a cause des

deux triangles N H i, N M H qui sont entre eux semblables par la construction il reste à montrer que le point H est le point touchant de la courbe sur la tangente M H.

Si sur la tangente M H le point H n'est pas sur la courbe, ce sera quelqu'autre point plus éloigné ou plus près du point M. soit premierement s'il est possible quelque point plus éloigné comme le point K j'on pourra donc par le point H mener à cette courbe une touchante comme H P. au dessous de la touchante K M, car toute la ligne courbe est au dessous de la ligne K M: cette touchante H P. doit donc rencontrer le quart de cercle au point P. par le point P ayant mené la ligne P S parallele à A C laquelle sera le rayon direct du rayon reflechi H P. les angles A P H, A P S. doivent etre egaux entreux les lignes M L, P S etant paralleles entrelles l'angle A R L ou opposé Q R P. sera egal à l'angle A P S qui est egal à l'angle A P Q comme nous le venons de demontrer, comme donc le triangle Q R P. sera isocelle, et l'angle H Q R exterieur sera egal aux deux interieurs Q P R, Q R P. le sera aussi à tout l'angle H P S.



Semblablement langle HQR. qui en exterieur au triangle HMQ sera egal aux deux interieurs opposez QMH ou LMK, & QHM, d'ou il s'ensuit que langle HPS. surpasse langle LMH. de la quantité de langle MHQ ou MHP.

Langle APS est egal a langle PAC & langle AML est egal a langle MAC; Parquoy langle APS. surpasse AML de la quantité de langle MAP. et langle HPS double de langle APS. surpasse langle KML. double de langle AML. du double de langle MAP. dou il s'ensuit que l'angle KML est egal au double de langle MAP.

ayant mené la ligne PN on formera le triangle ANP dont le costé NP. sera plus grand que le costé NA, qui est egal a NM, par la construction car NM, etant perpendiculaire a la touchante du cercle par le point M, elle sera la plus petite de toutes les lignes qui seront menées du point N jusques au cercle: Car pourquoy l'angle PAN etant opposé a un plus grand costé que le costé NA il sera aussi plus grand que langle NPA. et partant langle PNM, exterieur du triangle APN qui est egal aux deux interieurs opposez NPA, NAP, sera plus petit que le double de langle PAM, il sera donc

auſſi plus puiſſ que langle PHM, que nous venons de demontrer egal au double de langle MAP.

Mais la ligne HP. etant au dedans du quart de cercle coupera neceſſairement le cercle NHIM, ~ puis on aura au dedans du quart de cercle en quelque poinct T, duquel ayant mené la ligne TN. on aura langle TNM, plus puiſſ que langle PNM, et par conſequent cet angle TNM, ſera de beaucoup plus petit que le double de langle MAP., mais langle TNM, en egal a langle HM, etant tous deux ala meme circonference de cercle, dont pourquoy langle THM ou MHP. ſera beaucoup plus petit que le double de langle MAP. ce qui en ne abſurdité, puiſque ce meſme angle a eté demonſtré cy deuant egal au double de ce meſme angle a eté demonſtré cy deuant egal au double de ce meſme angle MAP. il n'eſt donc pas pas vray que poinct touchant de la courbe ſur la touchante MH ſoit au poinct K plus eloigné du poinct M que nul le poinct H ſoit maintenant ſi il eſt poſſible ce poinct touchant K plus proche du poinct M que nul le poinct H puiſque la ligne MH touche la courbe au poinct K, cette courbe paſſera toute au deſſous de la ligne MH ; cet pourquoy:



on pourra mener du point H une touchante HP.
a cette courbe laquelle touchante la rencontrera au
dessous de la ligne MH, et la rencontrera aussi le
quart de cercle au point P au dessus du point N.
Un point P. ayant abaissé la ligne PS. perpen=
diculaire a AE ou parallele a AC, cette ligne PS.
sera le rayon direct du rayon reflechi PH, comme
la ligne LM, est le rayon direct du rayon reflechi
MH, nous demontrerons donc comme cy deuant
que langle RPH en egal tant aux deux angles.
QPH, QHP. pris deux QMR, QRM qui sont
en embas sur alangle HML ou QML. Cet pourquoy
langle HL sera plus grand que langle HPS.
de la quantité de langle PHM.

Mais comme nous auons dja dit cy deuant
langle AML etant egal a langle MAC, et langle
PS egal alangle PAC, langle AML. sera plus
grand que langle APS de la quantité de langle,
PAM, et par consequent langle HML. double de
langle AML sera plus grand que langle HPS. a
double aussi de langle APS du double de langle
PAM dou il sensuit que langle PHM sera egal
au double de langle PAM.

Par le point T ou le demi diametre AP coupe

le cercle NHM ayant mené la ligne TN langle TNM sera egal aux deux angles NAT NTA. du triangle NAT, car ils sont interieurs opposés a lexterieur TNM. mais le cote NA ou son egal NM. etant plus grand que NT, car NM etant diametre du cercle NHM est la plus grande quon puisse mener du point N, langle NTA sera plus grand que langle NAT et par consequent langle TNM. sera plus grand quele double de langle TAN — ou PAM,

Dumesme point T qui sera toujours dans langle HPS. ayant mené TH les angles TNM, THM. qui — sont a la meme portion de cercle sont egaux entr'eux cur pourquoy langle THM sera aussi plus grand que le double de langle PAM, mais langle PHM, etant encore plus grand que langle THM. et angle PHM sera de beaucoup plus grand que le double de langle PAM, quoy que nous venions de demontrer qui luy est egal ce qui est vne contrarieté ~~de demontrer~~ dou lon conclud que le — point touchant sur la tangente HM ne peut pas estre entre M et H enfin il est donc vray que le point H est le point touchant ~~de la tangente~~ de la tangente HM ce quil falloit

Demonstrer.

Prop. IV.

Or je dis que la ligne courbe BHE que nous auons cy deuant descritte de vne Epicycloide entiere dans le cercle qui luy sert de base a son diametre double au diametre du Cercle generateur de lepicycloide.

Demonstration.

Supposant les choses qui ont été demontrées cy-deuant, le despoint A. pour centre et pour demi-diametre AN qui est de la moitié de AM, on decrit le cercle BND; je dis que ce quart de cercle BND est la base de lepicycloide BHE qui est la ligne formée par les rayons reflechis dans le quart de cercle de la maniere que nous auons expliqué cy deuant et que cette Epicycloide a pour Cercle generateur le cercle NHMI. dont le diametre NM, est egal au dessus diametre AN du cercle de sa base.

Que le cercle generateur de lepicycloide ait son diametre sur la ligne AE lors qu'il commence a se mouuoir et que le point E soit celuy qui decrit lepicycloide. lors que ce cercle en roulant

sera parvenu en quelque poinct comme N sur
sa base DNB, il est evident si lon tire la ligne
ANM, dont la partie NM sera le diametre du
cercle generateur que le poinct E decrit
l'epicycloide sera parvenu en H lare MH etant
egal a lare DN en longueur, mais a cause que le cercle
BND est double du cercle NHM lare HM sera
double de lare DN et par consequent le sinus
NK de lare DN qui en la moitie de la corde



dun arc double de DN, —
qui en egal a lare MH,
sera egal a la corde MH,
ces deux cordes seroient double
lune de lautre, les diametres
des cercles etant aussi doubles
lune de lautre. du poinct
M ayant abaissé ML. per-
pendiculaire a AE et du
poinct N ayant mené
NI. parallele a la mesme AE on voit manifestement
que ML. sera coupé en deux egalement en I.
puisque AM list au poinct N; et de plus cette ligne
NI. est perpendiculaire a ML; car pour quoy a
lare de langle droit NIM le cercle NHMI,
qui a pour diametre NM passera par le
poinct I.

je dis de plus que la corde MI en egale a la corde MH ou ce qui en la meme chose, faire MI en egal a faire MH dans le triangle AML a eaux que NK en parallele a ML et que AH en coupé en deux egalement en N, ML en double de NK mais ML en coupée en deux egalement en I. et pour quoy MI en egale a NK et NK a été demonstré cy devant egale a MH, MI sera donc egale a MH, ainsi lon peut dire que le poinct H en un des poincts de la ligne courbe formé par la reflexion des rayons qui tombent dans le quart de cercle, puisque la troisieme proposition ce poinct H en le meme qui auroit trouvé sur cette courbe; la courbe et lepicycloide ne sont donc qu'une meme ligne a quoi falloit demontrer.

Corollaire

Il s'ensuit de cette demonstration, et de la precedente que la ligne MH touchera l'epicycloide au poinct H comme il a été demontré dans la proposition des touchantes des epicycloides.

Proposition V.

Puisque j'ay demontré dans la proposition precedente que la ligne courbe formé par les rayons

du Soleil. Supposon parallele entrodans & reflechis dans
un quart de cercle.

Cycloide
je pourray luy attribuer les mesmes choses quaux
Cycloides.

Premierement je dis suivant a que j'ay
demontré des espaces des Epicycloides, que lespace
BHEDNB compris par la courbe BHE par la moitié
du demi diametre DE et par le quart de cercle BND
est egal ala moitié de lespace CEDB joint auec le demy
cercle MIN, ouce qui est la meme chose que cet
espace est egal aux trois huitiemes du quart de
cercle ACME, joinct au demi cercle MIN, mais
parce que le diametre MN du demi cercle
MIN : est egal ala moitié du demi diametre du quart
de cercle le demi cercle MIN sera au quart de
cercle ACE comme 1 a 8 en adiant que le demi
cercle MIN est seulement le huitieme partie du
quart de cercle ACE et partant tout lespace
BHEDNB sera egal a quatre huitiemes ou ala
moitié du quart de cercle ACE et lespace BHEA.
en sera les trois quarts.

fig. precedente

Il est aussi curieux par la construction dela
courbe de mons. Hehirn, quelle comprend auec
les rayons du quart de cercle un espace egal aux

trois quarts de quart de cercle avec le demy cercle
AGE comprend la moitié du quart de cercle de
la ligne courbe BHE de la seconde proposition
coupe en deux exactement les pace AGEDC.

Fig: de la precedente proposition.



Ie ne demonstre de la quadrature
ni de la grandeur des lignes a
des Cycloides que la ligne
courbe BHE est egale a trois
demi AC demi diametre du
quart de cercle CME, car il
les fait comme la moitié
de A.C qui est AB, à les trois quarts qui est AZ
ainsy deux fois BC, sera a la courbe EHB qui est
la demy Cycloide, mais BC etant egale a
AB la courbe EHB sera double de AZ. qui
sera trois demi AC, comme la vous avancé
monstrer de refaire.

Depuis puisque nous connoissons que la
ligne formée par les rayons reflechis est vne
Cycloide et que MH la touche au point H
en quelque endroit que on prenne le point H il
s'ensuit que ML etant double de MI, ou de MH, on
aura la somme de MH, ML triple de HM. mais
MH sera deux HH; ou [illegible] sera de HH touche.

l'epicycloide HE au point H d'apres les propositions
precedentes des grandeurs des portions de l'epicycloide.
[illegible] au comme AN en a AZ en adire z. a ζ.
[illegible] deux MH a la courbe HE donc la courbe HE
en egale a trois MH, en adire a MH plus ML de
plus consequent l'extremité du fil dans la maniere
d'evolution de mons.r de Tschirn: touchera toujours
le d.t endroit AE comme il l'avoit avancé sans
demonstration.

Proposition VI.

J'ay dit cy devant que la courbe decrite par la
methode de mons.r de Tschirn: n'etoit pas celle, qui
etoit formé par les rayons reflechis et j'ay



demontré dans la seconde proposition que la courbe

Des rayons reflechis ne pouuoit pas dre touchée par la ligne MH au poinct H quand mesme elle seroit vne touchante de cette courbe.

Les mesmes choses etant posés comme dans la seconde proposition

Je dis que la ligne droite MH telle quelle a été trouuée touchante dela courbe des mont. de Tschirn: au poinct H, touche aussi la courbe des rayons reflechis dans le quart de cercle, a que le poinct touchant est le poinct O, donc il suit necessairement que la courbe decrite pour les rayons reflechis rencontrera la ligne FH au dessous du poinct H comme la courbe de mont. de Tschirn: rencontre la ligne NO, au dessous du poinct O et que ces deux courbes qui enferment auec les deux rayons du quart de cercle un mesme espace s'entrecoupent entre les lignes FH, NO.

Soit le rayon du quart de cercle diuisé en six parties egales entre elles et a AX donc AF en sera a. par la construction de la proposition 11. a cause du triangle rectangle ADF le quarré du rayon AD contient 36 quarrés de AX, desquels si l'on oste le quarré de ~~Rayon AD contient~~ de AF qui contient 1. quarrés de AX, il restera pour le quarré de FD. 32 quarrés de AX mais aussi les arcs AG et ED etant

etant Semblables les Sinus de ces arcs GF et VF
Seront entreeux en même raison que les diametres
des cercles AGE, FVC, donc celuy du premier en la
moitié de l'autre, il est donc evident que FC en la
moitié de FD. mais aussi GH a été posé la moitié
de GD, donc FH sera les trois quarts de FD et
Son quarré contiendra les neuf Seiziemes du quarré
de FD, c'est a dire qu'il contiendra 18 quarrés de
AX.

Par la Construction le triangle AZM en
rectangle en Z, le quarré de Son hypothenuse AM
contient 36 quarrés de AX, et le quarré du coté AZ.
qui est egal a FH en contient 18. le quarré de l'autre
coté ZM en contiendra donc aussi 18., c'est pourquoy
ces deux costés AZ. et ZM seront egaux et le triangle
sera Isocelle, et enfin l'angle ZMA sera egal a l'angle
ZAM qui est egal a l'angle AML a cause des
parralleles CA, ML les deux angles AMZ, AML etant
egaux le rayon IMHZ sera le rayon reflechi du
rayon direct LM.

Dans le cercle NOM le triangle rectangle
NOM etant Semblable au triangle rectangle AZM.
il Sera Isoscelle, et chacun de ces cotés comme MO Sera
la moitié de MZ ou de ML et par la 3. proposition
le point O Sera un de ceux de la courbe et par le
Corollaire de la 4. ce meme point O en le point

touchant de la courbe des rayons reflechis de la ligne m H dont il suit ce que lon avoit entrepris de demontrer.

Avertissement.

Comme jo mavois proposé dans le traité des Epicycloides de rectifier le mouvement des roues dentées qui servent dans les machines, pour les faire mouvoir également et agir dune égale force, il semble quapres avois expliqué quelle doit la forme des dents des roues qui sont posés dans un meme plan, ou qui ont leurs arbres ou axes parallèles entre eux, j'aurois du donner la construction des dents des autres roues qui ne sont pas parallèles, ou dont les axes sont inclinez lun a lautre pour changer la direction des mouvemens. on fait ordinairement ces changemens par le moyen dune roue dentée et dune lanterne dont les axes sont inclinez a angle droits comme on le peut voir dans la machine que jay proposée ay devant pour lever deau. mais jay seulement considéré dans lexecution que jay faite de cette machine, que la face des dents qui agit sur la

roulette, elle formée par des lignes qui tendent au
centre de la roüe et qui passent par les points de la
courbe qui forment la dent. ayant negligé dans
cette construction la figure irreguliere de la face
de la dent ou onde qui agit contre la roulette,
a cause du peu dutilité quon en pouroit retirer
et de la difficulté de lexecuter. outre que les
axes des roüe et roulettes ayant toujours un peu
de jeu, les petits deffauts quon ne sauroit
eviter, se retrouvent dans le mouvement par le
frottement des parties lune contre lautre quand
la machine a servi quelque temps, bien mesme
quon ne pourroit faire avec toutes sortes de
precautions. il auroit fallu aussi expliquer la
construction de la vis pour la faire agir egalement
par tout, sur une roüe dont les dents seroient dune
figure donnée; et de mesme pour toutes les autres
machines; ou il a des roüe et des dents qui agissent
lune sur lautre par des mouvemens obliques.
mais je n'aurois pu examiner tous les cas ou
particuliers sans passer les bornes qui mestoient
icy prescrites, et sans faire de frequentes repeti-
tions, qui auroient ennuyé ceux qui ont bien
entendu ce que j'ay donné cy devant; car je ne
crois pas quil se puisse faire aucune invention

dans la construction des machines, dont on ne
puisse donner facilement la solution, si on y
applique la methode que j'ay donnée pour les dents
des roues qui sont dans un meme plan. cependant
je crois que je dois avertir icy que lorsque les dents
agissent obliquement, ou bien ce qui est la meme
chose, lorsque les axes des roues ne sont pas
paralleles, on peut toujours reduire leur mouve=
ment a deux autres qui le composent, et par
consequent on peut aussi composer la figure des
dents de deux autres figures, en sorte la face de
la dent qui agit sur une autre qui est donnée,
ne doit pas etre formée dans des par des lignes
toutes paralleles entr'elles, ou qui tendent en un point
comme je les aye considerés dans les exemples
que j'ay donnés, mais par des lignes courbes.
qui soient chacunes des Epicycloides
ou des lignes formées sur ces Epicycloides.
par exemple les dents d'une roüe qui rencon=
trent les fuseaux d'une lanterne pour changer
un mouvement horizontal en vertical ou au
contraire peuvent etre formés par des Epicycloides
toutes semblables et posés sur le plan de
la roüe et qui auront pour cercle generateur
celuy dont le centre est a l'infiny qui est

l'evolution du cercle et pour base le cercle de la roüe; ~~ces lignes~~ et pour des cycloides semblables appliquées sur des surfaces cylindriques qui ayent pour axe celuy de la roüe et qui passent par les points de l'epicycloide, ces cycloides ayant pour cercle generateur celuy dont le rayon est la distance de l'axe de la lanterne jusqu'au point qui agit sur les dents de la roüe; car les lignes qui forment la dent, ne seront des cycloides que lorsqu'elles agiront contre un seul point des fuseaux de la lanterne, autrement ce seroit des lignes formées sur ces cycloides. la figure de la dent de la même roüe peut avec encore formé d'une autre maniere, comme par une cycloide appliquée sur une surface cylindrique qui a pour rayon celuy de la roüe et pour des epicycloides toutes semblables appliquées contre celle cy et qui seront decrites sur des plans paralleles a celuy de la roüe et autour de cycloides et d'epicycloides on se servira de lignes formées sur celle cy, si l'on a une figure donné pour les fuseaux au lieu d'un seul point. si la figure de la dent de la roüe doit donnée on trouvera par la même methode

Explication Des principaux effets de la Glace et Du froid.

1. Supposition du sentiment de froid.

Je suppose que le sentiment du froid que nous auons, vient de ce que les particules de l'eau qui nous enuironent, soit quelles soient separées comme elles sont dans l'air, ou quélles soient reunies toutes ensemble, ont moins de mouuement que celles de l'eau qui est au dedans des pores de notre corps quélles touchent. ainsi lorsqu'on met la main dans l'eau et que les particules ont moins de mouuement que celles qui sont dans la peau de la main, on dit que cette eau est froide, et ce froid pouuoit plus grand a proportion que les particules de l'eau exterieure ont moins de

mouuement, en sorte que si elles en eloient entierement privées, le froid paroitroit extreme.

je pourrois supposer que tout le mouuement des particules de leau ne leur vient que de celuy de lair subtil qui y est toujours melé en grande quantité mais il me suffit dexpliquer icy comment leau peut perdre son mouuement, pour rendre raison des principaux effets du froid et de la glace.

Il hypothese de la privation du mouuement des particules de leau.

je dis quil ny a que de certains sels qui soient capables darreter le mouuements des particules de leau quil ny a que peu de ces sels melés et engagés dans le sel commun, quil y en a beaucoup plus dans le salpetre, et quil y en a une grande quantité dans le sel armoniac; que les particules de ces sels sont delices, longues, roides, et aiguës - et par consequent quelles peuuent penetrer tous les metaux, et le verre mesme; quelles sont emportées facilement dans lair par leur mouuement; et quenfin les particules de leau sarretent plus facilement a ces sels que tout autre corps, sans en excepter les autres sels et reciproquement que ces sels se joignent plus aisement aux particules de leau que celles des autres corps.

Si l'on suppose comme monsieur Descartes, que les particules de l'eau soient longues, et flexibles, il ne sera pas difficile de juger quelles pourront s'arrester facilement a des sels en s'entortillant autour de leurs pointes, et quelles perdront leur mouvement, n'en ayant plus d'autre que celuy des particules des sels aux quelles elles seront jointes et quen perdant leur mouvement elles cesseront de composer un corps fluide.

III. Cause de la secheresse pendant la gelée.

Lorsquil se rencontre une trop grande quantité de ces sels qui voltigent dans l'air et qui ny trouvent pas assez de particules deau pour pouvoir y estre entierement retenus, ils se portent pendre dans tous les autres corps, et y arrestent les particules deau qui y sont; d'où vient que les particules d'eau estant jointes aux particules de sels, elles perdent tout a fait leur mouvement, les sels n'en ayant point ou tres peu dans ces corps, d'où vient que ces corps et l'air mesme paroissent n'avoir plus d'humidité.

IV formation de la glace

Ces sels commençant a prendre une masse d'eau en arrestent d'abord quelques particules et plusieurs de ces particules de sel et d'eau jointes ensemble venant a s'assembler les unes avec les autres forment des filets glacés par ou l'eau commence a se geler, ces premiere parties de glace devient

retenir la figure des parties de sel qui leur sert de principe, comme il arrive dans la formation de la plupart des mixtes.

Si ces sels sont en tres grande quantité ils fixent, et gelent toute la masse de leau, mais il faut examiner, ce qui doit arriver a une masse deau dont les particules se gelent successivement.

V
pourquoy leau glace augmente volume et non pas espace.

Chaque particule de glace qui sera formé dans leau tient plus de place que leau dont elle a formé non seulement par laddition des sels, ce qui nest pas considerable, mais par les differens assemblages de ses particules gelés qui etant devenues roides et ne pouvant plus saccommoder les unes aux autres forment des pores lesquels sont entre leur ensemble, et en dilatant considerablement les espaces dair qui sont meler parmy les particules de leau. il est facile de comprendre comment ces dilatations se peuvent faire mechaniquement car on voit clairement quune certaine quantité daiguilles de petites aiguilles couchées diminuant leur longueur les unes sur les autres, occuperont bien moins de place, que lorsque les unes de ces aiguilles etoit entortillés autour des autres. Chacune de ces petites parties de glaces formés en filets devenant donc plus legere que le volume deau dont elle occupe la place, il faut

necessairement quelle tolaue vers la superfice
et lorsque le dessus de leau en est tout couuert, les
particules des sels survenant toujours tirent et attachent
tous ces filets ensemble dont il se forme une croute
de glace qui renferme toute leau aux bords
du vaisseau qui la contient, mais ~~leau ne pouuant~~
~~pas les comprimer~~ les sels passant au trauers de la
glace et rencontrant leau qui est au dessous, ils
continuent de former de nouueaux filets de glace
qui tenant aussi plus de volume que leau dont ils
sont formez font un effort contre leau dans laquelle
ils nagent et contre ce qui la contient: mais
leau ne pouuant pas se comprimer, elle rompt la
croute de glace par endroit le plus foible, et
glace au dessus auec violence: si le vase
qui contient leau etoit plus foible que la
glace qui est au dessus, il ny a pas de doute
que l'effort de leau le romproit.

VI
Comment se forment les bulles d'air dans le milieu de la glace.

La glace est toujours blanchatre, et bien
moins transparente que leau a cause de tous
les petits vuides qui s'y rencontrent et qui de-
tournent les rayons de la lumiere, quand la
glace qui s'est formée a fait une croute assez
epaisse pour ne pouuoir plus etre rompue par
l'effort de leau comprimée, et que d'ailleurs le vaisseau

qui la contient peut resister a cet effort, toutes les
particules de glace qui sont autant de petites
bouteilles font contre elles memes ce quelles ne
peuvent faire contre le corps qui les renferme
et ainsi elles se brisent les unes les autres par les
endroits les plus foibles, et les fragmens avec le
peu d'eau qui reste s'attachant ensemble, et a
toute la glace qui s'en formé, tant autour du
vaisseau, qu'au dessus, laissent dans le milieu
une espace vuide assez grand, qui est la bulle
d'air que l'on y voit ordinairement. mais par cette
explication cette bulle d'air n'est pas formé par
un air comprimé au contraire il doit etre un air
tres subtil et tres dilaté.

il se forme quelquefois plusieurs bulles par
les differentes separations qui se sont rencontrées
dans l'eau avant quelle fut tout a fait glacé
et qui sont divisée comme en plusieurs vases
qui contenoient de l'eau prete a se geler entierement.
quoyque les bulles soient toutes formés dans la
glace, il reste encore quelquefois un peu d'humidité
qui venant a se geler entierement, fait un dernier
effort contre la glace qui l'environne a la rompre
aussi le vase qui la contient, ces effets se trouvent
confirmés par l'experience.

VII.
Dilatation par augmentation de volume de leau chaude.

Cette par un contraire effet que leau chaude augmente de volume quoyquelle se purge des parties d'air quelle contient. Ces parties d'air etant extremement dilatées par la chaleur soulevent leau, et etant devenuës fort grosses par une grande dilatation, elles se levent vers la superficie, et enfin elles se dissipent; et sans avoir recours a une matiere fulminante, on peut dire que les petites particules d'air qui sont engagées entre les parties de leau venant a se dilater extraordinairement les unes apres les autres, a mesure quelles approchent de la superficie de leau forment ces gros bouillons qui s'elevent au dessus de leau. Cette seule dilatation des particules de lair renfermés dans les liquides, fait les bouillonnements que nous voyons dans ces memes liquides lorsquils sont dans le vuide, car lair exterieur ne les comprimant plus elles se dilatent a peu pres autant que par le effort du feu.

VIII.
Comment les particules deau s'elevent dans lair quoyquelles soient plus pesantes.

Les particules de leau etant longues et flexibles ecartent les parties grossieres de lair en se mouvant avec vitesse, en sorte quelles composent une petite Sphere dun air lis

subtil, dans laquelle se meut la particule de
d'eau : ainsi ces particules d'eau etant en tres grand
mouvement occupent un tres grand espace, et la
plus grande des petites spheres avec la particule
d'eau quelle contient pese moins qu'un egal
volume d'air grossier. Il n'y a pas de doute que
cette particule d'eau avec la sphere selevera
au dessus de l'air dans lequel elle nage. on
explique par ce moyen de quelle maniere les
particules de l'eau s'elevent en l'air quoy qu'elles
soient plus pesantes que des particules d'air
de meme volume.

IX. Condensation de l'air grossier par le froid.

Mais si ces particules d'eau qui sont en mouvement et qui sont comme un axe dans chaque Sphere qu'elles composent, viennent a etre rencontrées par les fils qui leur ostent le mouvement, l'air grossier pourra s'en rapprocher; et par consequent cet air qui occupoit auparavant un tres grand volume se reservera, comme on le peut voir dans une phiole vuide dont l'ouverture trempe dans l'eau, car le chaud et le froid font successivement descendre et monter l'eau dans le col de la phiole en dilatant et comprimant l'air qui y est renfermé, c'est sur ce principe que Sanctorius avoit construit le thermometre qu'on appelle de Florence; mais on l'a entierement negligé

depuis quón a reconnu quil navoit pas la jurtesse de ceux quón fait avec lesprit de vin qui agit dans le vuide, a leurs que les differentes pesanteurs de lair luy causoient une alteration tres sensible.

X
Letat naturel de leau est liquide dans nostre climat et autres froids.

Puisque leau augmente de volume a mesure quelle se echauffe, et quelle en augmente aussi quand elle se glace, il sensuit quil y a un etat moyen dans lequel elle sera renfermé sous le moindre volume quelle puisse etre; et cet etat est celuy ou leau en proye de la gelee: mais on ne peut pas dire que ce soit celuy qui luy est naturel, puisquelles en toujours meslée de quantité de particules d'air qui la mettent en mouvement, et qui en rendent le volume plus grand que si ces particules d'air n'y etoient pas, ou bien elles n'auroient aucun mouvement et liquide tout ensemble est adire que toutes les parties en puissent etre derangés par une force aussi petite quón la voudra supposer; ce qui est possible, si ces parties sont infiniment polies, il sensuivoit aussi que cet etat de leau causeroit une sensation de froid aussi grand que celuy de la plus forte glace, suivant la definition que jen ay donné dabord, si elle etoit capable darreter le mouvement des particules deau qui sont dans la peau quelle touche; mais a mesure quelle seroit disposé a se mouvoir tres facilement, elle ne pouroit faire quune tres foible impression sur

Les sens. il nin an pas de mime des particules déau glacé. car elles ne sauroient etre mises en mouvemt sans un effort alte grand sans en delacher les sels qui-lés ont arrestés, il faut donc faire vne tres grande dessernee entre le froid de leau dans son etat naturel et celuy dela glace ; ce que lón ne doit entendre que du repos des particules de leau dans ce deuxe etat.

XI. cause dun grand froid sans glace.

lorsquil se rencontre trop deau a proportion dela quantité des sels qui pourroient la fixer il ne se forme point de glace les particules de léau qui sont arrestées. auto ur des sels ne se peuuant pas joindre ensemble, a cause quil se rencontre entre deux trop de particules deau qui detachent celles qui sont dja jointes aux particules des sels — on les choquant continuellement, et la froideur de léau augmente seulement par la privation du mouuement de quelques unes de ses parties.

lorsquau contraire il y a dans léau une tres grande quantité de ces sels, une seule goute deau en retient trois et quatre fois plus dquil nen faudroit pour la priuer de mouuement, mais comme ces particules de sel qui ne sont arrestés a leau que par quelques endroits, lón detachent facilement

pour se joindre a de nouvelle eaux qui survient
et qui les touche en plus de parties.

XII
raison de ce qui arrive aux fruits [illegible] dans l'eau.

De la il s'ensuit que les corps gras et huileux
et qui n'ont que tres peu de parties d'eau, ne sont
pas propres a retenir les sels, et par consequent, ils
ne se gelent pas facilement. par cette raison les fruits
le vin, l'huile, et plusieurs autres liquides de
cette nature, ne se gelent pas aisement, quoyqu'ils
renferment beaucoup de ces sels qui y sont arrestez
a quelques particules d'eau. lorsqu'on fait un geli-
par la grande quantité des sels qui y sont introduits
si on le met dans de l'eau qui ne soit pas chaude
toutes les particules de sel, qui nettoient arrestés quel-
parties a l'eau qui est dans le fruit, s'en detachent
facilement pour s'insinuer dans l'eau qui environne
le fruit, parce qu'elles trouvent plus de facilité a se
joindre a ces parties d'eau, qu'a celles qui sont dans
le fruit entremelés de parties huileuses, ainsi il
arrive que le fruit se degele presque tout d'un coup.
et qu'il se fait tout autour une croute de glace
fort dure et fort claire; si l'eau etoit chaude
a trop grand mouvement des parties empeche-
roit que la glace ne se format autour du fruit
a cause que les petites parties glacés de l'eau et
de les sels ne pourroient pas se joindre ar

ensemble, et ce mouvement des particules de leau se communiquant a celles qui sont dans le fruit, en romproit le tissu, et le reduiroit en une espece de bouillie, en sorte quil perdroit entierement son gout.

C'est aussi de la meme maniere que se forme le verglas. Car apres une forte gelée, lorsque suivant cette hypothese, tous les corps sont extremement remplis de ces sels qui forment la glace, s'il tombe un peu deau sur des pierres, sur du bois, et sur dautres corps aussitot cette eau se glace et fait ce que nous appellons le verglas, a cause que les sels qui sont dans ces corps, et qui y sont attachez au peu dhumide qu'il y a, le quittent facilement pour s'attacher a leau qui survient, dont ils forment une crouste de glace qui les environne, pendant que ces corps se degelent presque aussitot, ensorte que la crouste de glace qui les environne peut en etre separée bien facilement. Si leau survient en trop grande abondance, ces sels ne peuvent plus se fixer et se melant indifferemment dans toute cette eau la glace se liquefie entierement.

XIII
Raison de la formation du verglas

On voit pourquoi les murs qui sont faits en partie de pierres dures, et de tendres et spongieuses, que pendant le degel, il se forme une espece de neige sur celles qui sont dures, et qui vient de ce que les

XIV.
ce qui arrive aux murs pendant le degele.

les particules de leau repandues dans lair, qui y forment ordinairement des brouillards attq lpais rencontrant les corps durs qui sont remplis des sels qui les peuuent fixer, les gelent tout autour — parceque ces sels lq attachent, et les particules deau venant successiuement se joindre aux premieres — elles lq gelent aussi presque en meme tems en sattachant les unes aux autres et forment toutensemble cette espece de nége que nous voyons sur ces — pierres. les autres pierres qui sont molles et spongieuses contiennent une plus grande quantité déau, et les particules deau qui sont repandues dans lair finissent plutot dans les pores de ces pierres, quelles ne sont arretées par les sels qui y sont, et qui dailleurs ont une assez grande quantité dhumidité pour les retenir, on peut aussi rendre raison dela meme maniere dela formation de cette espece de nége qui sattache aux petites branches des — arbres et aux cheueux.

XV. Pourquoy les corps glacés paroissent plus froids que lair.

Lair ne paroit jamais si froid que les corps glacés, car il ne sauroit retenir autant deau — que les autres corps, et par consequent il y aura moins de ces sels qui fixent leau que dans les autres corps, il arriuera donc que si lon applique la main contre un corps glacé, on sentira un tres grand froid car les sels qui y sont entres —

grande abondance, et qui n'y pas fortement retenus, le quittent en partie pour se joindre a l'humidité qui y a dans la chair de la main.

On trouvera aussi que l'eau qui est très froide et prête a se glacer, paroitra beaucoup plus froide que l'air par la même raison: mais il arrivera le contraire en été, car l'eau des rivieres & des etangs paroist beaucoup plus chaude que l'air, comme on l'en apercoit en se baignant, et qui ne vient que de ce que l'eau qui est un corps plus grossier que l'air, reçoit plus fortement la chaleur du soleil et la conserve plus longtems outre que dans cette saison il y a très peu de sels propres a arreter le mouvement des particules de l'eau.

On peut encore rendre raison par cette même hypothese, de ce qui arrive au thermometre pendant une forte gelée; supposant, comme il est assez vraysemblable que le vent pousse les sels dont nous parlons, les fait entrer avec plus de force dans les corps.

Lorsqu'il gele très fort, si l'on expose au vent un thermometre qui étoit clair il descend considerablement; mais si l'on couvre la boule du thermometre avec de la neige, l'esprit de vin qui s'étoit resserré dans la boule, remonte aussitot dans le tuyau.

XVI
experience de thermometre. couvert de neige qui remonte dans une forte gelée.

Voicy comme je rends raison de ce phenomene, le vin fait passer au travers du verre plus de sels qu'il n'en passeroit dans son estat, et les particules d'eau qui sont dans l'esprit de vin s'en chargeant autant qu'elles peuvent elles ~~peuvent~~ perdent presque entierement leur mouvement, et par consequent elles occupent moins de volume qu'auparavant, et l'esprit de vin se condense mais ensuite si l'on couvre le thermometre avec de la neige, l'esprit de vin remonte dans le tuyau, car les particules des sels qui s'estoient joints a l'humidité meslée parmy l'esprit de vin, s'en detachent facilement pour se joindre a celle de la neige qui en plus propre a les retenir, en ayant une plus grande quantité.

XVII. *experience du thermometre fermé dont la liqueur se rarefie dans une fonte gelée.* *application de cette experience au usage que l'on fait de la neige pour degeler les parties du corps.*

L'on par cette meme raison que lorsque quelque partie du corps s'en gelé par un tres grand froid on y applique aussitot de la neige qui retire a soy les particules des sels qui s'estoient insinuées dans les chairs, ce qui retablit la partie dans son premier etat qui le corrompoit sans ce prompt secours.

XIII *explication des congelations pendant l'été.*

Il ne sera pas difficile dans cette hypothese d'expliquer comment se font les congelations des liqueurs pendant l'été. on prend de la glace pilée ou de la neige parmy laquelle on mêle beaucoup de sel, et ayant enveloppé un vaisseau plein d'eau

on trouue quelle se gele en tres peu de tems.
si lón ne met point de sel parmy la nege leáu
ne se gelera pas, a moins quelle ne soit
deja tres froide. le Salpetre autant de sel fait
plus deffet et le sel armoniac beaucoup plus.

Le sel commun, le salpetre, et le sel armoniac
contenant vne grande quantité des sels qui seruent
ala congelation, augmentent la force de la nége
en le mélant parmy eeux qui y sont retenus,
et penetrant ensemble le vase qui contient leau
ils la font prendre facilement. si lón náoutoit
point de sel auec la nége, les particules des sels
quelle contient auroient dela peine a sén detacher
náy en ayant pas vne trop grande quantité, le
superflus qui netoit pas fortement arresté dans
leáu dela nége, seroit dissipé depuis le tems
quelle a ete renfermé et de plus, le peu qui
sén detacheroit ne pourroit pas faire prendre les
petites de leau du vase qui sont entre ses grand
mouuements.

Jl nén arriueroit pas de meme sileau etoit
tres froide comme dans lhyuer car dans ce
temps la la seule nége sans sel peut faire
geler léau.

XIX
raison du sel armoniac tout seul.

fait-on par cette même raison que l'on fait geler de l'eau qui est très froide, en enveloppant la phiole avec du sel armoniac tout seul sans le secours de la neige, car ce sel contenant une grande quantité de sels qui servent à la congelation, il en passe beaucoup au travers du verre, lesquels se joignant à l'eau qui n'a presque de mouvement, ils la glacent fort aisément.

XX
on rafraichit l'eau dans la zone torride.

On dit que sous la zone torride on fait rafraichir l'eau à-devin en exposant à l'air pendant la nuit le vase ou la bouteille qu'on a couverte et enveloppée auparavant avec du sel ou du salpetre, l'air de la nuit dans ce pays là est très froid ; en admettant dans notre hypothese qu'il y a beaucoup de sels propre à geler l'eau ; lesquels étant joints à ceux du salpetre augmentent considerablement leur force pour-ôter le mouvement à une grande partie des particules de l'eau.

XXI
l'esprit de vin fait beaucoup à la congelation des liqueurs.

Lorsque l'on fait geler quelque liqueur pendant l'été, si l'on jette de l'esprit de vin par dessus la glace ou la neige qui est mêlé avec le sel ou le salpetre la liqueur se gêle plus fortement et plus viste.

Cet effets est causé par les sels propres à la congelation des liquides dont l'esprit de vin est rempli

quoyquil ne puisse pas le congeler luy meme a
cause des parties huileuses quil contient, lesquelles
empechent la congelation.

On ne peut pas douter que l'esprit de vin ne
soit rempli de ces sels; car silon en fait l'analyse
en le faisant bruler, on en tire une tres grande
quantité déau fort claire et tres acre au gout
laquelle ná plus rien dinflammable.

On empeche les fruits de geler quand on les
couure dun peu de paille, et quon etend par — XXII.
dessus un drap mouillé. il est facile de voir que pour empecher les fruits de geler.
suiuant cette hypothese, ce drap mouillé empeche
que le gelé ne penetre jusquau fruit; car les —
particules des sels rencontrant leau de ce drap
mais si au lieu dun drap on le couuroit — avec une
natte de paille fort epaisse et qui fut bien
mouillé il ny a pas de doute que le fruit ne se
conseruat encore mieux sans le geler, car il y
auroit une plus grande partie de sels qui —
pourroient s'arreter dans leau de la natte.

Les paillassons dont on couure quelque
plante dans les jardins pour les conseruer contre
la rigueur du froid font a peu pres le meme
effet, lors quil tombe dessus de la neige ou de la

nége : outre qu'il s'éleve continuellement de la terre une vapeur temperée qui entretient la plante, et qui s'attachant aux paillassons par-le dedans les gele et empeche les fels de passer plus avant.

XXIII
Qu'il se forme quelquefois de la glace en hyver fort froid et même en été dans des caves bien closes

On peut encore expliquer par cette hypothese un phenomene assez extraordinaire qui est la formation de la glace dans un temps qu'il ne fait pas froid, et même pendant l'été, il le peut faire qu'il y a dans la terre en quelques endroits une tres grande quantité de fels qui servent a la congelation, comme nous voyons qu'il y a des carrieres de fel commun et de salpetre. La partie la plus volatile de ces fels ne pouvant se detacher de la matte ou elle est enveloppée et ne pouvant s'elever que dans une certaine disposition de l'air exterieur on ne doit pas s'etonner si l'on voit des ruisseaux et meme des rivieres se glacer dans un tems ou il ne fait que mediocrement froid ; car si ce temps est propre pour l'evaporation de ces fels il n'y a pas de doute qu'en s'insinuant dans l'eau ils la glaceront fort promptement, on doit remarquer qu'il ne se formera pas toujours

de la glace quoyquil sdeue de la terre une
grande quantité de ces sels, cos le grand mouue=
ment des particules de leau pourra empescher
leffet que les sels deuroient produire.

si dans la glaciere de Besançon en franche
Comté nous supposons quil sélue plus de sels propre
ala congelation dans lété que dans lhyuer,
leau demeurant dans ces lieux souterrains a
peu prés dans le meme etat de chaleur ou de froid
pendant toute lannée, et la quantité des sels etant
alle grande pour faire leau dans letat ou elle en
il faudra neccessairement quil sy forme de la
glace dans cette saison, et quau contraire en
hyuer leau soit coulante, et quelle paroisse chaude
comme on le juge de tous les eaux eaux qui sortent
de terre pendant le froid.

les particules de leau repandues dans lair, et
qui sont fixées par les sels, ne pouuant plus le
soutenir a cause quelles sont plus pesantes que
lair par leur nature, et quelles ne composent plus
ces petites spheres dair subtil dont nous auons
parlé, sattachent a tous les corps quelles rencontrent
et forment en partie cette neige ou giture qui tient

XXIV
leau gele
plutot en
touchant un
corps froid que
lorsquelle en
exposée a lair.

au corps les plus delicat, et mesme aux filets des toiles daraignée, ainsi dans la forte gelée l'air se doit purger de toute son humidité, et en autant dans ce temps la qu'il paroit le plus pur lors qu'on observe les planetes oubi etoiles auec les grandes lunettes d'approches. alors l'air nayant plus ou tres peu d'humidité pour retenir les fels qui le fournissent continuellement ils continuent autant qu'ils peuuent dans tous les corps et s'attachent aux petites particules d'eau qu'ils y rencontrent. Et pourquoy si les fels discontinuent de s'eleuer en aussi grande quantité qu'ils faisoient auparauant l'air ne paroitra pas bien froid, pourueu qu'il ne soit pas humide, et l'eau que l'on exposera a cet air ne pourra pas se geler sur tout s'il y en a vne epaisseur considerable, mais si l'on tient cette eau sur quelque corps qui le soit rempli des fels propres a la geer. ils la toucheront en beaucoup de parties, et s'y joindront autant que en se debarassant de celle qui est dans ce corps et a laquelle ils ne sont attachez qu'en partie et la geleront presque en vn moment comme i'ay deja dit en expliquant la cause du verglas.

je dis que lair ne paroitra pas bien froid
sil contient peu de sels, pourveu quil ne soit pas
humide, car pour lors les particules de leau dont il doit humide
les particules deau quil contiendroit se chargeroient
promptement des sels qui sont repandus dans tous
les corps auxquels ils ne sont pas fortement
attachez, et par consequent un air humide et
presque gelé, nous feroit sentir un grand froid
en nous communiquant une partie de les sels
comme je lay deja expliqué.

On pourroit mobjecter que le fer et les autres
metaux paroissent tres froids au toucher, quoyquil
ne paroisse pas quils puissent retenir une grande
quantité de sels qui servent a la fixation
de leau.

XXV
objection sur
ce que les metaux
paroissent tres
froids, quoyquil
ne puissent pas
retenir
beaucoup de
sels.

Il est vray quil ne semble pas que dans ces
corps il puisse y avoir beaucoup dhumidité a
laquelle les sels puissent sattacher, mais il est certain
quil y en a beaucoup qui sattachent sur leur
superficie et dans les petites inegalitez qui sy
rencontrent, et ces particules deau etant avrestées
par les sels, se communiquent presque toutes a la
fois ala chair de la main qui les touche, et ce
ce qui fait sentir dabord un grand froid comme

j'ay dit cy dessus dans l'article 15.

XXVI. Il y a des vents tres froids a quoyqu'ils ne soient pas violens.

Entre toutes les observations que l'on fait sur le froid, il y en a une qui me paroit tres considerable et qui favorise beaucoup cette hypothese, dans une mesme saison de l'année on sent quelquefois des vents chauds, et quelquefois des vents froids et quoyque le jugement que l'on fait du chaud et du froid depende en partie de la disposition des organes du corps, on ne sauroit pourtant nier qu'entre des vents d'une egale force il n'y en ayent qui ne soient plus chauds ou plus froids les uns que les autres.

Il faut donc qu'il y ait dans les vents que nous appellons froids quelque chose qui fasse sur notre corps une impression differente de celle que font les autres vents qui ne nous paroissent pas si froids quoyqu'aussi violents, mais puisque les vents ne sont qu'une agitation de l'air, il faut donc qu'il y ait dans cet air quelques parties que le vent agite, de telle sorte qu'elles fassent sur notre corps une impression differente de celles qu'elles y faisoient auparavant, et je dis que ces parties ne sont autres choses que les fils qui servent a filer l'eau, qui penetrent la peau quand

ils sont agitez avec plus de violence que lors qu'ils flottoient librement dans l'air; en ce qui se trouve confirmé par l'experience du Thermometre que j'ay rapporté dans l'article 16e

Enfin il est facile de rendre raison pourquoy la glace se fond plus viste et plus facilement dans l'eau tiede qu'auprés du feu; car suivant cette hypothese les particules des sels qui ont fixé l'eau s'en detachent facilement pour se joindre a d'autres particules d'eau qui les environne; au lieu qu'il faut que le feu fasse un grand effort pour les mettre en mouvement, et pour les arracher de l'eau, de laquelle ils entraisent toujours une grande partie quand la glace commence a se fondre. l'experience nous montre aussi qu'on peut se rechauffer les mains bien plus promptement et plus facilement dans l'eau chaude qu'auprés d'un grand feu.

XXVII
la glace se fond plus viste dans l'eau tiede qu'auprés du feu.

On voit aussi le commencement des pierres qui etant exposées a la gelée se separent par feuillets et sur tout si elles ont été mouillées un peu avant la gelée. il n'est pas difficile de reconnoitre que cette separation se fait selon les differents de la pierre qui ne sont joints ensemble que par

XXVIII
remarque sur la gelée des pierres dont on se sert dans les Batimens

matiere molle et Spongieuse, qui peut retenir beaucoup plus deau que le reste dela pierre. Cette eau venant a se geler doit occuper plus de place quelle ne faisoit auparavant, comme jay expliqué cy devant, et faisant le meme effet quune infinité de petits coins quon y auroit introduits, elle casse et la separe dans les endroits ou il y a une plus grande quantité deau.

On voit des pierres qui gelent, et d'autres qui ne gelent pas quoyquelles soient tirées des memes carrieres, et quelles soient posées dans les memes endroits dun batiment, et ce qui pourroit faire croire que la gelée des pierres ne vient pas toujours des separations quil y a entre les lits outre que lon voit quelque pierre dont la gelée enleve des eclats semblables a peu prés a ceux que les ouvriers abbatent de leurs pierres a grands coups de marteau et lon remarque aussi que la plus part des fentes qui se font aux pierres gelées ne suivent pas la direction de leurs lits.

Cette observation ma donné lieu de croire, que la maniere dont on taille les pierres peut contribuer beaucoup a les faire geler, en adve

a les faire eclatter, et rompre pendant la gelée.

Voicy de quelle façon les ouvriers la font ordinairement les pierres.

Apres auoir dressé quelques uns des parements et des lits dune pierre, ils sont obligés pour luy donner la forme qui luy conuient den abbatre vn morceau considerable, pour quelquune des extremités, et pour aller plus vitte; ils frappent dessus a grands coups des plus gros marteaux dont ils se seruent. or il est impossible que par les coups violents ils n'étonnent toute la masse de la pierre, encore dans quelques endroits il ne les fasse de petites fentes a cause de l'opacité de la pierre, mais aux corps mars parens comme au verre on les reconnoit fort facilement. l'eau estant ensuitte insinuée dans ces petites fentes fait la gelée fesuient de la gele, et luy faisant occuper plus de place quelle n'en tenoit absolument par les raisons que j'en ay données cy deuant, la pierre se fend dans les endroits ou il y auoit des fentes.

Les pierres qui sont fort engagées dans vn batiment, et chargés d'vn grand poids, ne se peuuent fendre par leurs lits, ce que les ouuriers appellent se deliter, a cause que la grande pesanteur resiste a l'effort que font les particules de la glace pour

casse les pierres en esclats.

J'ay fait souvent une experience qui me persuade que les coups quón donne sur une pierre, quand mesme ils ne seroient pas violens, sont capables d'en desunir les parties par les endroits ou elles ne sont pas fortement liées les unes avec les autres.

J'ay pris un grais fort gros, et qui me paroissoit d'une consistance tres ferme et tres solide, et en le tenant dans la main, j'ay frappé dessus a petits coups de marteau, et j'ay apperceu qu'en tres peu de temps il se fendoit en plusieurs endroits dont il tomboit quelques grains, et enfin j'ay trouvé que ces coups en avoient tellement ebranlé toutes les parties, que l'on pouvoit le reduire en poudre en le froissant entre les doigts. Il n'arrivera pas la mesme chose aux pierres molles et spongieuses comme la pierre de Saint Leu; car les coups de marteau quón donne sur ces pierres s'amortissent et font seulement rentrer quelques parties les unes dans les autres en les cerasant et ne peuvent pas facilement y faire des fentes.

On a fait encore sur la gelée des pierres d'autres experiences qui confirment le systeme de la glace que je propose cy. vers la fin de

l'automne on a employé dans un batiment considerable
des pierres de faim leu en trois manieres differentes.
dans la premiere les pierres avoient été exposé au
soleil, pendant tout lété et selevoient restuyer entierement
dans la seconde, les pierres avoient aussi passé tout
lété a selevoient restuyé entierement sur le pont, mais
un peu avant que detre employés la riviere etant
crue elles ~~avoient~~ etoient demeurés assé long temps dans
leau, et lorsquon les employa elles etoient toutes
mouillés; dans la troisieme les pierres etoient
nouvellement tirés dela carriere; et navoient
pas encore eu le tems de le restuyer.

il en arrivé que les premieres se sont fort bien
conservés pendant lhyver comme il arrive ordinai-
rement a cette sorte de pierre que les secondes, quoy-
quelles fussent toutes mouillés nont pas laissé que
de resister a leffort dela gelé mais que les troisieme
se sont presque toutes cassés entre gelant.

Pour les premieres on ne voit rien qui les
auroit pu gelé: mais il semble que les secondes etant
toutes remplies deau auroient du se rompre toutes
par la gelé, car on ne peut pas douter que leau
dont elles etoient remplies ne se soit gelé, cependant
la glace na fait aucun effort contre cette pierre.

on pourroit croire que cette pierre mouillée
fût ainsi crue a peu prés de la même maniere que
j'ay expliqué cy devant que l'on conserve les fruits
pendant la gelée, en disant qu'il s'en fait sur la
superficie de cette pierre une croute de glace
qui a empeché que le froid n'ayt pendré fort
avant au dedans les particules de sels s'étant arreté
dans l'eau de la superficie. mais pour les troisiemes
elles se sont gelés jusques dans le cœur, quoy qu'elles
ne fussent pas si mouillés que les secondes, a cause
qu'etant encore nouvellement sorties de la carriere
elles conservoient quantité de sels qui doivent propres
a la congelation de l'eau, et qui n'avoient pas eu le
temps de s'en degager. les secondes au contraire s'en
étoient entierement purgés, car quand meme il en
seroit un peu resté au dedans apres auroit demeuré fort
long temps exposés a l'air, il m'est vray que l'eau
dans laquelle elles auroient trempé les auroit dissous
et les auroit entrainés a peu prés comme il arrive
au bois flotté outre que suivant cette hy=
pothese ce sont de sels le plus facile=
lement a l'eau que toutes sortes d'autres
corps.

Il reste seulement icy une difficulté qui est de sauoir comment cette pierre qui est homogené sera rompüe en se gelant jusques dans le eaue, puisqu'elle n'a point de lits ou des fils dans lesquels l'eau se puisse conserver en plus grande quantité que dans le reste de la pierre ce que j'explique en cette maniere.

Il arriue a ces pierres la mesme chose a peu prés qu'a des vases remplis d'eau, ou a quelque gros morceau de glace dont le milieu ne se prend — tout a fait quand peu de temps apres que les bords se sont gelés les vases où ces morceaux de glace se cassent en plusieurs pieces lorsque l'eau se prend — entierement et fortement, par les raisons que j'en ay — donnés dans l'article 6e

On peut encore donner une raison pourquoy les pierres qui sont gelées jusques dans le eaue, se rompent plus facilement etant employées et mises en auure que lorsqu'elles sont exposées a l'air dans un chantier, et ce ce que l'on voit arriuer assez souuent a des pierres, qui ayant été nouuellement tirées de la carriere, ont resisté a de fortes gelées et quand elles sont employées elles se cassent au premier effort du froid.

Cet accident peut arriuer comme j'ay deja

remarqué) par le travail qui peut avoir fait quelques
fentes imperceptibles jusques dans le cœur de la pierre.
mais quand on supposeroit qu'il n'y auroit aucune
felure ou fente, il le peut faire qu'une pierre en se
gelant tout a fait ou en partie se casera dans
employé dans une masse de batiment, la quelle
resisteroit a un semblable effort de la gelée si elle
etoit exposé a l'air voicy la raison que j'en donne

Il n'y a point de corps qui ne soit capable de
ressort les uns plus les autres moins, l'experience nous
fait voir que les pierres en ont beaucoup et qu'elles en
ont plus a proportion qu'elles sont dures, nous savons
aussi que la glace a un grand ressort, c'est pourquoy
les pierres glacés doivent avoir beaucoup de ressort.
mais nous connoissons par la geometrie que de
tous les solides on forme par des superficies egales —
il n'y en a point de plus grand que la sphere, c'est=
pourquoy une bouteille qui est spherique lorsqu'elle
est remplie d'eau qui vient a se geler, elle se casse
tout aussitot; car l'eau occupant plus d'espace qu'elle
ne faisoit auparavant, force la bouteille de
se rendre: mais comme elle ne peut pas prendre une
figure qui ait une plus grande capacité avec la
meme superficie, elle ne sauroit resister que tres-

peu a cet effort sans le rompre, cest a dire autant que la texture des parties peut se relacher sans se separer entierement.

Il nen sera pas de meme, si la figure de la bouteille ou de la glace est un parallelipipede; car comme elle pourra prendre une figure qui contiendra plus d'espace, elle resistera beaucoup plus a leffort de la dilatation, comme on voit par lexperience dune bouteille applatie, qui senfle un peu lors quon souffle dedans, et qui par consequent peut resister beaucoup plus a leffort de la glace que si elle etoit Spherique.

Par cette raison il est aisé de voir quune pierre qui est pour lordinaire parallelipipede, etant gelée jusque dans le cœur et etant exposé a lair peut prendre une figure qui contiendra un peu plus que celle quelle avoit auparavant, les superficies, et sur tout les lits venant a s'élever un peu vers le milieu. mais si cette pierre est engagé dans un corps de batiment, jtne peut a lair pour lordinaire quune seule des moindres superficies qui la renferme et qui meme ne doit pas etre un des lits, car pourquoy cette superficie de la pierre ne pouvant pas souffrir toute seule autant dextension que tous les autres ensemble, se doit rompre par un bien moindre

effort que lorsquelle etoit toute exposée alair, on ne
doit pourtant pas comparer leffort de la glace a la
partie de la superfice de la pierre qui en exposée
a lair car il faut considerer que le froid a bien —
moins de prise sur une pierre qui en engagée
dans un batiment, que sur celle qui en exposée —
a lair.

XXIX
observation
sur le marbre

Ce que jay dit des felures des pierres en si veritable
que dans les ouvrages darchitecture et de sculpture
on doit eviter avec grand soin de se servir des marbres
qui ont été petardez, cest a dire dont les blocs ont été —
detachez de leur masse dans la carriere par leffort
dun petard de poudre a canon. car leffort du petard
ne separe pas seulement le bloc de toute la masse
de la pierre. mais il etonne toute la pierre des —
environs et le bloc quil detache, les etonnemens ou
ebranlemens causé dans la pierre des cassures ou felures
qui sont dabord imperceptibles, mais peu a peu lair —
sinsinuant dans ces petites fentes, corrompt le marbre,
a les fentes commencent a se faire voir, et ainsi lair
poursuit ainsi mes en assez grande quantité dans ces —
ouvertures la gelée peut etre assez forte pour rompre
de tres gros blocs de marbre comme je lay expliqué
cy devant.

Mais on auroit peut etre dela peine a croire que de tres petites particules deau venant a Son flux un peu puissent faire un effort si violent Si lon nen auoit une preuue dans une experience tres familiere: lorsqu'on veut fendre de tres grosses pierres qui tiennent dela nature du Caillou, et quon appelle meuliers a eaue quon Sen Sert a faire des meules de moulin; on fait tout au tour a lendroit ou lon veut la fendre de petits trous dela profondeur de deux pouces environ, et dela grosseur dun quart de pouce; ensuite on prend des cheuilles de bois de Saule bien Seché au four, les quelles etant enfoncés avec force dans le trou, on jette de leau egalement Sur toutes ces cheuilles qui Se renflant peu a peu font enfin un Si grand effort toutes ensemble quelles fendent la pierre alendroit ou elles Sont placées.

XXX. Experience Sur les pierres meulieres.

Lair qui est toujours en mouuement et qui contient quelques parties des Sels qui Sont propres a fixer les particules de leau rapportant contre la peau de nouueaux Sels a mesure que ceux qui la touchent ont penetré au dedans, et le Sont joints a lhumidité dela chair, et pourquoy la peau qui est exposé a lair doit Sentir du froid qui Saisyssant et qui penetre au dedans jusqua ce que le mouuement du Sang qui uient

XXXI. pourquoy on Sent dela chaleur en touchant certains corps comme la laine la plume &c

continuellement du cœur soit assez fort pour resister
a la violence que font les fels pour le joindre aux
parties de leau qui sont dans la peau et dans la
chair. mais quand on touche des corps qui sont secs
et gras de leur nature et qui ne peuuent retenir
quune tres petite quantité de fels qui seruent
a la congelation, comme la laine, le coton
la plume et dautres, on sent une espece de chaleur,
car les corps empeschant lair qui enuironne la peau
ne font en grand mouuement, il ne seruient que
fort peu de nouueaux fels qui puissent la pendre
et le mouuement du sang s'étendant plus qu'il ne
faisoit auparauant: on commence a sentir dela
chaleur dans les parties ou lon sentoit
du froid.

Quelquesuns de ces corps comme la laine
peuuent encore faire sentir dela chaleur par une
raison differente de celle que je viens de
rapporter; car comme les poils sont courts et friser-
elle est comme heriſſé dune infinité de petites pointes
qui piquottent et frottent la peau quand on la
touche ce qui y cause dela chaleur. cest auſſi
ce que lon remarque quand on n'a pas accoutumé

de Servir des etoffes de laine posés jmmediatement
Sur la peau comme des gands qui y excitent une
chaleur formée par un piquottement et une demangeai-
son presquin supportable, les gands de chamois dont
le poil en tourné en dedans font aussi a peu pres le
meme effet; le linge de coton cause aussi dela deman-
geaison ala peau acause que les petits poils sont
courts et frisés: mais comme ils sont beaucoup plus
delies que les autres et quils ne font par dela na-
ture du poil des animaux, ils ne font par un effet
aussi sensible.

On explique aussi de la meme maniere, pour- XXXII.
quoy le linge fait de chanvre et delin paroit froid que le linge
quand on le touche. car etant composés de fibres longues paroit ordi-
et delies comme de petits filets de verre, elles sapli- rairement
quent exactement et en atte grande quantité les froid quand
particules de leau qui sont repandues dans lair et on le touche.
qui en facile a lenvoier lesquelles se chargent en
suitte des sels propres a geler leau.

Pour ce qui regarde la refraction de la glace. XXXIII
j'ay fait imprimer dans les memoires de lacademie dela refrac-
du mois feburier de lannee 1693 quelle etoit un peu tion dela
moindre que celle de leau dont elle est formée, ce qui glace.
est conforme a ce que lon observe ordinairement.

de la nature des corps transparens ; car on sçait que la refraction du diamant est plus grande que celle ~~d'eau~~, que du cristal de roche ; que celle du cristal de roche en plus grande que celle du verre ; que celle du verre en plus grande que celle de leau ; mais on sçait aussi que le diamant est plus dur que le cristal de roche, en adire que la texture de ses parties en plus serrée, le cristal de roche est plus dure que le verre, et le verre plus que leau : et comme on sçait que le composé des particules de leau en plus serré que celuy dela glace ; quoyquil ne soit pas si dur, ce qui vient seulement de ce que les parties sont en mouvement et que celles dela glace ny sont pas, ce que je ne crois pas quon puisse mettre en doute, puisque la glace occupe toujours un plus grand volume que leau dont elle en formée, il sensuit donc que la refraction de leau doit etre plus grande que celle de la glace. il ne faut pas toujours avoir egard ala dureté des corps pour en conclure la quantité de leur refraction, puis! que nous sauons par experience que la refraction de lésprit de vinaigre en a tres peu près semblable aelle du verre, et quelle

on beaucoup plus grande que celle de leau. com=
pour quoy il faut attribuer cette grande refraction
dans lesprit du vinaigre aux parties qui le compo=
sent, quoyquelles puissent avoir un aussi grand
mouvement que celles de leau; ce qui rendroit ces —
deux composez également liquides.

La nature du liquide peut apporter de grandes
varietez ala glace qui sen forme, car comme on
voit que pour le 2e systeme il ny doit avoir que les —
parties aqueuses qui sont melees dans le liquide
qui puissent le fixer, il en resulte que les autres parties
peuvent ~~la~~ apporter de grandes diversitez soit dans
la durete dela glace, soit dans la figure des petits filets
par lesquelles elle commence a se former, soit dans le
poli de sa Superficie, soit enfin dans la figure des —
bulles dair qui la forment au dedans. Monsieur
Homberg nous a fait voir que de leau commune
qui sestoit gelé dans une phiole de verre avoit —
mis des morceaux dantimoine sans aucune
preparation etoit remplie de bulles dair dune —
figure fort differente de celle quon remarque
ordinairement aux bulles de leau commune, on —
pourra voir toutes les circonstances de cette

observation dans les memoires de l'academie.

XXXIX
pourquoy leau salée se gele plus difficilement que leau douce.

Il semble que leau salée devroit se geler plus facilement que leau a cause quil y a toujours parmy le sel commun beaucoup de sels propres a faire leau congelante on croyoit le contraire, il ne sera pas difficile den rendre raison dans ce systeme car quoyquil y ayt dans leau salée beaucoup de sels propres a faire leau, les autres sels qui y sont en grande quantité empechent les petites parties qui sont gelées de se joindre les unes aux autres en se mettant entre deux, ce qui n'arriveroit pas de meme sil y avoit de leau, dont les particules se pourroient joindre a celles qui sont deja glacées, en les avoisinant par differents endroits et former toutes ensemble un massif de glace.

XXXV.
pourquoy il y a des huiles qui se gelent et dautres qui ne se gelent pas.

La meme raison peut servir pour expliquer pourquoy entre quelques liquides comme les huiles il y en a qui se gelent et dautres qui ne se gelent pas ou tres difficilement, comme huile de noix quine se gele pas ordinairement, et qui perd seulement un peu de sa liquidité dans de tres grands froids, au contraire lhuile dolive se gele au moindre froid : car elle a ete trouvé pour les

parties grasses qui sont meles entre les aqueuses et qui les empechent de se joindre si elles sont en grande quantité, comme a huile noire: au contraire s'il y en a peu comme dans l'huile d'olive elle se joindront facilement. il faut pourtant avoüer que s'il n'y avoit que de l'eau simple meslé dans l'huile d'olive, elle ne pourroit pas se geler aussi facilement qu'elle fait, mais on doit attribuer cet effet aux sels qui y sont meles, et dont la plus grande partie peuvent etre de la nature de ceux qui fixent l'eau ce sont de ces sels dont on purge l'huile d'olive pour la rendre plus coulante et moins sujette a a rouiller le fer, comme les horlogers l'en servent ordinairement, en y melant de la limaille de plomb qui y devient blanche et qui la change en ceruse.

Explication des differences des sons de la corde tendüe sur la trompette Marine.

Il y a plusieurs années qu'ay eu occasion

d'examiner pourquoy la corde de la trompette
marine ne pouuoit donner que de certains
tons, comme la plus part des instruments a
vent; je crus qu'en suiuant les simples loix
des mouuemens des corps ebranlez qui sont
capables de resort je pouuois rendre raison de
ces effets. je commençay alors a en mettre par
ordre quelque chose mais ayant été detourné
par d'autres occupations je n'y auois plus pensé
jusqu'au commencement de cette année 1630
que j'examinay la chose a fond dont voicy
vn extrait.

Les Experiences que le pere Mersennes fit
autrefois pour demontrer que les differens tons des cordes
etoient formez par leurs differentes vibrations, et celles que
plusieurs Mathematiciens ont encore faites depuis sont si
conuaincantes que c'est un systeme qui ne reçoit aucune
contestation. les differentes vibrations font les differens
tons, et les vibrations sont entre elles selon la longueur
des cordes. ainsi la corde qui a 10 pieds de lon=
gueur et qu'on tendüe d'une certaine façon fera
par ses vibrations en une seconde, la moitié de cette
corde qui demeurera toujours tendüe de la meme

maniere fera 200 vibrations dans le mesme temps dune seconde. on trouve aussi par experience que les sons differents de ces deux cordes font la ~~correspondance~~ consonance que lón appelle octave ou bien ce qui est la meme chose les deux cordes sont a loctave lune de lautre, et lón le plus grand rapport qui puisse se trouver dans les nombres entiers en posant lunité pour le premier terme.

Si les vibrations ne se rencontrent que de trois en trois, cest a dire, si elles sont comme 1 a 3. ou si lon ne prend que le tiers dela corde lequel fera trois vibrations contre une dela corde entiere, la consonance sera celle quon appelle la quinte qui est la plus parfaite apres loctave, mais cette quinte est celle du second ordre.

Si lon passe

si lon passe ensuite a dautres diuisions comme de 2. a 3. de 3. a 4. de 1 a 4. que on aura les autres consonances de suitte, qui seront dautant moins parfaites que les vibrations se rencontreront plus rarement ; et enfin lorsque loreille ny peut plus y appercevoir de rapport sensible on en parvient aux dissonances.

Il sensuit donc que si une corde tendüe en diuisé en deux egalement et quón touche les deux parties toutes ensemble on entendra lunison, si elle en diuisé dans la raison de 1 a 2. on entendra loctave, si elle en diuisé dans la raison de 2. a 3. on entendra la quarte et ainsi des autres.

Cecy etant posé il faut examiner premierement ce qui forme le son dela trompette marine ; ensuitte pourquoy elle donne toujours le meme ton, quoy quón touche la corde vn peu au dessus ou au dessous, dela juste diuision qui conuient a ce ton et ainsi pourquoy elle fait les sauts en passant seulement de loctave ala quinte et ensuitte ala quarte, et ainsi de suite par les autres consonances jusqua leur.

Si une corde AB en bien tendüe et quelle soit
diuisé en deux egalement au point C, ayant
posé le doigt contre la corde C ensorte quón
ne fasse que la toucher legerement il arriuera
que faisant former deux parties comme AC,
en la touchant de quelque maniere que ce soit
l'ebranlement ou les vibrations de cette partie le
communiquerons a la autre partie CB, ; lors la
corde etant en mouuement, s'ecartera tout a fait
du doigt et le rencontrant ensuitte dans chaque
vibration, elle se separera comme en deux
cordes egales qui feront chacune leurs vibrations
egales et pareils entr'elles a cause des longueurs
egales des cordes. chaque partie de la corde fera
donc un son separé mais a cause des vibrations
egales les sons seront semblables, et ils se con=
fondront lun auec lautre.

Il est facile a connoistre que le son que
rend la partie AC, de la corde lorsqu'on la touche
en tres fort en comparaison de celuy quelle rend
ensuitte, et de celuy de la partie CB, quoyque ce
ne soit quun meme ton. mais si vers le milieu
de la partie CB on y arrete une petite patenostre

D de verre ou d'acier et que lon applique tout proche
dela corde un petit timbre E soutenu sur
lappuy G. lors que la partie CB que lon touchera
la patenôtre D venant a frapper contre le petit timbre luy fera rendre
un son qui pourra etre plus fort que celuy dela
partie AC dela corde qui en touchée, ce qui dependra
dela nature du timbre, et si le timbre en a lunison
avec la moitié de toute la corde AB, et que le son quil
rend résonne pas entierement celuy dela partie dela
corde qui en touchée, leur melange sera agreable a
loreille, quoy que celuy du timbre soit beaucoup plus
eclatant que celuy dela corde. ce sera lors que lon touchera la
partie de AC, dela corde avec un archet, ce qui fait
le meme effet que si on la touchoit avec un corps
sec et dur, et par reprises tres frequentes, le son que
le coup d'archet tirera dela corde etant egal
dans sa durée sera aussi dure de meme celuy du
timbre qui sera touché par la patenôtre. mais
s'il devient plus fort ou plus foible, celuy du
timbre recevra auth un peu daugmentation ou

de diminution mais non pas a proportion dela corde ; car le son que rend un timbre ente fra= pant nest pas augmenté ou affoibli a pro= portion du coup.

mainlenant si la corde en diuisée au point F par le doigt qui la touche en sorte que la partie FB soit double de AF, lors qu'on touchera la partie AF, elle fera des vibrations qui seront vne fois plus promptes que celles dela partie FB; car pourquoy les deux parties dela corde auront des tons qui seront a loctaue lún de láutre, mais le son dela grande partie sera fort foible a cause que ces vibra= tions ne sont causés que par lébranlement de celles de láutre partie AF, et de plus les vibrations dela partie FB, durerons bien moins que non duré celles dela partie CB, quoyquón ait touché la partie AF auec autant de force quon auroit fait auparauant la partie AC, : ce qui vient de ce que les vibrations dela partie AF nestre rencontrant auec celles dela partie FB, que de deux en deux, elles se detruisent promptement lúne láutre auant quelles ne soient communiquées par larchet.

Si les parties dela corde sont en dautres raisons leurs vibrations qui seront aussi dans les mesmes

raisons durerons plus ou moins de temps si elles se rencontrent plus ou moins frequemment mais si les divisions dela corde nont que des rapports eloignez, comme si elles etoient dans la raison de 23 a 37. qui sont des nombres premiers entre eux, leurs vibrations qui sont en raison reciproque de leurs longueurs ne se rencontrant que toutes les fois que la plus courte partie en auroit fait 37 et la plus longue 23. se detruiroient en fort peu de temps car chacune s'efforceroit de communiquer a l'autre un mouvement different de celuy quelle auroit. on auroit aussi ce que l'on pourroit remarquer facilement par le moyen du petit timbre, car on verroit quil cesseroit de sonner presque tout d'un coup; quoyque la partie superieure dela corde eut été touchée fortement d'un seul coup et non pas avec larchet.

on ne doit pas juger du rapport des vibrations par celuy des nombres qui expriment les parties dela corde, a moins que ce ne soit les plus petits qui expriment ce rapport ou cette raison; car quoyque l'une des parties dela corde fut 27 parties et l'autre 36. il ne s'ensuivroit pas que leurs vibrations ne se rencontrassent que toutes les fois que l'une en

auroit fait 3 et l'autre 12. puisque cette raison
etant la meme que celle de 4. a 4. et s'entr'unront
que les vibrations se rencontreroient toutes les fois que
la plus courte en auroit fait quatre et l'autre trois.

J'ay posé le timbre a l'unisson de la moitié de la
corde afin que dans les grands rapports des vibrations
de la corde, celles du timbre se trouvassent aussi, et qu'il
fit une consonance avec elles. par exemple si la
corde en diuisé en F, en sorte que la partie AF,
soit 1. et la partie FB soit 2. les vibrations des
deux parties de la corde etant entre elles en meme
raison de 2. a 1. et celles du timbre qui sont
comme celles de la partie AC, de la corde, a cause
qu'il en a l'unisson avec elle, ces trois differentes
vibrations seront entre elles dans leurs moindres termes
comme les nombres 2. 4. et 3. car, toute la
corde en diuisée en six parties AF en sera 2. FB
en sera 4., et AC en sera 3. dou il suit que les
vibrations des deux parties de la corde et celle
du timbre se rencontreront ensemble toutes les fois
que la partie AF en aura fait six, la partie
FB trois et le timbre quatre, car le nombre six
et le moindre ou il se peut trouver les raisons des
trois nombres 2, 4. 3, et la partie AF avec

FB, fera vne octaue, la partie AF auec le timbre fera vne quinte, et la partie FB, auec le timbre fera vne quarte qui sont toutes trois consonances du premier ordre.

Mais si la partie AF ou 1 et la partie FB 2. auec le timbre dont les vibrations sont mesurées par AC, qui sera 2. les trois vibrations le rencontreront encore toutes les fois que AF en aura fait six, — FB deux et le timbre trois, et lacord de la partie AF auec FB sera vne quinte du second ordre. celuy de AF auec le timbre sera vne octaue — et celuy de FB auec le timbre sera vne autre quinte, du premier ordre, qui sont aussi des consonances. on en trouuera plusieurs autres qui seront dautant plus parfaites que les nombres qui expriment les rapports — de leurs vibrations sont plus petits.

Il ne sera pas difficile maintenant de connoitre comment se fait le son de la trompette marine. on doit premierement remarquer que toutes les cordes a boyau qui sont tenduës sur la table des instrumens dont on joüe auec l'archet sont agitées par secousses tres promptes et qui s'accordent auec les vibrations dont elles sont capables suiuant leur longueur et leur tension. Car bien ne faisant quelquefois

ou augmenter ou diminuer la force de la vibration
en poussant la corde également ou plus ou moins loin
dans chaque vibration ; c'est la colophone dont le
bout de l'archet est frotté qui s'attache à la
corde et qui la pousse plus ou moins loin suivant
qu'il luy en plus ou moins attaché mais il ne saurait
faire que les vibrations soient plus ou moins fréquentes
ou il ne peut y apporter qu'un très petit changement
et qui ne laisse pas d'être apperceu par ceux qui ont
l'oreille bien fine en touchant la corde avec le
doigt et ensuite avec l'archet, l'impression que
fait l'archet sur la corde qu'il touche est à peu près
la même que celuy qu'il y feroit une scie dont les
dents se rencontreroient les unes après les autres.

La corde de la trompette marine est tendue
horizontalement sur la table, et elle y est soutenüe vers le
bas sur un chevalet à deux pieds dont il n'y en a
qu'un qui soit appuyé sur la table, l'autre ne faisant
que l'affleurer sans y porter ; mais aussitôt que la
corde a reçu du mouvement, elle le communique
au chevalet, dont le pied qui n'est pas posé sur la table
la frappe avec des vibrations égales en vitesse à
celles de la corde.

Si l'on vient donc à toucher la corde avec l'archet

elle fera vn son resonnant, lequel sera accompagné d'un autre son formé par les coups du pied du che= valet contre la table, et les coups etant isochrones ou degale durée aux vibrations de la corde, ils formeront ensemble le son eclatant de la trompette, la table qui fait aussi vn peu de resonnance entretient le mouvement de la corde et du chevalet.

Ce que j'ay dit d'abord du timbre appliqué contre la corde n'a été que pour faire entendre comment elle pouvoit causer vn son beaucoup plus fort que celuy qu'elle pouvoit causer auec par ses propres vi= brations : mais il y a vne difference tres Grande entre le son du timbre et celuy qui est formé par les battemens du pied du chevalet contre la table, car celuy du timbre sera toujours le meme a tres peu prés puis qu'il depend entierement des vibra= tions de la corde qui seront determinés par sa figure, et celuy que fait le pied du chevalet depend entierement des vibrations de la corde qui seront differentes suivant les differents longueurs depuis le chevalet ou elle pose jusqua l'endroit ou elle est touchée ou diuisé avec le doigt.

Il y a encore vne difference tres considerable entre le son du timbre et celuy du pied du chevalet

car celuy cy ne fait qu'un retentissement sur aigre qui en pourtant a l'unison de la corde a peu pris — l'alve fera presque toujours un accord avec les tons des deux parties de la corde.

je passe maintenant a expliquer pourquoy la corde de la trompette marine ne fait pas des tons differens, quoy que on la touche un peu au dessus ou au dessous de la division qui convient au ton.

il faut d'abord toucher avec lacher la corde ou a vuide, et on pose ensuitte le doigt au milieu et que on la touche vers le haut du manche, le branlement de cette partie de la corde se communiquant a celle d'embas il la mettra en mouvement, comme j'ay expliqué cy dessus et ce mouvement etant suivi des coups du pied du chevalet contre la table, ils feront ensemble des vibrations qui seront chacune double de celles que la corde faisoit dans touchée a vuide; cependant quoy la corde rendra un son d'un octave plus haut qu'elle ne faisoit auparavant.

mais si on pose le doigt contre la corde un peu plus haut ou un peu plus bas que le milieu on entendra toujours le meme ton quoyque les vibrations de la partie d'en haut de la corde ne conviennent plus exactement avec celles de la partie d'en bas, et que la partie d'en haut qui est agitée fortement

par larchet, en donnant le mouuement a la partie
d'embas, elle en aussi elle meme agitée, acaus de la
vitesse de la corde qui en fortement Ebranlée; Con=
pourquoy ces deux mouuemens differens se modifians=
lun lautre, il sen formera necessairement un moyen
entre les deux, qui fera que les vibrations conuiendront
le plutôt quil sera possible. ainsi dans ce cas si=
lon divisoit oula corde en touchée ~~egalement~~ ~~en deux~~
~~parties egales en fortement~~ touchée en plus proche
de la divisions degalité que ce celle de 1 a 1. elle
donnera toujours le meme ton quelle donnoit quand
elle etoit divisée egalement, et surtout si elle en fortement
touchée avec larchet, car autrement elle rendroit un son
tres desagreable a cause que ses vibrations ne saccorde=
roient pas toujours de meme ny dans des intervalles
qui fussent proches entre eux ou avec les precedens=
Ebranlement netant pas assez fort pour la determiner.

De meme si lon divisoit oula corde en touchée en
plus proche de la divisions de 1 a 1. que de celle de
legalité, les sons des deux parties de la corde
saccorderoient entre eux a loctave, et par consequent
le son quelle rendra sera agreable a loreille. il=
en sera de meme des autres divisions.

on doit pourtant remarquer quentre les points
qui divisent la corde dans la raison degalité, et dans=

elle de 1 a 2. il y en a vn qui la diuise dans la raison de a. a 3. ou bien peut trouuer vn moyen ton qui s'accorde auec celuy de dessous a la tierce majeure, et auec celuy de dessus a la tierce mineure, mais il en difficile de toucher la corde de maniere quelle puisse donner ce ton.

On peut comparer ces sortes de vibrations qui se communiquent en se contraignant l'une l'autre a celles d'une pendule dont le fil qui le soutient rencontreroit toujours d'un coté vn arrest immobile qui renuoyeroit le pendule auant qu'il eut acheué sa vibration toute entiere, ainsi vn pendule qui feroit ses vibrations vn peu plus longues que d'une seconde pourroit etre retardé par ce moyen et reduit a vne seconde; l'on l'arrest pourroit etre placé de telle maniere que le pendule en etant suspendu, et son fil etant plus court de la distance qu'il y auroit entre la premiere suspension et celle de l'arrest; ces deux vibrations meslées en composeroient vne d'une seconde exactement. je suppose que le mouuement du pendule fut toujours entretenu par quelque puissance.

La Raison que je viens d'apporter de ces vibrations composés, peut etre confirmée par ce

qui arriua a monr. huygens de Zulichem dans
les premieres années quil appliqua le pendule aux
horloges; il attacha contre la poutre dune chambre
deux horloges a pendule qui etoient a peu prés
egalement reglés, mais on sait que quelque pre=
caution quón y puisse apporter elles ne peuuent
saccorder a faire leurs vibrations ensemble pendant
plusieurs jours. cependant monr. huygens remarqua
que ces deux horloges qui dabort nétoient pas
daccord, le deuinrent bien que les vibrations de
leurs pendules nauoient aucune difference. il me
semble aussi quil mà dit quil sassûra de cette
experience, en ayant desaccordé le mouuement
des pendules peu de tems apres ils le remirent
ensemble. il reconnut dabort la cause de cet effet,
et il ne douta point que cette egalité ne vint de
lébranlement que chaque pendule donnoit ala
poutre, qui saccordoit enfin dans un mouuement
moyen entre les deux, lequel elle communiquoit
aux pendules, et ainsi les trois mouuemens des deux
pendules et dela poutre nén faisoient quún qui
etoit moyen entre tous.

Jay fait une semblable experience mais qui en
bien plus sensible pour mássurer dela verité de ce fait.
jay pris une pendule simple dela longueur quil faut

pour faire des vibrations egales aux Secondes de temps
comme je lay verifié par la horloge. le pendule, et
etoit fait dún plomb de cinq ou six onces suspendu a
un fil qui netoit point tortille, jó lay ensuitte attaché
a lextremité dune regle de bois fort mince, laquelle
faisoit un grand ressort et ayant attaché la regle bien
ferme par lextremité dou le pendule netoit pas
suspendu, jé lay arrangé de telle maniere que le
fil du pendule qui etoit en repos faisoit un angle
droit avec la courbe dela regle ployante dans
lendroit oule fil etoit attaché le pendule ayant
ete mis en mouvement et ses vibrations se faisant
sentir suivant la longeur de la regle, je nay pû
remarquer pendant plusieurs minutes aucune difference
sensible entre les vibrations de ce pendule composé
~~etoient beaucoup plus lentes~~ et celuy de lhorloge
qui battoit les Secondes, auquel je le comparois. mais
la regle ayant été beaucoup inclinée endroit que
le fil faisoit un angle obtus avec la courbe de
la regle a lendroit ou il doit attaché je me suis
aussitot apperçu que les vibrations de ce pendule
composé etoient beaucoup plus lentes que celles du
pendule de lhorloge. ensuite la regle etant dans une
position contraire a celle ci et son extremité faisant
un angle aigu avec le fil du pendule a lendroit ou

il etoit attaché. j'ay encore remarqué que dans cette
situation, les vibrations du pendule duroient beau=
coup plus d'une seconde.

Il semble roit d'abord qu'il devoit arriver le
contraire dans cette experience, car les vibrations de la
regle qui n'etoient que d'un quart de seconde devoient
plutot accelerer celles du pendule que de le retarder
ce qui doit aussi arriver comme a tous les pendules
composés, mais aussi on doit prendre garde que
ce pendule ne devoit plus etre considéré
de 36 pouces 8e lignes seulement comme
sont les pendules simples qui battent les secondes
de temps, puisque la regle qui luy etoit
jointe en augmentoit la longueur en quelque
façon: les vibrations de ce pendule composé
auroient donc été plus grandes que d'une seconde,
et plus grandes aussi que je ne les observois
si les vibrations de la regle ne les faisoient
retardées.

J'ay fait encore plusieurs remarques sur le
mouvement de ces pendules composés par exemple
pourquoy la regle qui par la vertu de son ressort a
battu huit ou un peu moins que des quarts de seconde
faisoient les vibrations d'une demi seconde tres juste.

lors que la partie de la regle ou doit attaché le fil
du pendule luy doit perpendiculaire, et pourquoy
hors de cette situation les vibrations doivent plus
longues et deuenoient moins sensibles a proportion que
langle de la regle et du fil deuenoient plus
obtus. il ne seroit pas difficile de donner de
veritables raisons de ces effets mais jay creû quelles
secartoient trop du sujet que je traite icy pour
les y inserer.

les vibrations qui se font dans chaque
partie de la corde de la trompette marine, ou
lorsquelle nest pas diuisée exactement dans des
parties qui soient entre elles dans des raisons simples
comme de 1 a 2. et de 2. a 3. &c. elles donc
composées de deux vibrations dont lune est vn
peu plus longue et lautre plus courte que celles
qui se feroient dans la juste diuision, les reduisent
enfin, et lon ne peut remarquer de difference
sensible dans le ton de la corde, quoyquelle soit
touchée un peu plus haut ou vn peu plus bas. il
narriue pas la meme chose au violon dont il nya
que la partie quon touche auec larchet, et qui
est comprise entre le doigt et le chevalet, qui
fasse des vibrations sensibles: car la corde est
arrêté fortement sur le manche par le doigt qui

la prisse; ce qui en ses difference dela maniere
dont on touche celle dela trompette marine. mais
quoy que la corde dela trompette marine rende
un son net, et qui ná rien de désagreable a loreille
lorsquelle on touché dans des poincts qui la diuisent
en des raisons simples, ce nest pas adire que les sons
composez de ces deux parties puissent faire des passages
tels quon voudra de lún a lautre comme on le peut
faire sur la corde du violon, et cest ce qui me
reste encore a examiner.

puisque jay demontré cy deuant quil nya
que de certaines diuisions dela corde qui puissent
entirer un son net et agreable a loreille et que
ces diuisions sont celles qui forment les consonances,
entre les deux parties dela corde qui forment ensemble,
il sensuit necessairement quon ne
pourra faire dautres passages sur la
corde dela trompette Marine que
ceux qui sont determinez par les consonances
de huitte dela premiere seconde et
troisieme octaue, et les passages determinez
sont appellez faux.

Si la corde

Si la corde AB dela Wompitte
marine, en divisé en deux egalement
en C, ses parties etant entre elles comme
1 a 1. elles sonneront lunisson. ainsi-
lorsque la corde AB. sera touché a
vuide avec larchet, et quensuitte on
nose le doigt en C, le passage qui
se fera dún ton a lautre sera dúne
octave, car les vibrations qui forme-
ront les sons dela corde seront entre
eux dans la raison reciproque dela
ligne AB ala ligne AC, qui est 2. a 1.

Mais si la corde AB en divisés
en 11. parties et que AD en soit 5. et
BD 6. le doigt etant posé en D lors-
quón touchera avec larchet la partie
AD dela corde, le son de ladite partie
BD, saccordera avec celuy de AD ala
tierce mineure qui est la premiere
consonance quon peut trouver dans les divisions
dela corde en montant de C vers A. mais le
passage dun ton dela corde touché en C, et
ensuitte touché en D sera exprimé par les nombres

11 a 10. qui donnent le rapport des vibrations —
des deux parties de la corde AC; AD.

La Consonance qui suit en la terce majeure
qui diuise la corde en E, en sorte que AE en 4. et
BE en 5. mais AC, sera a AE comme 9 a 8. qui —
en le rapport des longueurs dúne meme corde pour
faire un ton majeur, ainsi lon quen touchera la
corde en C, et quén suitte on la touchera en E,
le passage des deux tons quelle donnera sera
dún ton majeur.

La quatrieme diuision de la corde en celle de
la quarte en F, car AF sera a FB, comme 9. a 4.
et la corde touché en C, et ensuite en F, fera
un passage exprimé par les nombres 4. a 6. et le
passage du ton de la corde touché en E et ensuite
en F sera exprimé par les nombres 24. et 24.

Mais si la diuision de la corde en de 5 parties
et que AG en soit 2. et BG 3, qui feront ensemble
une quinte, on aura le rapport de la partie AC,
a AG, comme 5. a 4. qui est le rapport de la
terce majeure, et AE sera a AG, comme 10 a 9.
qui est le rapport dun ton mineur.

La sixieme diuision est au point H en —
sorte que AH en 5 parties des 12 de toute la
corde AB, les deux parties de la corde from—

donc entr'elles comme 4. a 5. ce qui donne la
sixieme mineure et la partie AC, sera a AH-
comme 15 a 10. et ~~AH~~ AG a AH comme
a 5. a a 6.

La septieme division est au point 1. en
sorte que A1 est 3 parties des 8. de toute la corde
AB; le rapport des deux parties de la corde
sera donc comme 5. a 3. qui est celuy de la
sixieme majeure; et AC, sera a A1. comme 8 a
6. ou 4 a 3. ce qui est une quarte. ainsi le
juste de la corde touché avec le doigt en C,
et ensuitte en 1 sera dune quarte qui est
composé dun ton majeur et dún ton mineur
et dun demiton majeur, par le rapport de AC
a A1. qui est comme 16. a 15 pour le passage
de la corde touché en a et ensuitte en 1.

La huitieme division est celle qui divise toute
la corde dans la raison de 1 a 2. au point K-
toute la corde etant de 8 parties et AK de 1. —
est pourquoy les deux parties de la corde seront a
l'octave et le passage de AC, a AK sera exprimé
par les rapports de 3. a 2. qui est une quinte et
celuy de A1. a AK comme 9. a 8. qui est un ton
majeur.

Voila tous les passages quon peut trouver

sur la corde de la trompette marine depuis
l'unisson ou bien legalité de ses parties jusqua la
premiere octave.

Si l'on passe maintenant aux divisions de la
corde qui donnent les consonances du second
ordre ou de la seconde octave qui divise la
corde AB dans la raison de 6. a 11. au point L. /
toute la corde etant de 17 parties et AL de
6/. il s'ensuit que AC, sera a AL comme
17. a 10. et AK a AL comme 17 a 6/.

La division qui suit qui est la dixieme a
depuis legalité est au point M on sorte que AM
est de 12. parties des 17. de toute la corde et par
consequent AM est a MB comme 12. a 6/ qui est
le rapport de la tierce majeure du second ordre
mais AC, est a AM comme 17. a 17. et AK a AM
comme 17. a 6.

On trouve ensuite la division N enthetique
AN est a NB comme 9. a 8. qui est la quarte
du second ordre et par consequent AC. est a
AN comme 11 a 6. et AK a AN comme
11. a 9.

Enfin la division O qui est la douzeme
et qui donne le rapport des parties AO, OB de la
corde AB dans la raison de 1 a 3. qui est la quinte

du second ordre, ou de la seconde octave donnera aussi celle de A C, a A O, comme n. a 1. qui est octave, en sorte que le doigt touchant la corde en C, et ensuite en O le passage sera dune octave ; mais s'il la touche en K et ensuite en O, le passage sera dune quarte qui est exprimée par le rapport de A K a A O comme 4. a 3. qui est aussi composé dun ton majeur, dun ton mineur, et dun semiton majeur ; mais il ny a aucun de ces sons qui conuienne aux trois diuisions L, M, N, quoi a trouués entre K et C,

Si lon examine les deux autres diuisions qui restent jusqua la double octave donc la premiere en P qui diuise toute la corde dans la raison de 6. a 16. qui est la sixieme mineure du second ordre, on aura le passage de A C, a A P mesuré par les vibrations qui seront entre elles comme les lignes A C, et A P en a dire comme 11 a 10 mais celuy de A O a A P comme 11. a 10.

La diuision suiuante est celle qui diuise toute la corde comme 6. a 10, qui est la sixieme majeure du second ordre et le rapport de A C, a A Q est comme 15 a 6. et celuy de A O a A Q comme 15 a 12.

mais si la diuision en un point R est telle que la raison de AR a BR soit comme 1 a 24. qui est la double octaue, le passage de AC, a AR sera comme 5. a 4. qui est la tierce majeure du second ordre, et celuy de AO a AR sera comme 5 a 24. qui est la tierce majeure du premier ordre.

Enfin si lon passe plus loin et quon diuise la corde en S dans la raison de 24 a 5. qui est la tierce mineure du troisieme ordre on trouuera que le passage de AC a AS, qui est comme les — grandeurs de ces lignes sera exprimé par le rapport de 19 a 20 et celuy de AO, a AS par le rapport de 19 a 20.

La diuision qui suit en T. fait les parties — de la corde dans la raison de 6. a 5 qui est la tierce majeure du troisieme ordre. et donnera le passage de AC a AT comme 3. a 1. qui est la quinte du second ordre et celuy de AO a AT comme 3. a 2. qui est la quinte du premier ordre.

On remarquera donc quon ne peut faire de passage agreable depuis la corde touchée en O jusques en T que celuy qui est en R mais il sera difficile de diuiser en R la quinte entre O et T a cause — des rapports eloignez des parties de la corde dans cette diuision.

on poursuivra la veste des diuisions de la meme
maniere, et lon trouuera tous les passages ou sauts
quon peut faire sur la corde de la trompette marine.

Mais quoyque tous ces passages se puissent faire
sur cette corde comme je le viens de faire voir, cenest
pas adire quils sy fassent effectiuement, et cest ce qui
est de plus difficile a expliquer. pour en pouuoir
decouurir la veritable cause, il faut bien examiner
tout ce qui doit arriuer aux ebranlemens des parties
de la corde qui font les differens accidens des sons -
jay deja dit quil se doit faire vn ebranlement moyen
entre celuy de la partie den haut de la corde qui
en touchée aupres larchet, et celuy de la partie -
dembas, lors que celuy denhaut: mais si la corde -
nen touchée que foiblement aupres larchet, la
partie dembas fera les vibrations si foibles quelles
ne pourront rien communiquer a celles denhaut
qui limportera toujours quoy quelle soit touchée
foiblement. Mais pour quoy faut il vouloir faire former
fortement la corde en la touchant par exemple en E.
entre les diuisions C et K qui font lunis son et loctaue
des parties de la corde, la partie denhaut AE fera
5 vibrations contre 4. de celle dembas BE et les
vibrations de ces deux parties ne se rencontreront
quapres ces intervalles: mais les rapports etant
trop eloignez pour les parties de la corde qui -

sont presque également obtenus, celles d'en haut
étant retardés par celles d'embas et celles d'embas
étant accelerées par celles d'en haut — il lendroit faire
un compost moyen qui sera celuy de legalité
qui on en le plus proche. Cepourquoy le ton de la
corde sera toujours a peu pris le meme quil doit
lorsque le doigt la touchoit en C. je ne dis quá peu
pris a cause que les vibrations composés des deux —
veritables de G et de 1. qui font la tierce majeure
dependent entierement de la maniere dont la corde
est touchée ; car il se pourroit faire
que l'unisson et la tierce majeure se meslassent l'un
apres l'autre et par reprises frequentes ; ce qui ne donnant
qu'une passage d'un ton feroit un compost desagreable
a l'oreille, ce ne sera pas la meme chose pour les —
passages des autres octaves ; celles parties d'en haut de la
corde sont petites a legard de celles d'embas, car les —
frequentes vibrations de la petite partie ne pouvant
imprimer que peu de mouvement a celle d'embas —
a celle d'embas ne faisant plus alors qu'un foible
bourdonnement soutenu par les battements
de pieds de cheualet contre la table
les passages se font presque de la meme
maniere que par le violon.

A noyque je n'aye parlé jusques icy que des
sons des deux parties de la corde qui en divisé par le
doigt qui la touche, on ne doit pas pourtant negliger
tout a fait celuy qu'elle rend, en se levant au dessus du
doigt, bien qu'il soit presqu'entierement detruit par les
deux autres qui sont vers sons; car le mouvement
de la partie de chaque de la corde ne pouvant se
communiquer a elle d'embas, que par celuy de
toute la corde quand elle retombe. Comme le doigt
comme j'ay dit dabas; la vibration de la corde
entiere doit faire vn son particulier, il faut donc
donc que la corde entiere et ses deux parties
fassent un accord pour faire que le son qu'elle rend
soit agreable, et cet accord que l'on pourroit observer
par le nombre dont j'ay parlé fait voir a la raison
de toute la corde.

Il s'ensuit donc de la que lorsque la corde
sera divisée dans la raison de 1 a 2. ou de 2. a 3.
toute la corde fera des consonances avec
chacune de ses parties et alors elle doit rendre vn
son qui soit agreable mais il ne sera pas la
meme chose si elle est divisé dans la raison de
3. a 4., car la corde entiere ne peut faire aucune
consonance avec ses parties, mais aussi comme
cette division ne differe de celle de la quinte

qui en de 2. a 3. que dune trente cinquieme de
toute la corde, il arrive comme j'ay deja remarqué
que les trois longueurs dela corde qui font leur vibra=
tions particulieres s'efforcent de convenir le plus qui=
leur en possible, se mettent a l'accord dela quinte au
lieu dela quarte, et lorsque la corde ne don=
nera que le meme son quoyqu'elle soit diuisé dans
la raison de 2 a 3. ou de 3 a 4. mais ce son
doit etre plus agreable dans la juste diuision
de 2. a 3. que dans celle de 3 a 4. ou de quelque
autre qui on sera proche pour les raisons que
j'en ay donnés, ce sera la meme chose pour les
autres diuisions.

J'ay toujours comparé cy deuant le passage
du ton dela moitié AC, dela corde auec celuy
de chaque diuision, et en a qui peut seruir a
faire connoitre le rapport des vibrations dela corde
entiere auec celles de ses parties. Car si la moitié
dela corde AC n'a pas un rapport de consonance
auec une des parties dela corde, toute la corde
entiere n'en aura pas non plus puisque celuy de
la moitié auec cette partie sera seulement dans
l'octave au dessus, ou dun ordre plus eleué que
celuy dela corde entiere auec la meme partie.

Voila ce que j'e mesvois proposé d'expliquer sur les sons de la corde de la trompette marine, en suivant le système des vibrations, ce qui peut aussi convenir aux autres corps resonans et aux instrumens à vent. mais ayant eu occasion de faire quelques nouvelles observations sur les sons, j'ay trouvé à propos de les joindre à celles cy avec les remarques que j'y ay faites qui pourront servir à ce qui me semble à donner quelques connoissances que l'on n'a pas encore sur le son que rendent les corps à ressort.

Dans quelques conferences particulieres que j'aye eües avec monsr. Sable Galloys, au sujet des differences des sons de la trompette marine il m'a communiqué une observation qu'il avoit faite sur le son, laquelle m'a semblé fort curieuse, ce qui m'a donné lieu d'en faire plusieurs autres de la meme nature, et de rechercher la cause des particularités que j'y ay remarquées.

Il m'a dit qu'ayant pris des pincettes à ressort comme sont celles dont on se sert ordinairement pour le feu, et qu'les ayant soutenües en l'air en mettant le doigt sous la courbure d'enhaut que j'appelle l'arreau il avoit trouvé qu'elle rendoit un son fort clair et fort

not, quand on frappoit sur lune des branches avec quelques corps dur comme un morceau de fer. mais quayant mis la branche ou tige dune clef dans lanneau ala place du doit pour les soutenir, elles ne rendoient plus quun son sourd quand on les frappoit comme auparavant.

Cette observation ma paru fort considerable car on a persuadé que les corps mous doivent bien plus diminuer le son dun corps resonant quand il le touche quun corps tres dur comme le fer.

j'ay donc fait les experiences suivantes pour tacher de decouvrir la cause de cet effet.

j'ay d'abord suspendu les pincettes en passant dans l'anneau une petite corde a boyau, et j'ay remarqué quen frappant ensuite contre les branches avec un petit morceau de fer, elles rendoient un son fort clair et fort resonnant.

j'les ay suspendues ensuite avec une ficelle ordinaire et le son m'a paru a peu prés le meme mais ayant mis dans une corde y ayant mis une grosse lizieres de drap plié en deux et un peu etendue en sorte quelle ne le joignoit pas sur dessus de lanneau je n'ay trouvé le son que fort peu diminué et seulement autant que lorsque j'les soutenois avec le doigt ou a tres peu prés.

lorsque je les ay soutenüs avec un petit baton qui avoit passé dans l'anneau le son étoit fort clair. mais il n'étoit pas si resonnant que quand elles étoient suspendue avec la corde a boyau. quand au lieu d'un petit baton j'y ay mis un morceau de bois quarré d'un pouce de largeur qui touchoit l'anneau en deux endroits le son en devenu beaucoup plus, — qu'auparavant.

je les ay ensuite soutenüs sur un fil d'acier fort delié mais qui étoit assez fort pour les ~~soutenir~~ porter étant appuyé d'un coté et d'autre a un doigt pres de l'anneau et j'ay remarqué que le son étoit le meme que lorsqu'elles étoient soutenües avec la corde a boyau, j'ay remarqué aussi la meme chose quand j'y mettois un fil de laiton, mais ayant fait la meme ~~chose~~ experience avec des fils de fer plus — gros, j'ay remarqué qu'elles perdoient de leur son, et enfin qu'elles ne sonnoient ~~plus~~ presque plus quand — le fer étoit de 6 lignes de diametre, il n'étoit — net et pas poli, mais quand il étoit bien rond et bien poli, le son étoit un peu clair.

les tuyaux de verre font aussi le meme effet que les verges de fer, il me semble pourtant qu'ils rendent ~~leur~~ moins du son que le fer, et je

crois que c'est a cause qu'ils sont plus polis.

J'ai les ay encore soutenüs sur la pointe dune aiguille qui etoit bien arrêtée dans un corps solide et j'ay remarqué que le son netoit pas si clair ni si net, que lorsqu'elles etoient soutenüs par la corde a boyau; elles en perdent beaucoup sur la pointe dun couteau qui en coupe, mais elles n'en perdent pas tant sur celle d'un couteau qui est fort mince, et qui fait un grand ressort, c'est a peu pris la meme chose sur le tranchant de ces couteaux, mais elles y perdent plus de leur son que lorsqu'elles sont soutenüs sur la pointe. quand on les soutient sur le plat d'un couteau mince qui touche l'anneau des deux cotez, elles presque tout leur son avec un fremissement fort sensible.

Lorsque j'ay attaché un morceau de plomb a l'entremité de l'une des branches, elles ont rendu un son fort sourd et fremissant, mais il a été encore plus sourd quand j'en ay attaché aux deux extremitez

Le son en encore fort sourd quand on serre l'une des extremitez des branches entre les doigt, ou quand elle en appuyé en partie sur quelque corps mou comme une etoffe de laine, mais il l'est beaucoup plus si on l'appuyé par les deux bouts. mais bien

au lieu dune etoffe de laine ou les pose sur un morceau de fer, elles nont presque aucun son. on sest que generalement les corps durs comme le fer ou la pierre leur otent beaucoup plus de son que les corps mous.

Le meme arrive a une longue verge de fer qui en soutenue en equilibre dans son milieu, ou par un crochet ou boucle qui sera a lune de ses extremités, ou par un fil dou elle sera pendue; mais si on la tient ferme entre les doigts par le bout dorhaut, elle perd beaucoup de son son.

il faut aussi remarquer quen quelque endroit quón frappe contre les pincettes, soit contre les branches ou contre lanneau, elles donnent toujours le meme ton et a tres peu pres le meme son.

jay fait encore plusieurs autres experiences dont je ne parle pas icy, parcequelles peuvent se raporter aux precedentes. jajouteray seulement que lors quón suspend les pincettes de quelque maniere que ce soit par le dedans de lanneau. si lon pose au dessus un corps mol comme un petit morceau detoffe de laine, elles rendront un son bien plus clair que lors quón y met un morceau de metal. car donc

par cette raison quon devroit toujours mettre vn petit morceau detoffe de laine au dessus et au dessous du milieu du timbre dune horloge entre son pied ou son pivot, et le collet de la vis qui la tient avretée par dessus.

POUR rendre raison de ces experiences j'examine d'abord comment se fait le son des corps resonans et je trouve que les vibrations ne sont point la cause puisque les corps peuvent faire des vibrations fort considerables sans rendre aucun son. Comme lors quayant serré entre les doigts les deux branches des pincettes — quon soutient par lanneau on les laisse aller tout dun coup, car elles font de tres grandes vibrations sans aucun son. j'ay aussi remarqué que dans les experiences que j'ay rapportés cy devant les vibrations etoient presque toujours les mesmes quoyque le son fut fort different. on peut aussi remarquer la meme chose a vn timbre fort mince ou a vn verre a boire fait en cone ou en cloche.

Toutes les experiences mont donné lieu de conjecturer que dans les corps a reson la veritable cause du son est vn mouvement que j'appelle d'ondulation, de leurs parties et que les vibrations du corps ne peuvent former que par accident

un son tres foible, et enfin quon peut avoir
les ondulations sans avoir sensiblement les vibrations.

j'entens par le mot d'ondulation, le mouvement
qui se fait dans un corps a ressort, et qui en semblable
a celuy de l'eau quand elle en agitée de quelque
maniere que ce soit, comme quand on y jette une
pierre; car les parties s'élevent et s'abaissent successi-
vement et ce mouvement se continue dans
toute l'etendüe de l'eau.

je dis donc que si l'on frappe un corps qui
soit capable de ressort avec un autre corps dur, celuy
qui en frappé s'enfonce un peu a l'endroit ou il en
touché, mais que par la vertu de son ressort les parties
qui se sont enfoncées se relevent ainsi et vont au dela
de leur etat naturel, et voulant ensuite se retablir dans
leur premier etat, elles passent encore au dela, et
font ainsi plusieurs mouvemens qu'on peut considerer
comme de petites vibrations tres frequentes, qui
se font dans la partie qui en frappée et qui
sont fort differentes des grandes vibrations qu'on
remarque facilement dans tout le corps. mais
chaque elevation et abaissement de la partie
frappée se communique en s'etendant dans tout
le corps comme on le remarque dans l'eau, et

cet ce que j'appelle les ondulations des corps a ressort.

monsieur perrault dans son traité du bruit considere quatre mouvements differens que font les corps resonans comme les timbres ou cloches quand ils sont frappez.

le premier est le froissement des particules frappées par le marteau.

le second, l'ébranlement que ce coup donne a tout le timbre, et d'ou s'ensuit, l'ébranlement de ses portions ou parties, ce qui luy arrive a cause de sa forme, et il donne le nom de mouvement ovalaire a cet ebranlement de tout le corps, car le timbre etant frappé de rond devient ovale dans un sens et ensuitte ovale dans un autre tout opposé, ce qui se continüe comme les pendules par plusieurs vibrations reciproques.

le troisieme est celuy d'ondoyement des parties a cause du mouvement ovalaire, et qui forment des ondes qui le font entendre : mais quelques petites que soient ces ondes elles sont trop lentes pour faire du bruit.

le quatrieme est celuy du froissement des particules par la reflexion des parties ondoyantes et qui fait le bruit.

Mons.r Parrault distingue les ondes d'avec le froissement qui fait le bruit, cependant dans son système le bruit ou le son n'est qu'une suite des ondes, et il doit toujours les accompagner, et ces ondes sont formées par le mouvement ondulaire, qui est le même que celuy des vibrations du corps. pour moy je crois que les ondes comme je les prens icy premierement n'ont pas de rapport avec les vibrations, ou avec le mouvement ondulaire, comme on peut le connoitre parce que je vais d'expliquer.

Si l'on suppose donc que le son des corps resonnans n'est formé que par les ondulations des parties du corps comme je le prens icy, il ne sera pas difficile de rendre raison de toutes les experiences precedentes. car il faut que les ondulations de l'air soient formées par celles des parties des corps qui en frappé pour ebranler de la même maniere la peau du tambour de l'oreille par cette supposition il est evident que les corps mous comme le drap de laine qui soutiennent l'archet des pincettes, ne sauroit apporter que tres peu d'empechement aux ondulations, a cause qu'elles posent seulement sur des poils qui sont si delicats

qu'ils peuvent eux memes recevoir un mouvement
semblable a celuy des parties du corps qu'ils soutiennent.
ce sera a peu prés la meme chose si le corps qui —
soutient est duy ; mais qu'il puisse recevoir aisement un
mouvement comme si en une corde a boyau ou
le tranchant d'un couteau fort mince, car ils cedent
au mouvement d'ondulation du corps frappé sans
l'arreter, et on apperçoit tres distinctement ce mouvement
ou a la vüe ou au toucher par un frémissement
qui se fait dans la corde ou dans le couteau,
et dans quelques positions du couteau, on entend —
les battemens du mouvement d'ondulation dans le
corps resonnant contre le couteau, lesquels sont
tres differens des vibrations de tout le corps: mais —
alors les ondulations cessent presque tout d'un coup
et le corps ne sonne point ou tres peu.

Au contraire les corps roides et durs et surtout
aux quels touchent en beaucoup de parties arrestent
les ondulations du corps resonnant a l'endroit ou ils —
le touchent, car le mouvement ne peut pas se
communiquer aux corps qui soutiennent, et ils n'ont
pas assez de force pour elever a chaque ondulation
tout le corps resonnant au dessus de celuy qui
le soutient.

Les ondulations du corps resonnant ne se terminent pas a lextremité du corps quand elles y sont arrivées, car lorsque le son cesse presque tout dun coup, quoyquelles fussent entretenües et comme renouvellées, mais foiblement, comme j'ay dit cy devant, par celles qui se forment alendroit du corps qui a été frappé, mais elles reviennent, comme en se reflechissant, et retournent plusieurs fois au long du corps, sans le detruire, a peu prés comme il arrive a l'eau. Et pour cette raison que le corps resonnant donne toujours le meme ton en quelque endroit quon le touche; car les ondulations seront toujours les memes dans le meme corps si les parties sont homogenes; et il ny aura que la force du son qui sera augmentée ou diminué a proportion que lendroit quon touche pourra revenir plus ou moins dimpression. Cest aussi pour cette raison que les morceaux de plomb que javois attachée aux extremités des branches des pincettes amortissoient entierement le son; car les ondulations ne pouvant pas se communiquer a ce corps elles se perdroient et ne pouvoient point se reflechir. mais si le corps mou comme le plomb ou le doigt qui touchoient les bouts des pincettes en amortissoient le son, il

semble que lorsquelles etoient posées sur quelques
corps dur, comme sur un morceau de bois, elles ne
devoient rien perdre de leur son, cependant on
remarque le contraire dans lexperience. en voicy
ce qui doit arriver, car le mouvement d'ondulation
qui se fait a lextremité de la branche en contrainte
et retenu par le corps dur, contre lequel elle pose
en luy faisant faire quelques frottemens sur ce
corps qui luy resiste par ses inegalitez et ces frottemens
arretant les retours d'ondulations, le corps ne peut
rendre que fort peu de son.

il n'est pas possible de frapper un corps dur et
capable de ressort avec un autre corps dur, sans
luy imprimer deux mouvemens qui sont fort differens
l'un en celuy qui fait changer de place a tout le
du corps quon touche en le poussant et qui on
fort sensible quand ce corps est suspendu par un
fil, et en celuy qui luy fait faire des vibrations:
l'autre est celuy qui s'imprime dans la substance
du corps meme par le ressort des parties qui sont
touchées, et que j'appelle mouvement d'ondulation.
mais il y en a encore un autre qui n'est quune
espece du premier et qui luy fait faire des vibrations

par le moyen de, ón ressort. comme lors quon
frappe lune des branches des pincettes, on la pousse
vers le coté opposé, et lón bande necessairement le
ressort de lanneau qui tenant aussitot a le debander
fait les deux branches dun coté et dautre mais comme
il passe au dela de son etat naturel, il fait pluisieurs
vibrations et en fait faire autti aux branches des
pincettes: ces vibrations ne peuvent former aucun bon
dans ce systeme, comme je lay remarqué cy devant
si on les considere toutes seules, neammoins il y en a
toujours vn quon peut remarquer fort facilement
si en soutenant les pincettes par lanneau avec le petit
doigt on appuye le pouce contre le trou de loreille,
car quoy quón ne fasse que serrer les branches des
pincettes entre les deux doigts de lautre main, et les
lascher ensuite, on ne laissera pas dentendre un son
assez fort et qui durera long temps.

Il suit de quelle maniere se fait le son dans
le systeme de londulation des parties du corps, lors que
le ressort de lanneau se bande en se ployant, les
parties de dessus s'etendent, et celles de dedans rentrent
en dedans a peu prés de meme que si on les frappoit
en cet endroit la en sorte quil se doit former vne ondulation

dans toute letendüe du corps, sans empecher la
vibration - si le fait pas la force du ressort mais
a cause que les vibrations durent fort long temps, les
ondulations doivent aussi continuer de meme etant fortifiez
et comme renouvellies a chaque vibrations quand le
ressort se plie et setend et cest ce qui fait que le son
[illegible] par ce moyen dure autant de temps que
[illegible]rations, il me semble aussi que dans cette experience
on peut en quelque façon distinguer les ondulations,
qui forment le son davec les vibrations du corps -
qui le font sentir.

Il nest pas difficile de concevoir comment ces -
ondulations peuvent se faire dans les corps durs comme
le fer, largent, le laiton, le cuivre &c. mais il semble
que ce ne doit pas etre la meme chose dans les -
cordes a boyau tenduës sur la table des instruments.
cependant si lon considere ce qui arrive a ces -
cordes en les pinçant, comme on dit avec le doigt
on trouvera quil y peut faire des ondulations comme
dans les autres corps dont jay parlé cy devant. premie-
rement il ny a pas de doute que les cordes davier, de
laiton, et dautres metaux ne doivent faire des ondulations
quand on les pince: car en les tirant avec le bout des
doigts ou avec une plume on leur fait un plis a lendroit

ou on les touche, demeure la tannean des pinettes en ferrant les deux branches lune contre l'autre, et ce son sera d'autant plus net et plus son que ce pli sera plus sensible, comme quand il sera fait par le bec d'une plume qui touche la corde. il se formera donc une ondulation dans tout le corps de la corde outre la vibration, comme je l'ay expliqué cy deuant. pour ce qui est des cordes a boyau, les ondulations qui y sont sont bien moindres que celles des cordes de metal acause que leurs parties nont que peu de ressort, et qui usent presque toute de leur force tension, aussi leur son n'a pas l'eclat de celuy des cordes de metal.

J'ay dit cy deuant que les timbres pourroient etre plus resonnans, s'ils etoient soutenus sur un corps mou: mais comme il se peut faire des ondulations circulaires dans le corps du timbre, sans quelles soient interrompues par la suspension, ils ne laisseront pas d'etre fort resonnans quoy quils soient soutenus sur un corps dur et roide.

En examinant les sons de la corde de la trompette marine j'auois remarqué qu'on ne deuoit considerer la longueur que depuis le chevalet jusqu'au

haut de maniere pour faire des diuisions qui donnent
les differens tons, quoyque toute la corde entiere fit
les vibrations a cause du chevalet qui n'est pas arrestée
ferme sur la table, et c'est ce qui m'a donné lieu de
faire l'experience suivante pour m'assurer plus certaine-
ment de ce qui arrivoit a cette corde dans ses vi-

j'ay donc pour cet effet tendu une corde a boyau
de mediocre grosseur sur une regle de bois de sapin
denuion deux pieds de longueur et fort epaisse
affin qu'elle ne put rien communiquer de ses vibrations
a celles de la corde. la corde etant mediocrement tendüe
rendoit un son fort sensible quand on la pinçoit, mais il
n'etoit pas possible de distinguer les vibrations qui
etoient trop frequentes. j'ay enuitte un peu eleué cette
corde en mettant dessous a la distance de 3 pouces de
son extremité un espece de chevalet taillé en pointe
par le dessus ou il touchoit a la regle, ensorte qu'il
pouvoit se mouvoir facilement sur cette pointe
et ayant fait sonner la corde en la tirant de coté
les vibrations que faisoit le chevalet, et qui etoient
sensibles a celle de la corde, m'ont paru fort
distinctes quoyque je n'eusse pas pu les conter, et le son
de la corde etoit plus aigu qu'auparavant, ce qui

ne pouvoit pas absolument venir de la plus grande
tension, car la corde n'étoit que fort peu élevée a
l'endroit du chevalet, et elle faisoit dans toute l'-
étendüe ses vibrations avec le chevalet a peu près.
comme quand il n'y étoit pas. mais pour en être plus
sûr, j'ay encore éloigné le chevalet de 3. pouces
plus qu'il n'étoit auparavant de l'extremité de la corde
et alors quoyque la corde fut moins tendue a
cause que j'avois le même chevalet, et qu'il n'étoit
pas si proche du bout de la corde et que ses vibrations
avec le chevalet ne paroissent un peu plus lentes
de tout au moins egales aux precedentes, le son
ne laissoit pas de beaucoup plus aigu que
dans la premiere position du chevalet. cette experience
que j'ay repetée plusieurs fois ma confirmé dans
l'opinion que j'ay, que les sons ne font pas former
par les vibrations de la corde ou des corps resonans
mais par leurs ondulations comme je l'ay expliqué
cy devant. j'ay fait aussi la même experience sur
une corde a boyau de 6 pieds de longueur
et j'ay trouvé la même chose a ce qui m'a semblé
mais je ne fus assuré que la corde donnoit toujours
le même son soit que le chevalet fut mobile, ou
qu'elle fut des vibrations dans toute la longueur avec

le chevalet, ou qu'il fut arreté ferme, et quelle ne
fit des vibrations que dans la partie ou elle doit
toucher, et c'est ce qui m'a paru de plus considerable
dans cette experience pour confirmer le systeme
que je propose icy.

Ce que je viens d'expliquer sur le son ne detruit
pas ce que j'ay demontré ~~sur~~ des differences du sons
de la ~~corde~~ resonne corde de la trompette marine, —
puisque l'on est assuré par experience, que des relatives
parties d'une meme corde donnent des certains sons —
de quelque maniere que le son se forme dans
la corde.

Dissertation
sur les différens accidens de la vue
Première Partie.

1. des trois sortes de vûe.

On distingue ordinairement toutes sortes de vûes par les trois noms de vûe courte ou forte, vûe longue ou foible, et bonne vûe ou vûe parfaite. ceux qui ont la vûe courte que l'on appelle myopes, voient distinctement les objets qui sont fort proches, ne font quantité d'eux qui font éloignés au contraire ceux qui ont la vûe longue que l'on appelle presbytes, voyent mieux les objets éloignés que ceux qui sont proches, quelque faveur d'imagines. enfin ceux qui ont la vûe bonne et qui tiennent le milieu entre les myopes et les presbytes, voyent aussi distinctement ceux qui sont dans une médiocre distance, comme ceux qui sont semblablement ceux qui sont fort éloignés; cette sorte de vûe que l'on peut considérer comme la plus parfaite.

Il me semble qu'il y a encore trois principaux accidens qui peuvent arriver à chacune de ces trois

[illegible] de vüe qui leur causent de grands chagrins
par la soudaine surprise des maladies de la vüe, ou
[illegible] effets surprenans de la nature.

Le premier en limpulsion de lorgane, qui
meut dre dans les humeurs, ou bien dans la retine que
j'appose le principal organe de la vüe, quoique
je sois très convaincu de lexperience de monsieur
N.

Le second en une dilatation extraordinaire
ou louverture de la prunelle, qui ne laisse pas de
pouvoir se retrecir un peu dans la grande lumiere.

Le troisieme au contraire en un grand
resserrement de cette ouverture qui peut
pourtant sintroduire un peu dans une grande
obscurité.

Quoyque la prunelle se dilate toujours dans
lobscurité et quelle se retrecisse a la lumiere, cette
dilatation, et ce resserrement ne sont pas pourtant
egaux a toute sorte de vüe, et dautant, a cause
que les muscles de leurs tendrons sont encore
[illegible] mous, [illegible] cette dilatation
beaucoup louverture de la prunelle dans lobscurité
et au contraire a retrecir extremement dans
la grande lumiere, le muscle de la prunelle
[illegible] faire de grands mouvemens, il y est forcé

a la delicatesse de lorgane. j'entens de la retine, qui seroit touchée trop fortement par une grande lumiere. les adultes non pas cette facilité a faire la mesure de la prunelle qui a pris plus de fermeté; et enfin les vieillards sont presque toujours dune meme grandeur dans tous sujets a grand jour.

La dilatation ou le resserrement de la prunelle est une chose fort visible; mais le deffaut de lorgane ne peut sappercevoir, a moins que les humeurs ne soyent troubles et blanchâtres.

J'examineray en quoy peut arriver a chaque vüe en particulier selon la raison de la dilatation ou du resserement de la prunelle. en supposant un lorgane defectueux ou fort sain.

Pour ce qui est de la cause de la courte ou de la longue vüe, on sçait assez que ce n'est que la conformation des humeurs et de tout le globe de l'œil. j'ay dit seulement que ceux qui ont la cornée fort convexe ont pour l'ordinaire la vüe courte, a moins que le cristallin ne soit fort plat, ou que tout le globe de l'œil ne soit fort petit. au lieu que cette convexité de la cornée qui paroitroit extraordinaire, ne seroit pas plus eleuée a proportion au dessus de la sphere de l'œil que dans un autre œil qui auroit une

vüe mediocre.

Il peut encore arriver qu'une vüe sera courte quoy= que la cornée soit plate, car si le Cristallin étoit fort convexe, les rayons qui viendroient d'un point éloigné, ne souffriroient presqu'aucune refraction en entrant dans l'œil, mais comme la refraction seroit fort grande en passant dans le Cristallin [illegible] approchent fort proche du Cristallin avant que de rencontrer la retine, et par consequent il y auroit de la confusion sur la retine et dans la vision, ce qui n'arriveroit pas si l'objet étoit proche de l'œil, car alors le concours des rayons seroit plus éloigné du Cristallin.

III. Remarque sur la perfection de la vüe.

On doit remarquer icy en passant qu'une semblable conformation d'humeurs n'est pas suffisante toute seule pour faire une egale perfection de vision, comme un œil de deux lignes de diametre qui auroit les humeurs semblables en figure a un œil d'un pouce de diametre ne pourroit pas voir [illegible] objets fort eloignez aussi distinctement que celuy qui a un pouce de diametre. a moins qu'il n'y ait l'organe 36 fois plus fin et plus sensible que celuy de l'œil d'un pouce: car la peinture d'un objet seroit trente six fois plus petite dans

de petit oeil que dans le grand. les superficies
des globes de ces yeux etant dans la raison
de un a trente six.

Il s'ensuit dela que les oiseaux et principalement
ceux qui vivent de proye doivent avoir l'organe
de la vüe tres fin, pour pouvoir appercevoir de fort
petits animaux dans une tres Grande
distance.

La grandeur de l'oeil, sa forme en general
et celle de chaque humeur en particulier augmentent IV.
ou diminuent la peinture des objets sur la retine. de la grandeur apparente des objets.
Quoyquepuy toutes les parties etant differentes dans
la plus part des yeux, il est certain qu'ils ne voyent
pas les objets de meme grandeur car dire
que les memes objets dans un meme eloignement
ny font pas de peintures egales. mais
comme dans un meme oeil tous les objets
sont augmentez ou diminuez dans une meme
proportion des yeux differents jugeront
tous de meme de la grandeur des objets en
les comparant les uns aux autres.

NOUS disons qu'un objet est egal ou plus grand
qu'un autre objet, lorsque sa peinture sur la retine

etant egale ou plus grande que celle de lautre,
nous ne connoissons rien qui nous puisse faire
douter de la justesse de la comparaison que nous en
faisons. mais il arrive rarement que cette compa=
raison soit juste a eux. que nous sommes presque
toujours tromper par la distance de laid a l'objet.
Car si Deux objets font leurs peintures egales sur la retine
et que nous ne puissions avoir aucune connoissance
de leur distance jusqua laid, nous jugeons que ces
deux objets sont egaux, quoy quils puissent etre en
effet fort inegaux. au contraire deux objets etant
entierement egaux et semblables, si nous jugeons que la
distance de lun soit plus grande que la distance
de lautre, nous estimerons que celuy que nous croyons
le plus eloigné en beaucoup plus grand que lautre;
quoy quen effet ces deux objets fassent leurs peintures
egales sur la retine. cet en partie ce faux jugement
qui nous fait croire que la lune etant vers lhorizon
est bien plus grande que quand elle est fort eleué.

V
De la Grandeur apparente des objets.

La Grandeur apparente dun objet nous sert
beaucoup pour juger de sa distance, quand il nous reste
une idée distincte de la grandeur apparente de ce
meme objet, lor quil etoit eloigné de notre oeil dune
distance connuë: mais la grandeur apparente dun

objet, en adire la grandeur de sa peinture sur la retine
dans toujours accompagné dune couleur qui doit
paroitre moins forte quand l'objet en eloigne que quand
il en proche, il s'ensuit que la couleur apparente dun
objet, nous doit servir beaucoup a juger de son eloignement
lorsque nous pouvons comparer les couleurs. Car si
nous sommes assurez que deux objets sont d'une
couleur egale et semblable, et que l'un nous paroisse
quatre fois plus vif en couleur que l'autre, nous jugeons
par experience que celuy qui nous paroit le plus
vif en couleur une fois plus proche de l'oeil que
l'autre: car la lumiere se repandant uniformement
une meme quantité eclairera ou touchera des superficies
qui seront entr'elles; comme les quarrez des distances de
ces superficies qui seront entr'elles ~~comme les quarrez~~
~~des distances~~ jusqu'a l'objet lumineux; comme a un
pied de distance de l'objet lumineux une superficie
de 9 pieds ne recevra pas plus de lumiere que celle
d'un pied a 6 pieds de distance du meme objet.

La connoissance que nous avons des couleurs
des objets, nous sert donc aussi a juger de leurs —
distances, mais lorsque les objets ne sont pas presens
il en est difficile den faire la comparaison, car
les couleurs nous paroissent differentes par

leurs oppositions ou accompagnemens. une couleur qui n'ait que de mediocre vivacité paroit noire etant exposée ~~contre une~~ fort eclaire: mais cette meme couleur paroit eclaire etant exposée contre une obscure ou noire. la lumiere qui eclaire les couleurs les change considerablement; le bleu paroit vert a la chandelle et le jaune y paroit blanc, le bleu paroit blanc avec foible lumiere du jour, comme au commencement de la nuit; les peintres connoissent ces couleurs dont l'eclat est beaucoup plus grand a la lumiere de la chandelle qu'au jour, au contraire. il y en a plusieurs quoyque tres vives au jour, qui paroissent extremement leur beauté a la chandelle. par exemple le vert de gris paroit d'une couleur tres belle a la chandelle, et lorsqu'il est tres foible en couleur, c'est a dire lorsqu'on y mesle une tres grande quantité de blanc, il paroit d'un assez beau bleu. les cendres qu'on appelle ou vert ou bleuis paroissent a la chandelle d'un fort beau bleu. les rouges qui viennent de la laque paroissent tres vifs a la chandelle, et les autres comme la mine et le vermillon paroissent ternes.

VI. De la direction des deux yeux.

On voit par ce que je viens de rapporter qu'on ne sçauroit juger qu'avec peine si un objet est plus proche qu'un autre objet par la

grandeur de la peinture sur la retine n par-
la minuceté de sa couleur, et qui en plus difficile
d'en juger quand les objets ne sont pas presens que
lorsquils le sont ; mais il en presqu'impossible quand
on ne le sert que dun seul oeil. Lhabitude que
nous avons prise en regardant avec les deux yeux
nous sert beaucoup dans le jugement que nous faisons
de leloignement des objets lorsquils sont presens ; car pour
voir un objet proche proche il faut donner aux deux
yeux une disposition fort differente de celle qui en-
requise pour en voir un qui soit eloigné, et la peine
de celle qui en requise pour en voir un qui soit eloigné
et la peine que nous sentons quand nous voulons
voir un objet fort proche apres en avoir consideré
un qui etoit eloigné, ou au contraire, ne vient
que dela difficulté quon a de diriger les axes
des deux yeux vers le meme endroit, et non pas de
leffort quil faut faire pour donner aux yeux des
conformations differentes pour voir distinctement les
objets a differentes distances, ce que je demontreray
dans le discours suivant.

ON peut faire lexpience suivante pour
connoitre la difficulté quon a de juger des distances
avec un oeil seul on suspend un anneau a vis a

pres de l'oeil, et l'on trouvera cet anneau en sorte qu'on n'en voit que le coté; ensuite ayant fermé un oeil on éprouvera qu'il sera assez difficile d'enfiler cet anneau avec une baguette que l'on tient a la main, si tout cela se fait un peu vite.

VII. De la parallaxe des objets.

La parallaxe des objets est ce qui nous sert le plus a nous en faire connoitre l'éloignement; car il faut que l'oeil change de place pour reconnoitre, lequel de deux objets est le plus proche. par exemple: si deux objets paroissent fort proches l'un de l'autre dans une certaine position de l'oeil lors que l'oeil se meut vers la droite, l'objet qui paroit aussi s'eloigner de l'autre vers la droite est le plus eloigné, et l'autre qui demeure vers la gauche sera le plus proche, de meme si l'oeil se meut vers la gauche, l'objet le plus eloigné paroitra aussi s'ecarter de l'autre vers la gauche et le plus proche demeurera a droit.

VIII. Discernement des petites parties de l'objet.

Enfin lorsque l'oeil peut voir distinctement les petites parties d'un objet, il juge que cet objet est plus proche que celuy dont il ne voit que les parties confusement.

IX. Du jugement qu'on fait de l'eloignement des objets dans les tableaux et dans les decorations des theatres.

Il y a donc cinq choses qui servent a la vüe pour juger de l'eloignement des objets, leur grandeur

apparente la variété de leurs couleurs la
direction des deux yeux, la parallaxe des objets et
la distinction des petites parties de l'objet. de ces
cinq choses qui seruent a faire paroitre les objets
proches ou eloignés, il ny a que les deux premiers
dont les peintres puissent se seruir dans leurs
tableaux. Et pourquoy il ne leur est pas possible
de tromper parfaitement la vüe. dans les decorati-
ons des theatres on joint les cinq choses toutes
ensemble, et il ne faut pas s'etonner si l'oil ne sauroit
se desfendre d'etre trompé ony diminuée la gran-
deurs des objets a proportion quon veut faire paroitre
a differentes distances comme des colomnes dans
une ordre d'architecture, affin que les deux yeux
soient obligés de changer leur direction pour
appercevoir distinctement les parties du tableau
proche et de celuy qui est un peu eloigné. et
meme eloignement des tableaux les uns des au-
tres, font aussi a faire remarquer un peu de
parallaxe en changeant la position de l'oil, et
comme on ne connoit que par une idée distincte
dela quantité dela parallaxe suivant la
distance des objets, il suffit de connoitre quil

y en a pour etre convaincu quils sont eloignez
les uns des autres sans en determiner la distance
car pourquoy les quatre choses se trouvant ensemble
on jugera dabord que des objets aussi proches doivent
etre fort eloignez. pour la derniere chose qui
pourroit un peu deconcerter la tromperie on ne
sçauroit l'appercevoir a cause du faux jour des
lumieres dont on eclaire toutes les decorations.

X.
de la cause de la vision.

NOUS avons un endroit de la retine qui en le
plus sensible de tous pour etre touché plus finement
par les objets, et soit que ce soit par la delicatesse
de cet endroit de l'organe, ou par le concours
des esprits qui y portent plus facilement que
dans les autres, lorsque la pointe des pinceaux
des rayons tombe sur cet endroit, nous voyons
les objets bien mieux que lorsquils tombent ailleurs.
nous prenons donc une habitude de tourner
le globe de l'œil dune certaine maniere, afin
que les objets que nous voulons voir distinctement
fassent leur peinture sur cet endroit de la retine.
le point de la retine doit etre naturellement
celuy qui est exposé directement aux objets afin
quelle en soit plus sensiblement touchée, et en

comme nous le voyons dans le plus part des — yeux, cependant soit par une habitude ou par un deffaut de l'organe qui n'est pas assez delicat dans cet endroit-la, il y a des yeux qui sont — obligés de se tourner de biais pour faire en sorte que les objets qu'ils veulent bien voir fassent — leur peinture sur l'endroit de l'organe qu'ils ont le plus sensible, quoyqu'ils y tombent obliquement, et c'est le deffaut des vûës que nous appellons louches.

De la vûë Courte.

XI
De la vûë courte ou des myopes.

7

De l'vne vûë courte alés organes bien nets et bien sains et la prunelle mediocrement ouverte, elle distinguera parfaitement les plus petits objets lorsqu'ils seront proches de l'œil a la distance qui en necessaire pour faire que leurs images soient distinctes sur le fond de l'œil car l'image de ces objets etant fort grande la peinture des plus petites parties occupera un espace assés considerable sur la retine ce qui en rendra la vision plus distincte et plus particulariséé que si elle n'occupoit qu'un tres petit

espace · où il le feroit toujours quelque peu de Confusion.

XII. myope avec les humeurs troubles.

mais si les humeurs etoient troubles comme il arrive souvent, cette sorte de vüe ne pourroit voir les objets que confusement, quoyque leur image en fut fort grande sur le fond de l'œil a moins que ce ne fut dans un grand jour, ou la grande lumiere pourroit en quelque facon recompenser ce que l'opacité des humeurs feroit perdre. les vües sont affectés de la meme maniere que celles qui seroient bien saines, et qui verroient les objets au travers d'un crêpe blanchatre.

XIII. myope avec les humeurs colorées.

si les humeurs n'etoient point troubles mais s'elles etoient teintes seulement de quelque couleur, comme de rouge ou de jaune on verroit les objets teints de cette couleur, comme quoyqu'on les vit fort distinctement, ce seroit a peu prés de la meme maniere que les verroit une vüe bien saine qui regarderoit au travers d'un verre teint de ces memes couleurs.

Ce qui est de remarquable en ce deffaut, est que l'on ne peut s'en appercevoir, a moins qu'il ne soit tres considerable et qu'il ne survienne tout d'un coup

car alors il reste une memoire des couleurs qui sert a faire la comparaison dun meme objet diuersement coloré dans differens temps. mais il faut que nous ayons une connoissance parfaite certaine par une longue experience que l'objet que l'on regarde doit etre dune certaine couleur laquelle soit immuable.

S'il n'y avoit aucun fait favorable plus vite aux changemens des couleurs, on en peut faire, plus facilement l'experience, en regardant au travers d'un verre un peu coloré de vert ou de quelque autre couleur, et en cachant les objets qu'on pourroit voir sans l'interposition de ce milieu, car en tres peu de tems on ne s'apercevra plus que tous les objets seront teints de couleur verte ou d'autre couleur, et l'on s'en appercevra encore bien moins si l'on met le verre devant les yeux apres les avoir tenus assez long temps fermés et avant qu'ils soient ouverts.

XIV
Experience sur la maniere dont on voit les couleurs.

On ne sauroit se persuader facilement que l'on voye tous les objets de differentes couleurs au jour et a la chandelle, a cause que l'on compare toutes les couleurs ensemble, il est pourtant vray que

le bleu y paroit vert, et si nous n'avions jamais
vû le bleu que à la lumiere dela chandelle
nous ne distinguerions pas cette couleur d'avec
le vert. pour connoitre quelle difference il y a
entre des objets eclairez dela lumiere dela chandelle
et ceux qui sont eclairez dela lumiere du soleil,
il faut bien fermer les fenetres dune chambre
pendant le jour et y allumer des chandelles qui
puissent bien eclairer tous les objets qui y sont
et passant ensuitte dans un autre bien eclairé
dela lumiere du soleil, si l'on regarde au travers
dela porte dela chambre les objets qui y sont
eclairez dela lumiere dela chandelle, ils paroitront
teints dun jaune rougeatre par comparaison
a ceux qui sont eclairez du soleil et qu'on peut
voir a même tems; ce qu'on ne peut remarquer
tant qu'on est dans la chambre ou en la chandelle.

XV. methode pour connoitre si l'on voit un objet de même couleur avec les deux yeux.

A l'occasion de ces differentes apparences de
couleurs, j'ay cherché s'il n'etoit pas possible de
connoitre si l'on voit avec chacun des yeux les objets
teints dune couleur differente de celle qui paroit
avec l'autre oeil. quoyqu'un même objet fasse deux
images differentes dans les deux yeux, nous ne

voyons pourtant qu'un objet lorsque nous pouvons
tourner les yeux de telle maniere que les images
tombent sur des parties analogues de l'organe de
la vüe, et nous ne voyons qu'un seul objet avec
les deux yeux; neanmoins voyons pourtant qu'un
objet, il faut neccessairement que les yeux
prennent la disposition qui est convenable
a cet effet soit que l'objet qu'on regarde avec
les deux yeux soit proche ou eloigné. cette
disposition doit etre pour l'ordinaire la direction
des axes des yeux vers l'objet qu'on regarde:
ou autre objet plus proche ou plus eloigné que
celuy vers lequel les axes sont dirigés. paroitra
double a cause que la peinture ne sera pas faite
pas dans les deux yeux sur deux endroits ana-
logues l'un a l'autre. on en peut faire l'experience
si en dirigeant les deux yeux vers quelque
objet eloigné on fait amener tantot attention
a un autre objet qui soit proche; car cet objet
proche paroitra double, et au contraire si les
yeux sont dirigés vers quelque objet proche
l'objet eloigné paroitra double. de meme si en
tirant les paupieres d'un oeil vers le coin exterieur.

on l'empesche de prendre sa situation ordinaire.
L'objet que l'on regardera avec les deux yeux
paroitra aussi double, car la peinture de
l'objet ne se fera pas dans l'oeil contraint sur
l'endroit analogue à celuy où elle se fait
dans l'oeil libre.

On peut encore voir un objet double en
mettant au devant de l'un des yeux un verre
qui soit assez convexe et en regardant l'objet de
coté car les rayons qui viendront de l'objet, et
qui rencontreront obliquement le verre le detour-
neront comme s'ils venoient d'un autre point.
et feront par consequent leur peinture dans le
fond de l'oeil en un endroit qui ne sera pas analogue
a celuy où elle se fait dans l'oeil qui en
devient.

Toutes les manieres de voir un objet double
etant contraintes ou alterés par le verre que
l'on met entre deux, on ne peut pas les servir
pour connoitre certainement si l'on voit un meme
objet de differente couleur avec les deux yeux
car si les deux images se confondoient leurs couleurs
aussi se meleroient.

XVI
un objet paroit different-
ment eclairé avec les
deux yeux apres
avoir regardé
une grande
lumiere.

Apres avoir regardé avec un seul obje avil une grande lumiere pendant quelque temps avec une lunette d'approche qui occupe tout l'oeil on s'apercevra facilement que les objets que l'on verra avec cet oeil paroitront beaucoup plus sombres qu'avec l'autre que l'on a tenu fermé. cet experience on faite a faire au commencement de la nuit en regardant alternativement avec les deux yeux une muraille blanche, ou une feuille de papier blanc, apres avoir observé la lune avec une lunette d'approche, la veritable raison de cet effet ne peut etre que le retrecissement de l'ouverture de la prunelle qui a été causé par la grande lumiere. Car elle s'est fermé autant qu'il luy a été possible, a laquelle de la grande clarté de l'objet, l'ouverture de la prunelle de l'autre oeil, restant s'etant bien moins retrecie et seulement par simpathie, ainsy il entre bien moins de rayons de l'objet blanc par la petite ouverture de la prunelle que par la grande, c'est pourquoy l'objet paroit plus blanc avec l'oeil qui a été fermé qu'avec l'autre. Si la muraille blanche etoit fort eclairé comme au grand jour, on ne

pourroit pas bien faire cette experience, car la grande lumiere de l'objet blanc toucheroit une trop de violence l'œil que la nauroit pas une petite ouverture pour la distinguer dauantage qui entreroit dans l'œuve œil pas une ouuerture mediocre.

ON pourroit encore ajouter a cette raison que la retine ayant été fortement ebranlée par une grande lumiere, elle ne peut pas lire aussitot par elle dun objet mediocrement eclairé, car, pourquoy elle en a touché bien moins vivement que celle de l'autre œil; et ainsi on verra cet objet plus clairement avec l'œil qui a été fermé que avec celuy qui a regardé une grande lumiere.

Il est toujours facile de faire ces sortes d'experiences, lorsque les differences sont fort grandes mais il n'en est pas de meme quand elles sont presque insensible il se trouve peu de personnes qui ayent les deux yeux parfaitement semblables, avec lesquels on voit les objets dans une certaine distance bien mieux qu'avec l'autre, et il est assez facile de s'apperceuoir de ce defaut a moins qu'il ne soit tres petit; et pour le reconnoitre, on

peut le servir de la methode que j'expliqueray dans la seconde partie pour mesurer exactement la force et la foiblesse des vûës ; mais il est plus difficile de sçavoir si l'on voit un meme objet de differente couleur avec les deux yeux lorsque la difference est petite j'ay neanmoins une methode pour le connoitre certainement quelle petite que soit cette difference.

ON prend deux cartes minces comme sont celles dont on joüe et l'on fait a chacune un petit trou rond et egal de la grandeur d'un tiers ou d'un quart de ligne, et les ayant appliqué chacun a un œil on regarde au travers des trous un papier blanc également eclairé. il paroit a chaque œil un cercle du papier au travers de ces trous, et ces cercles seront joints l'un a l'autre et n'en feront qu'un, si les rayons qui viennent d'un meme point du papier et qui ayant passé au travers du milieu de chaque trou des cartes, vont rencontrer le fond des deux yeux dans des points analogues, après s'estre rompus dans les humeurs de l'œil. mais si l'on change la position de ces cartes on verra deux cercles du papier separez l'un de l'autre, ainsy on

en approchant ou en Reculant les cartes lúne de
lautre on pourra faire ensorte que les deux
cercles qui paroissent du papier le touchent
par leurs circonferences le cercle paroittra
un peu plus grand que lautre il ny auroit qúá
eloigner de lúd le trou dela carte auquel
duquel il parou, car le cercle paroittra dautant
plus petit que le trou sera plus eloigné.

Les deux cercles du papier etant proches lún de
lautre, il sera fort facile de faire la comparaison
de leur couleur, et si les yeux sont parfaitement
egaux, la couleur des cercles du papier paroitra
egale: mais si les humeurs des yeux sont teintes de
quelques couleurs, ou si les retines ne sont pas egalement
sensibles a limpression des objets, les cercles paroi-
tront de differentes couleurs. on doit appliquer
alternativement les cartes aux deux yeux, pour
connoitre si la diversité des trous napporte pas
quelque changement a cette apparence.

XVII
remarque sur
la bonté de la
vüe.

Jáy remarqué par cette experience, que
ceux qui voyent les objets plus rouges avec un oeil
quávec lautre, estiment cet oeil le meilleur dans
lusage ordinaire. on ne peut pas dire que cet
effet soit causé par louverture de la prunelle

ce que lon pourroit attribuer a celle qui forme
la plus grande, puisquelle est egale pour les deux
yeux etant reduits a louverture des trous des
Cartes; Cest pourquoy on pourroit croire que cette
rougeur vient de la delicatesse de la retine de cet
oeil, qui etant ebranlée plus fortement que celle de
lautre oeil, luy fait paroitre le meme objet plus
rouge.

Sil'on veut faire cette experience avec plus de
justesse, il faut unir les yeux fermez un peu de
tems avant que de regarder au travers des trous
des Cartes. l'on remarquera aussi que si lon le
frotte vn peu un oeil, on en verra lobjet plus
rouge quavec lautre, ce qui durera un peu de
temps et qui peut etre causé par lebranlement
de toutes les parties de l'oeil, ou dun peu de
sang qui separe de toutes les parties de l'oeil
ou peu peu de sang qui separe par ce
frottement dans les humeurs liquides de l'oeil.

Il peut arriver que lon verra des couleurs
differentes avec le meme oeil dans des temps differens
ce qui peut venir de quelque accident de ses
humeurs ou de la retine, quand meme elle ne seroit

par le principal organe dela vision; car si lon
suppose que ce soit la choroide, les changemens
qui pourront luy avriver causeront aussi des difformes
sans toutefois en oculure la retine par ou les rayons
doivent passer auant que de tomber sur la choroide.

XVIII
myopes ne regardent pas attentivement ceux qui leur parlent.

(*) Il remarque ordinairement que ceux qui
ont la veüe courte ne regarde pas attentivement
ceux qui leur parlent, comme on á accoutumé de
faire, je crois que cela ne vient que de ce qúils
ne scauroient considerer exactement les mouuemens
des yeux de ceux qui parlent; ce qui contribue
beaucoup a expliquer la pensé, et augmente la
force des paroles, et qúils sont seulement attentifs
a leurs discours, sans auoir aucun objet fixe sur
quoy ils attachent leurs yeux comme on fait
ordinairement en pensant fortement a quelque
chose auec les yeux ouuerts sans rien voir
distinctement.

XIX
myopes aiment une grande ouuerture de pruncelle voyent confusement

Les veüs courtes dont les organes sont fort sains
ne voyent que rarement les objets tres distinctement
a quelque distance qúils soient posés selon ouuerture de
la pruncelle ni posée trop grande; car il faudroit une
conformation aux courbures des humeurs de láil fort
differente de celle quon y remarque, pour faire que

les rayons qui viennent d'un point après avoir souffert trois refractions differentes, allassent s'assembler exactement dans un autre point qui devroit être determiné par la forme des courbures et se rencontrer aussi sur le fonds de l'œil.

Il y auroit quelque vûë courte qui eut tous les avantages, elle en auroit encore une autre fort grand; car elle pourroit voir distinctement les objets dans des lieüs fort sombres, a cause de la quantité des rayons qui entreroient dans l'œil, et qui y formeroient une peinture distincte: mais ces sortes de vûës ne pourroient quasi une peine supporter la grande courbure laquelle feroit une trop forte impression sur le nerf optique.

Ceux donc qui n'auront pas les trois superficies ces humeurs d'une convexité requise pour rassembler exactement les rayons qui viennent d'un point, dans un autre point sur le fonds de l'œil verront les objets confus, et ils les verront d'autant plus confus qu'ils sont dans des lieux plus obscurs, cette confusion ne venant pas de l'obscurité du lieu; mais d'autant que l'ouverture de la prunelle se dilatant encore plus dans l'obscurité que dans le grand jour les extremités des cones des rayons qui seront coupés sur le fond de l'œil, en seront d'autant plus grandes

et feront par conséquent une plus grande confusion, car il n'y a presque point de vûe dont la prunelle n'ayt quelque latitude d'extension, et de retrécissement dans l'obscurité et dans le grand jour.

XX
myopes qui voient les objets doubles quand ils sont éloignés

Il arrive encore aux vûes courtes de voir les objets doubles quand ils sont éloignés, comme les lignes noires des heures de quelque grand cadran au soleil dont le fond est blanc, j'entens seulement des vûes courtes, qui peuvent distinguer médiocrement les objets éloignés; car pour celles qui sont très courtes, qui peuvent distinguer médiocrement les objets éloignés — car pour celles qui sont très courtes, quoyque le nerf ne leur arrive elles ne s'aperçoivent le remarquer, a cause de la trop grande confusion des images. Et a l'égard des vûes courtes leurs ét commencent avec les vûes foibles, et il m'a semblé un des plus difficile a expliquer. j'avois cru d'abord que la seule confusion de l'image d'un objet noir sur un fond blanc pouvoit causer cet effet; mais ayant examiné la chose attentivement, j'ay trouvé qu'il ne devoit paroître seulement qu'une penombre aux deux côtés du trait noir qui paroitroit alors plus pâle qu'il ne devroit, il faut donc chercher ailleurs la cause de cet effet, mais comme

elle ne peut avec que dans les humeurs de l'œil, il faut tacher de les découvrir.

XXI. examen de la figure des objets doubles.

Monsieur Descartes fut le premier que je sache, qui examina les courbures des corps transparens qui rompent les rayons de lumiere, pour faire que ceux qui viennent d'un meme point s'assemblent aussi en un meme point apres avoir passé au travers du corps. j'ay trouvé aussi dans les papiers manuscrits de Monr. de Roberval une matiere traitée a fonds; et enfin depuis peu Monr. Huygens en a fait imprimer une demonstration dans son traité de la lumiere. on connoit donc par ce que les excellens geometres en ont écrit que les verres lenticulaires qui sont formez de deux convexitez spheriques, ne sont pas propres a faire que les rayons qui viennent d'un point lumineux qui est proche du verre, se rassemblent en un autre point apres avoir passé au travers. ce sera a peu pres la meme chose de tous les autres corps transparens.

Si l'une des convexitez du corps transparent n'est spherique elle doit etre plus eleuée dans le milieu et recourbée ensuite en sens contraire vers les bords a peu pres comme la premiere des

conoides de niewmedes ou bien silon veut distribuer
cette courbure a toutes les surfaces du corps sans parler
il faudra que le milieu de ce
corps soit plus eleué que les bords
ce qui en=faile a connoitre. il
faut donc que le cristallin ayt
cette figure pour faire quún oeil qui sera proche
dún objet le voye distinctement. une semblable
conformation de la cornée peut aussi seruir a la
meme chose, mais ceux qui ont la veüe de cette sorte
ne peuuent pas voir distinctement les objets eloignez
et ils peuuent dre myopes par lune de ces deux
causes ou pour toutes deux ensemble. car le riure
qui a la figure qui luy est necessaire pour
faire que les rayons qui viennent dun point
lumineux qui en est proche, sassemblent exactement
en un autre point fort proche, peut dre considerée
en quelque façon comme etant composé de deux
riures lenticulaires et spheriques de differens foyers.
dont le plus conuexe est placé au milieu de
lautre qui nest que comme un anneau.

On sçait que les regles dioptrique. que le
le plus conuexe de deux riures qui reuoyent les
rayons dun objet eloigné fait son foyer quand
lapelle etoile plus proche que celuy qui fait le

moins convexe, il doit donc arriver que le
Crystallin qui aura la figure propre pour
rassembler en un point les rayons lumineux qui —
viennent d'un autre point proche de l'œil, fera
deux foyers separez et distincts, si le point lumineux
ou fort eloigné de l'œil quoy qu'il passe plusieurs —
rayons entre ces deux foyers, mais il en certain qu'en
ces deux points il y en a une plus grande quantité
qui y concourent que par tout ailleurs. j'ay eu
entre les mains un verre de lunette d'approche —
de 15 pieds de foyer qui avoit aussi deux foyers
tres distincts, mais je ne croy pas que cela vint de
la figure du verre, mais seulement de la matiere
dont une partie faisoit une plus grande refraction
que l'autre. ce verre ne faisoit pas un bon effet,
car les deux foyers differens causoient de la confu-
sion dans l'image. il se pourroit faire aussi par
la meme raison que la matiere du Crystallin
n'etant pas homogene pourroit causer des inegalitez
dans les refractions et rendre la vision
confuse.

si l'œil est donc disposé de telle sorte que les

rayons d'un objet eloigné ayant passé au travers
dela partie du milieu du cristallin telle que la vieus
se representes, concouvrent sur la retine, il se fera
en cet endroit une peinture de l'objet, mais autti-
l'anneau du bort du cristallin qui fait son foyer plus
loin, peindra le meme objet comme un petit
anneau autour du premier, car les rayons ne
concourent pas encore pour former leur foyer. ainsi-
si l'objet est un petit noir placé sur une superficie
mediocrement blanche, il doit former un petit point
noir a lendroit du foyer dela partie du milieu
du Cristallin, mais les rayons qui ont passé
par le bord du cristallin s'assemblent en un point
sur la retine, ceux qui passeront par le milieu
ne rencontreront la retine qu'après leur point
de concours et y formeront une base confuse.

Il arrivera dela que la couleur dela
prunelle en sera grande et si le cristallin est de
la figure dont je viens dele supposer, comme il
convient aux myopes l'oeil verra l'objet double
quand il en sera fort eloigné, car les rayons qui
venoient d'un objet proche s'assembloient sur la
retine et quand l'objet sera eloigné ceux qui
arriveront sur les bords du Crystallin s'assembleront

au dessus de la veine, et au dessous du point de
concours de ceux qui tombent sur le milieu, car
alors les rayons comme parallèles font deux foyers
differens, ce qui en faille a connoitre, l'un pour
chaque point de la ligne noire fera des cercles
ou anneaux comme on le voit dans cette figure:
mais ces anneaux se recouvrant les
uns les autres vers leur extremité, ces
ils y feront paroitre deux lignes ou
bandes noires plus larges que la
veritable image du trait noir du cadran.
pour ce qui est de l'image formée par les rayons qui
tombent sur le milieu du verre elle ne peut rapporter
aucun changement a cette apparence; car comme
les rayons concourent fort proche du verre,
la rencontre de leur cone sur la veine en fait
l'arge et passe pardessus des extremités
des anneaux, et augmente autant la force
des deux bandes noires qu'elle obscurcit la
partie qui en est entre deux.



On doit remarquer que les deux bandes
ou traits noirs qui se representent dans
l'air sont dans l'ordre naturel, c'est a dire, que

si l'on met un corps obscur AB entre l'œil et l'objet et assez proche de l'œil, et qu'on le fasse avancer peu à peu de droit à gauche, le trait noir de la gauche formé par les parties des anneaux comme D doit disparoître le premier; car le coté droit du cristallin étant caché, la bande noire qui se trouve à gauche dans le fond de l'œil disparoîtra et comme nous sommes accoutumez à juger les objets dans une position contraire à celle ou la peinture se fait dans notre œil, nous jugeons aussitôt que c'est la bande droite qui disparoit; mais en examinant l'œil des presbytes j'en parleray plus au long de cet effet.



Si le cristallin a une conformation contraire à la precedente comme si la partie du milieu en plus applatie que celle des bords, comme on le voit dans la figure suivante, et qui convient aux presbytes, il s'ensuivra que les rayons qui tomberont sur le milieu de la convexité en venant d'un point eloigné comme s'ils étoient paralleles entre eux feront un foyer plus eloigné que ceux qui tomberont sur les bords, car ces bords font

portion dune feuille hyperbolique plus courbe,
que la partie du milieu.

Sil on suppose donc comme cy deuant que le
fond dun œil soit a la distance qui est necessaire pour
receuoir la pointe des pinceaux des rayons qui ont
passé par le milieu du crystallin, et que louuerture
dela prunelle soit fort grande, les rayons qui passeront
par les bords feront leur foyer auant quils rencontrent
le fond de lœil, et ils formeront sur le fond de lœil
au dela de leurs concours un anneau noir si lobjet
est vn point noir.

Il arriuera donc a cet œil la meme chose
que laudre car silobjet est eloigné et que ce soit un
trait noir sur un fond mediocrement eclairé, il se
formera sur la retine deux
petites bandes noires par les ren-
contres des anneaux qui sont
formez par chaque point noir
dela ligne de lobjet, et les points
du milieu qui seront les foyers
dela partie du milieu du crystallin
doiuent former vn petit trait qui sera presque toujours
effacé par la lumiere des cotez qui lenuironne, si le
fond en est clair et que le trait soit delié. le trait
du milieu formé par les pointes des pinceaux du foyer

de la partie du milieu du crystallin pourra aussi
s'auancer. si l'œil en vn peu plus ou moins long
qu'il est neussaire pour vnir exactement sur la
retine la pointe des pinceaux des rayons qui
ont passé par le milieu du crystallin.

On doit aussi remarquer qu'il arriuera a cet œil
le contraire de ce que nous auons dit de l'autre si
l'objet; car les rayons qui tombent tant sur le milieu
du cristallin que sur les bords faisant leurs foyers
separez et au dela de la retine ~~que en declinant~~ si l'on
fait auancer de droit a gauche proche de l'œil
un corps noir entre l'objet et l'œil, cet objet paroitra
cacher la bande noire qui est de l'autre coté que
l'objet qui s'auance ou qui cache la moitié la
moitié du cristallin, comme je l'expliqueray en
parlant de la vüe foible. mais cet œil qui doit passer
pour celuy d'vn myope quand l'ouuerture de la prunelle
est grande, comme je l'ay supposée a cause que
la plus grande partie des rayons qui tombent sur
les bords font vn foyer plus vif que ceux qui
tombent au milieu, doit au contraire passer pour
l'œil d'vn presbyte, si l'ouuerture de la prunelle
est petite, a cause qu'il n'y aura que les rayons
du milieu qui toucheront la retine et qui la
rencontreront fort loin du crystallin.

Mais quand l'ouverture de la prunelle sera grande, si la figure du crystallin, comme j'ai la viens de supposer ne peut faire convenir les rayons des bords qu'au delà de la retine, et ainsi paroitra le mesme pour celuy d'un presbyte.

J'ay dit encore que la figure exterieure de la cornée pouvoit faire l'effet que je viens de rapporter, ce qui est tres facile a comprendre, apres ce que j'ay expliqué, et en est aussi pour cette raison qu'un homme ayant été blessé dans l'œil d'un coup qui avoit fendu la cornée sans toutefois en faire sortir l'humeur aqueuse, la playe estant guerie, il demeura au milieu comme un sillon qui corrompoit la convexité ordinaire de cette membrane, et qui faisoit comme deux convexités differentes, ce qui faisoit que cet homme voyoit les objets doubles avec cet œil.

XXII. accident d'une blessure.

C'est aussi par les irregularités du crystallin ou de la membrane cornée que l'on explique facilement les couronnes et les iris que l'on voit la nuit autour des chandelles, et si l'on voit toujours ces couronnes on peut estre assuré que les defauts de la superficie du crystallin ou de la cornée sont si on les voit que dans de certains tems ou si

XXIII. des iris et des couronnes qui paroissent autour des chandelles.

presque attribuer ces accidens que un changement de figure de la cornée, comme quand on a tenu la main longtemps appuyé contre l'œil laquelle a comprimé la partie la plus eleuée de cette membrane.

On voit dans les figures precedentes que les deux foyers que causent les superficies irreguliers des humeurs dans de certaines distances font qu'il se peint sur la retine un cercle lumineux et foible autour du point ou il se ramasse plus de rayons, ce qui fait voir tres distinctement, et c'est ce cercle qui nous fait paroître des couronnes autour des objets lumineux pendant la nuit.

Si l'irregularité de la superficie des humeurs n'est pas fort considerable, on aura seulement un cercle clair sans pouuoir y appercevoir de couleurs, mais si elle en fort grande, il se fera une grande refraction qui fera voir des couleurs.

On pourra s'assurer de ce que je viens d'expliquer en faisant passer un objet noir au deuant de la prunelle et proche de l'œil; car quand cet objet couurira la moitié de la

prunelle, la moitié du cercle lumineux
disparoitra d'un coté ou d'autre, suivant la
nature de l'œil, comme j'ay expliqué cy
deuant, et on avvisera toujours sur les grand la
precaution de mettre l'objet noir fort proche
de l'œil, quand le corps lumineux sera grand
mais s'il en petit en objet interposé pourra etre
un peu eloigné de l'œil, mais aussi le cercle
paroitra moins lumineux, si la lumiere en
petite.

XXIV. Sentiment de Descartes.

Il y a quelques philosophes qui attribuent
cet effet a des plis ou rides circulaires sur les
surfaces des humeurs, mais il seroit difficile
d'expliquer de quelle maniere ces rides se
seroient formés, outre que je ne crois pas
qu'on ayt jamais rien observé de semblable
dans aucun œil.

XXV. De la vüe courte qui a l'ouverture de la prunelle fort petite.

Si une vüe courte a l'ouverture de la
prunelle fort petite et les organes fort sains,
elle pourra voir tres distinctement les plus
petits objets lors qu'ils seront exposés au grand jour,
dont la force ne pourra pas blesser la retine
a cause qu'il n'entrera dans l'œil que peu de rayons.

et quoyque cet œil soit aussi convexe qu'un autre
œil qui auroit l'ouverture de la prunelle plus
grande, il ne laissera pas de distinguer les objets
éloignez bien mieux que l'autre: car les cones
des rayons lumineux étant plus aigus leurs
pointes seront plus delicés et elles formeront une
pointure plus distincte sur le fond de l'œil, que si
ces cones étoient plus obtus: mais ces sortes de vûës
courtes ont un autre défaut fort considerable
qui est qu'elles ne peuvent pas voir les objets
proches fort éclairez à cause que
l'image étant trop grande sur le fond de l'œil
la force de la lumiere y est fort diminué.

Ces vûës courtes qui ont l'ouverture de la
prunelle fort petite et les humeurs troubles voyent
confusement les objets au grand jour et ne
voyent que tres foiblement ceux qui sont dans
l'obscurité: car la retine n'est touchée que tres
foiblement par les rayons lumineux de l'objet.
enfin les plus defectueuses de toutes les vûës
courtes sont celles dont la retine ne sont pas
bien saine, car elles ne voyent pas les objets
éloignés, et elles ne peuvent appercevoir que

tres confusement des objets medrocrement eloignez
comme sont ceux qui nous environnent et
dont nous avons besoin ou que nous devons
eviter pour la conservation de notre vie.

XXVI.
usages des verres concaves pour les vues courtes.

On voit les objets d'autant plus grands qu'on
a la vüe plus courte; en comparant les mêmes
objets a eux mesmes quand on les voit distinctement
par le moyen d'un verre concave. Cet ordinairement
ce qui surprend le plus ceux qui ont la vüe fort
courte, et qui n'ont pas accoutumé de se servir
de verres concaves pour voir des objets eloignez
car ils sont etonnez de voir si distinctement des
objets eloignez en les comparant a les mêmes objets
qu'ils voyoient auparavant si grands mais confu-
sement, d'ou provient que l'on doit voir les objets
moins distinctement, quand on les voit plus petits
comme s'ils etoient plus eloignez de l'œil.

Pour les vües courtes qui n'ont pas la retine bien
saine ni bien delicate, elles ne peuvent tirer presque
aucun avantage des verres concaves: car comme les
verres font plaire contre l'œil approchent les
pointes des pinceaux les unes des autres en les
rendant plus courts, ils en forment une image plus
petite sur la retine, qui ne peut pas en etre touchée
assez sensiblement pour faire une vision nette.

Il nin en pas de meme si lon se sert de deux
verres assemblez dont lun soit convexe et lautre con-
eave; car les rayons ayant passé au travers de ces
verres se trouvent disposez comme il est necessaire pour
entrer dans lail, et pour se reunir sur la retine, et de
plus ils sont detournez de telle maniere, quils y forment
une image beaucoup plus grande quà la vûë simple
qui est tout ce quón pourroit desirer pour le secours
de la vûë, silón pouvoit appercevoir vn grand
espace tout a la fois. si les verres quón joint
ensemble sont tous deux convexes on peut voir
un assez grand champ; mais les myopes tirent peu
de secours de ces sortes de verres dans l'usage ordinaire
de la vie, outre que les objets y paroissent renversez
a moins quón n'assemble trois ou quatre de ces
verres ce qui fait les lunettes d'approche.

XXVII
myopes brevium
& parvis caracteres.

Ceux qui ont la vûë courte brevium ordinairemt
de petits caracteres, et ne peuvent souffrir
les grosses lettres, car il leur arrive a peu prés la
meme chose quá ceux qui ont la vûë bonne
quand ils lisent de prés des grosses lettres comme des
affiches qui sont ecrites en lettres capitales, a cause
quil faut trop remuer les yeux et la teste pour
parcourir peu de mots, ce qui est fort incommode,

car on sçait par experience, que pour etre fort attentif a quelque chose, il ne faut pas remuer la teste, by ideó le dissipans facilement par ce mouvement, et cela a quóy lon pronue ordinairement dans la peinture quand on copie quelque chose, et quón est obligé de detourner la teste de dessus le tableau pour regarder lobjet original.

Pline appelle, hebetiores, ceux qui ont les yeux gros et saillans hors de la teste; mais il ne met pas cette grosseur qui peut oter quelque chose a la viuacité de l'esprit, et n'est a ce qu'il me semble que parceque les plus part de ceux qui ont les yeux fort gros ont ordinairement la veüe courte, et comme ils ne regardent pas attentivement ceux qui leurs parlent, comme je l'ay remarqué cy dessus article 18, on croit qu'ils sont plus stupides que les autres: car on juge ordinairement de l'attention par la disposition des yeux.

Ceux qui ont la veüe courte et qui n'ont pas la cornée fort eleuée doivent auoir le Cristallin fort convexe au moins pour l'ordinaire, et ces sortes d'yeux ne peuvent pas tirer vn grand secours des nerfs Coneaux pour voir distinctement des objets eloignez: car les rayons qui viennent des objets doivent se rompre peu a peu et en trois temps differens

XXVIII. de l'utilité des nerfs coneaux pour ceux qui ont le Cristallin fort convexe.

et a peu prés igaux ; pour faire une reunion
plus parfaite sur la retine et sans y faire paroitre
des couleurs ; et dans cette conformation ou la cornée
est peu convexe ; leur refraction se fera presque
toute a l'entrée et a la sortie du cristallin ; en deux
temps et en moins ; mais cette refraction sera bien
plus grande qui ne faut pour voir des objets bien
eloignez on doit luy oter ce qu'elle a de trop ;
et on ne peut le faire qu'en diminuant en
quelque facon la convexité exterieure de l'œil -
qui est celle de la cornée par l'application
du verre concave, en sorte que la premiere
refraction se peut trouver entierement detruite
et les rayons passant alors au travers du verre
concave et de l'humeur aqueuse qu'on peut
considerer comme un seul corps transparent, sans
souffrir aucune refraction, les trois refractions -
ordinaires se reduisent a deux seulement, et les
couleurs qui sont toujours sensibles dans les grandes
refractions se joignant a la peinture de la peinture
de l'objet eloigné, la vision ne sera pas -
parfaite, on voit la demonstration dans la
figure suivante.

Soit l'œil ABR, avec son cristallin CDEF, et
sa cornée AB. Soit vn objet placé en O, en sorte
que les rayons qui viennent de ce point O, étant
rompus par la cornée comme en A et en B, se
dirigeront dans l'humeur aqueuse en AC, et en BE,
et rencontrant la superficie antérieure CF. du
cristallin, ils se rompent encore et passent dans
le cristallin par les lignes CD, EF, enfin en sortant
du cristallin ils se rompent
pour la troisieme fois et
passent dans l'humeur vitrée
par les lignes DR, FR, pour s'as-
sembler au point R, si l'on
pose maintenant un objet au
point P, dans la rencontre des
rayons CA, EB, prolongés, et si
du centre P on décrit la courbe
GH pour la figure extérieure
du verre dont l'intérieure AB
soit accommodée à celle de la cornée, il est certain
que les rayons qui viendront de l'objet P iront
s'assembler sur la retine au point R. après avoir
passé au travers du verre et des humeurs de l'œil,
comme s'ils venoient du point O, car supposant



comme j'ay deja fait que le nerf et l'humeur aqueuse ne faisoit qu'vne meme humeur et de meme nature, les rayons qui viendront de l'objet P, entreront dans le nerf qui en comme la premiere humeur sans aucune refraction et penetreront jusqua la surface du Cristallin en droite ligne jusques en C, et en E, mais les rayons qui viennent de l'objet P, ne souffriront que deux refractions auant que de s'assembler au point R, et si cet objet P, n'est qu'a vne distance mediocre comme de deux ou trois pieds, qui est celle ou l'on voit distinctement les objets quand l'oeil est bien conformé, il s'ensuit que cet oeil myope reunit les rayons d'un objet placé dans vne distance mediocre apres deux refractions seulement, ce qui est vn defaut puisque l'oeil bien conformé ne les doit reunir qu'apres trois refractions quand ils sont placez a cette meme distance.

Si l'objet estoit plus eloigné que le point P comme en S dans la figure suiuante, il est facile a voir qu'il faudroit que la partie exterieure GH du nerf auoit qu'il faudroit que la partie exterieure concaue, fut plus concaue qu'elle n'estoit quand l'objet estoit au point P, ou estoit aussi le

centre de la concavité du verre, en adire qu'il faudroit que le centre de cette concavité fut plus proche de l'œil comme en K et alors les rayons qui viendroient de l'objet S feroient une refraction en sens contraire a celle qui le doit faire naturellement, car ils seroient plus divergens que s'ils venoient du point S, puisqu'ils doivent se detourner dans le verre et dans l'humeur aqueuse comme s'ils venoient du point P, pour se reunir ensuite sur la retine au point R, en sorte qu'il arriveroit toujours que les rayons ne se feront convergens qu'en deux temps avant leur reunion au point R ce qui fera toujours une vision imparfaite, puisqu'elle en contre l'ordre ordinaire de la nature.



Mais si le cristallin de l'œil d'un myope en a peu près de la même convexité de celuy d'un œil bien conformé, et que tout ce qui rend cet œil myope ne vienne que de la grande convexité de la cornée il en certain d'ailleurs que si les organes de la vision sont bien sains et les humeurs bien transparentes

du verre Concave, donnera a cette vüe tout ce qui luy manque pour la rendre parfaite. Car il est facile a voir, par ce que j'ay dit, que le verre Concave qu'on mettra au devant de la Cornée ne faisant avec l'humeur aqueuse que comme une meme humeur, otera a la Cornée, et par consequent a l'humeur aqueuse, ce quelle a de trop pour faire que les rayons qui viendront d'un objet mediocrement eloigné puissent entrer dans l'œil comme il faut pour s'assembler sur la retine, apres trois refractions, comme dans les vüe bien conformée.

Il faut remarquer que si l'on suppose que la partie AB du verre Concave qui en touche vers l'œil soit accommodé et appliqué immediatement a la Cornée, comme je l'ay supposé dans le cas precedent; il faudra que la superficie exterieure GH soit Concave et non pas Convexe, et qu'elle ait a peu pris la meme Concavité que celle d'un œil bien conformé, car alors l'humeur aqueuse et le verre ne sont considerez que comme une meme humeur.

Mais si l'on se sert d'un verre Concave des deux cotez ou seulement Concave d'un coté et plat de

l'autre alors les rayons feront cinq refractions
auant que de se reunir au fond de l'œil, dont les
deux premieres qui se font sur la cuvre rendront les
rayons incidens plus divergens qu'ils ne sont, et
les trois autres qui se feront dans l'œil les rendront
convergens. ainsi la refraction des rayons d'un objet
mediocrement eloigné se fera dans cet œil d'un
myope en trois temps, comme dans celuy qui est
bien conformé.

Enfin si tout ce qui rend l'œil myope n'est
qu'une trop grande longueur de l'humeur vitrée
qui fait que la retine est trop eloignée du Cristallin
et que les rayons d'un objet mediocrement eloigné
qui se font rompus dans l'humeur aqueuse, et dans
le cristallin de la meme maniere que dans un
œil bien conformé ne peuvent
s'assembler sur la retine, mais
plus proche du Crystallin, le
verre Concave qu'on mettra
au deuant de la Cornée rendra
les rayons un peu plus diver-
gens en entrant dans l'œil
qu'ils n'etoient sans le verre, et ils se rompront

3e pour ceux qui ont l'œil fort long.



toujours en vois temps pour venir jusqua la retine oula vision sera parfaite.

Cette espece d'œil myope na besoin que d'une cornee vers peu concave ; car pour peu quon detourne les rayons en entrant dans l'œil, leur concours s'alonge ou se recule beaucoup.

Cet a ce dernier cas de l'œil myope quon peut attribuer ce que j'ay observé a plusieurs vieillards qui etant bons dans la jeunesse jusqua 20 ou 25 ans sont devenus ensuitte myope et ne pouvoient plus voir les objets eloignez aussi facilement quils les voyoient auparavant quoyquils vissent toujours tres distinctement ceux qui n'etoient eloignez que d'un ou deux pieds. j'en dis donc qu'il est difficile d'attribuer ce changement ou a la cornée qui en est dure et seche de sa nature, ou au crystallin qui est un corps homogene, et qui n'a que des corps liquides qui l'environnent ; mais il me semble que si les muscles de l'œil qui l'enveloppent deviennent plus forts et plus gros qu'ils n'etoient auparavant en bon si les graisses qui sont en assez grande quantité",

dans cette partie viennent a Staugmenter peu a
peu, elles comprimeront le globe de l'aïl par le
coté, et sa figure changeant peu a peu et
devenant plus longue qu'elle n'étoit auparavant.
Sans qu'il arrive aucun changement aux Cornée
ny au Cristallin, la Sclerotique s'éloignera du
Cristallin, et l'aïl deviendra un peu myope.
il se pourroit faire aussi que l'aïl s'allongeroit
par un accident particulier de la membrane
Sclerotique, et même par un effet contraire
a celuy que je viens de rapporter, c'est a dire
par un amaigrissement de l'aïl; car le plus
grande partie des graisses de l'aïl sont placées
au fond entre les quatre principaux muscles,
et si ces graisses viennent a diminuer, les muscles
poussant toujours la Sclerotique par les côtés
ils feront prendre peu a peu a l'aïl une figure
plus longue que celle qu'il avoit auparavant.

Il se peut faire plusieurs Combinaisons
de trois differentes causes qui font l'aïl myope
en les considerant Separées ou jointes a selon,

qu'elles seront plus ou moins grandes, mais je n'expliqueray pas plus au long les differens accidens qui en pourroient arriver puisqu'il sera facile de les deduire de ceux que j'ay donné, si l'on sçait les principes de l'optique comme je le suppose icy.

XXIX. que la grande lumiere offense moins l'oeil myope que les autres, avec une même ouverture de prunelle.

Les myopes qui ont l'ouverture de la prunelle fort grande sont moins choquez par la grande lumiere qui entre dans l'oeil que ceux qui ont la veüe bonne, ou que les presbytes avec une même ouverture de prunelle: car les objets fort éclairez qui nous environnent et qui ne sont pas fort proche de nos yeux, y envoyent des rayons qui se rassemblent sur la retine dans l'oeil bien conformé, et y font une fort petite base dans l'oeil presbyte; et pourquoy ils la touchent trop vivement dans ces deux yeux et y causent de la douleur, ce qui n'arrive pas a l'oeil myope a cause que ces mesme rayons font une base trop grande sur la retine: car toutes choses etant egales l'oeil myope voit toujours les objets plus confusement que l'oeil presbyte, et cette confusion en causé-[illegible] que les rayons qui viennent de

chaque point de l'objet, occupent sur le fond de l'œil.

Il arrive une chose considerable a toutes les vues, mais elle est ordinairement plus sensible a ceux qu'ils ont la cornée fort eleué. on voit un objet qu'on ne regarde pas, et l'on ne voit pas ce même objet quand on le regarde. Cet un paradoxe d'optique.

xxx
il marque sur un accident particulier de ceux qui ont la cornée eleué.

Pour faire cette experience il faut mettre contre la joüe quelque corps plat et noir comme le bord d'un chapeau qui empeche de voir les objets qui sont a coté; a-sans remuer l'œil, il faut tourner la teste auec le corps noir appliqué contre la joüe. tant qu'on apperçoive quelque petit objet blanc qui soit placé contre un corps noir ou brun. alors si l'on arreste la teste ferme et qu'on tourne l'œil seulement vers l'objet blanc, on ne le voit plus.

Cette experience surprend d'abord, mais il est tres facile d'en rendre raison par la conformation de l'œil, car soit l'œil AIK, et le corps noir BL placé proche de l'œil l'objet blanc soit O eloigné de l'œil ouuerture de la prunelle CD, etant d'abord tournée vers M, les rayons qui viendront de l'objet O en

passant par dessus l'objet noir BL, rencontreront
la cornée obliquement en A, et se detourneront
dans l'humeur aqueuse, en sorte qu'ils passeront par
l'ouverture CD de la prunelle et feront une impression
sur la retine en quelque endroit que ce soit, ce qui
fera appercevoir l'objet O, quoyque l'œil ne soit pas
dirigé vers cet endroit. maintenant si l'on fait mouvoir
l'œil sans tourner la teste, il doit tourner a peu près
sur son centre H et par consequent la cornée et
l'ouverture de la prunelle
changeront de position
en s'approchant de
l'obstacle noir BL: ainsi
quand même dans cette
position de l'œil, les
rayons qui venant de



l'objet O, passent pardessus l'obstacle BL pourroient
encore rencontrer la cornée, ils ne pourroient
pas entrer dans l'ouverture de la prunelle EF en se
detournant dans l'humeur aqueuse, d'où il est
evident que quoyque l'œil soit alors dirigé vers
l'objet O, il ne peut pourtant pas le voir.

L'œil myope qui a l'ouverture de la prunelle

avantag. de l'œil myope qui à une petite ouverture de prunelle.

tres petite peut voir distinctement par sa con=
formation naturelle il a donc un tres grand advantage
pardessus celuy qui est bien conformé en ce quil
peut appercevoir de tres petites parties de cet objet
proche, a cause quil le peut voir de plus prés
et quil recevra beaucoup plus de rayons que
l'autre aura une semblable ouverture de la
prunelle; et les pinceaux des rayons qui ont
pour base l'ouverture de la prunelle etant fort
delicz ne laissent pas de faire une peinture
distincte sur la retine, quoy quils ne se rencon=
trent pas exactement dans leur pointe.

XXXII
moyen propres a quelques myopes pour voir les objets eloignez.

il y a des myopes qui peuvent appercevoir
un objet eloigné plus distinctement quils ne
faisoient, en mettant le doigt sur langle exte=
rieur de l'œil, et en tirant les paupieres en dehors,
en les comprimant contre l'os de la temple. par
ce moyen ils font deux choses qui rendent
l'œil plus propre a distinguer les objets eloignez;
car premierement, ils en font la figure un
peu plus platte par la compression exterieure
que causent les paupieres qui sont bandées
et ameme temps ils ne laissent que peu

douuerture ala prunelle entre les paupieres qui sapprochent lune de lautre etant tirees en long.

jauvois encore plusieurs observations considerables a faire sur les myopes; mais comme elles nont rien qui ne luy soit commun auec les presbytes, et auec ceux qui ont la vüe bien conformé je nen parleray qúapres auoir examiné les accidens de laïl des presbytes et de ceux qui tiennent le milieu, et qui ont presque tous les auantages des presbytes et des myopes sans en auoir les defauts ce quón appelle ordinairement une bonne vüe.

De la vüe longue ou foible.

Les presbytes sont ceux qui ne peuuent voir distinctement les objets proches, mais qui voyent bien ceux qui sont eloignez. cependant il y a quelques presbytes qui ne peuuent pas voir bien distinctement les objets eloignez, mais ils les voyent toujours bien mieux que les myopes.

les humeurs de cette espece d'œil ne scauroient faire converger les rayons qu'elles reçoivent comme parallels que dans un point au dela dela retine.

les presbites qui ont louverture dela prunelle fort petite ne scauroient voir un peu distinctement les objets que dans le grand jour; car comme ils ne peuvent pas bien distinguer les objets s'ils ne sont eloignez de l'œil d'une distance d'environ trois pieds, afin que les rayons puissent entrer dans l'œil ~~deux distances d'environ~~ comme parallels entre eux, si l'ouverture dela prunelle est petite, il n'entrera dans l'œil que peu de rayons, qui ne pourront pas toucher sensiblement la retine c'est pourquoy il faut que la grande lumiere recompense en quelque façon la petitesse de l'ouverture dela prunelle. mais l'ouverture dela prunelle pouvant un peu se resserrer et se dilater meme dans ceux qui sont agez, il arrive que cet œil etant au grand jour pour voit plus distinctement ou plus viuement un objet, sa prunelle se ferme plus qu'elle ne voit auparauant, et il perd une partie de l'auantage

XXXIII
les presbytes qui ont une petite ouverture de prunelle.

quil deuroit retirer dela grande lumiere.

On remarque aussi que cet ail, qui ne sçauroit lire quá peine une lecriture de mediocre grandeur ala distance dún pied enuiron, sil le tient fermé pendant quelque tems, et caché de quelque corps obscur, aussitot quil regardera lecriture quil ne pouuoit distinguer qua peine auparauant il la uerra alle distinctement.

XXXIX augmentation dela uüe dans cet ail en le frotant.

Cet auantage ne luy vient que dúne plus grande ouuerture de prunelle qui se perd promptement, car la grande lumiere l'oblige de se refermer presque aussitot mais il y en a une autre qui dure vn peu plus long tems, quand on a detourné l'ail de dessus l'ecriture quón ne peut lire quauec bien grande peine. il faut le fermer et le frotter pendant quelques tems en le tournant et en le comprimant par les costez: par ce moyen on met en mouuement le Sang qui se contient dans les vaisseau qui sont proches de l'ail, dou il arriue que les muscles qui l'enuironnent se remplissent et deuiennent plus gros auant le frottement, on sçait quils peuuent comprimer un peu l'ail par les [illegible] qui luy fait prendre une figure plus

longue qúil nauoit auparauant. ainsi il peut
appercuoir bien mieux les objets proches quilne
faisoit, et comme la figure quil a acquise dan
autant de temps que le sang en en grand mou=
uement, et que les muscles sont plus gonflez
quá lórdinaire, il pourra aussi uoir lóbjet dis=
tinctement pendant un tems assez considerable.

Cést une chose fort rare que ceux qui sont
presbytes deuiennent myopes ou quáu moins ils
puissent acquerir une veüe mediocre et comme
pour voir des objets a une mediocre distance
comme dún pied. cependant il sén trouue quelque=
uns a qui cela arriue apres une maladie
et meme apres quelque fluxion sur les yeux.
ily a plusieurs causes qui peuuent faire cet
effet, les muscles qui enuelopent le globe de
lóeil peuuent le retirer et deuenant plus gros presser
leeil par les cotez et luy donner une figure plus longue,
ou par la cornée qui change de figure en deuenant
plus conuexe ; ou enfin par la membrane sclerotique
qui se retrant par les cotez donne a leeil une figure
plus longue qúelle nauoit auparauant. il seroit
difficile a cet quil me semble, qúil luy arriuat quel=
que changement dela part du cristallin, a cause

XXXV

que les pres=
bytes peuuent
rarement deue=
nir myopes.

qúil ít enuironné des humeurs dont il ne differe qúen solidité de substance, et qúil nă point de muscle auquel il puisse arriuer du changement.

XXXVI. Que les presbytes deuiennent plus presbytes par les maladies.

Il est plus ordinaire que les presbytes deuiennent plus presbytes par les maladies que de deuenir myopes. car toutes les parties se relachent, les muscles s'amaigrissent, et l'œil dant toujours pressé par deuant et par derriere. S'applatit plutot qúil ne s'allonge ainsi ils voyent encore moins de prés qúils ne faisoient auparauant.

XXXVII Des presbytes qui liseni de tres petites lettres a deux ou 3. pieds de distance de l'œil.

Les presbytes qui ont les organes bien sains et sur tout la retine tres delicate et tres sensible eloignent de l'œil les petits objets pour les voir distinctement, ce qui paroit extraordinaire, a cause que l'on est accoutumé dapprocher de l'œil les petites choses qúon veut bien distinguer. ils peuuent lire tres bien de petites lettres a deux ou trois pieds de distance, etant au grand jour ils ne les verroient que tres confusement a un pied car les rayons qui viennent de deux ou trois pieds entrent dans l'œil comme paralleles entre eux, et vont s'assembler exactement sur la retine, ou ils forment une peinture distincte qui fait la distinction des objets. mais comme la vûë diminuë toujours

avec l'age ; ils ne demeurent pas long temps dans cet etat ; car l'œil devenant plus applatis qu'il n'etoit il ne peut plus voir l'objet distinctement sans que les rayons entrent dans l'œil convergens, ce qui ne se peut pas faire par la seule position de l'objet dont ils viennent ; car si ils sont proches ils entrent dans l'œil divergens, et s'ils sont eloignez ils y entrent comme paralleles.

Puisque la retine est assez delicate et assez sensible pour recevoir les impressions des objets, quoyqu'ils soient tres petits, ce que l'on peut connoitre par le calcul suivant, il faut que les filets du nerf optique qui la composent soient tres delicats.

XXXVIII. Calcul de la delicatesse de la retine et de la petitesse des filets qui la composent.

On peut voir facilement a 1000 toises de distance une aisle de moulin a vent que je suppose de 6. pieds de large, et l'œil aussi supposé d'un pouce de diametre, la peinture de cette aisle sera dans le fond de l'œil sur la retine de $\frac{1}{8000}$ de pouce ; car je suppose que les rayons principaux qui viennent des extremitez de la largeur de l'aisle passent par le centre de l'œil, et qu'ils se rencontrent a la retine dans le point de reunion des rayons ce qui ne peut etre que tres peu eloigné de la verité. mais $\frac{1}{8000}$ partie d'un pouce, en vaut peu moins que la 656.e partie [illegible]

et la vne a sa largeur egale a celle de 10 cheueux
mediocres, la largeur qui occupera la peinture de
laisle du moulin a une fois la retine ne sera que
la 66e. partie de celle dun cheueu mediocre, et -
enfin si la largeur dun filet de ver a soye nest que
la huitieme partie de celle dun cheueu, la -
peinture de laile dans le fond de lail ne sera que
la huitieme partie dela largeur dun filet simple de
ver a soye, et par consequent, puisque cette peinture
fait impression sur le nerf optique, et quelle en
distingue dun autre objet qui en est proche, il -
faut tout au moins quun des filets du nerf optique
ne soit que dela largeur de la 8e. partie de celle
dun filet de ver a soye, et ainsi sa grosseur ne
sera que dela 64e. partie de celle dun filet de ver
a soye, ce qui paroit presque inconcevable, puisquil
faut que chacun de ces filets du nerf optique soit un
tuyau qui contienne des esprits.

Si les oiseaux peuuent appercevoir des objets -
eloignez aussi bien que les hommes, ce qui paroit assez
vray semblable par la facilité quils ont de retrouver
- des lieux tres eloignez dou ils sont partis, il faut
quils ayent les filets qui composent le nerf optique
encore plus delicat que les hommes, puis que la

peinture des objets sur leur retine en beaucoup plus petite que celle qui se fait dans l'œil de l'homme, comme je l'ay remarqué au commencement de ce discours.

XXXIX. phenomene particulier du renversement des objets dans les prunelles.

L'œil qui est si foible qu'il ne peut voir distinctement les objets eloignez ny encore moins ceux qui sont proches, lors qu'il regarde une chandelle a 10 ou 12. toises de distance; si l'on fait avancer un corps obscur du coté droit vers l'œil, en sorte que ce corps commence a luy cacher la lumiere de la chandelle, il voit ce corps dans une position renversée, car il luy semble que la chandelle commence a se cacher vers la partie gauche, quoyque le corps soit vers la droite; on ne sauroit attribuer cet effet au renversement de la peinture des objets dans le fond de l'œil, puis-qu'elles se fait aussi bien pour les objets proches que pour ceux qui sont eloignez, et comme nous jugeons toujours par habitude que les objets sont dans une position contraire a celle de la peinture qui se fait sur la retine, il semble que dans ce cas l'ordre de la nature est renversé; puis que par cette experience on devroit conclure que l'objet fait sa peinture dans le fond de l'œil du coté ou il est, ce qui est entierement contraire a toutes les loix

de l'optique et a toutes les Expeviences.

POUR Expliquer ce phenomene il faut Considerer que la chandelle A qui est un petit objet eloigné de l'oeil ne doit etre Considéré que comme un petit lumineux, dont les rayons qui viennent a l'oeil, CGDE et qui entrent par l'ouverture de la prunelle CG apres s'etre rompus dans les humeurs de l'oeil, iroient s'assembler en un point comme H, au dela de la retine, en sorte que les rayons de lumiere forment un cercle



DE sur la retine. mais il faut remarquer que la figure circulaire lumineuse qui se forme sur la retine depend entierement de la figure du trou de la prunelle, qui en est comme la base du cone dont H est le sommet, quoy qu'il soit vray que la figure CDHEG formée par les rayons lumineux qui traversent l'oeil, soit Composée de quatre differens segmens de pyramides, ce qui est facile a voir puis qu'il se fait un segment different dans chaque humeur de l'oeil. cependant quoyque cette figure lumineuse soit composée

de quatre segmens de pyramides; il est euident que les bases de chacun de les segmens seront des cercles, si la base du premier est vn cercle; et si la base du premier est vne figure triangulaire ou quarrée, les bases de tous les autres seront aussi triangulaires ou quarrés, et ainsi de toute autre figure: mais la base du premier segment est l'ouuerture de la prunelle; c'est pourquoy les bases de tous les autres seront des figures semblables a l'ouuerture de la prunelle, ainsi la figure lumineuse DE sur la retine sera semblable a celle de l'ouuerture de la prunelle.

Cet œil dont la retine est touchée dans toute la partie DE juge que la lumiere de la chandelle, est d'une grandeur propre a luy faire cette grande impression, car il ne distingue aucune partie dans cette lumiere, et s'il n'auoit jamais veu la lumiere d'une chandelle de plus prés que 10. ou 12. toises, il ne pourroit point connoi la veritable forme de sa flamme; je dis de plus prés que de 10, ou 12 toises quoyqu'il soit tres certain que cette distance, il doit mieux distinguer la figure de la flamme de la chandelle,

qúa vne distance plus petite mais la figure de cette flamme a vne petite distance se fait mieux connoître acause de sa grandeur, quoyque chaque partie separement soit plus confuse qúa vne plus grande distance.. Laid probyte jugeant donc que la figure dela flamme dela chandelle est fort grande et ronde, comme est louuerture de la prunelle, il en distingue les parties par rapport a limage DE qui le forme sur la retine, et il estime que la partie E de limage, est la partie gauche dela lumiere; et au contraire que la partie D de limage est la partie droite de la lumiere ou dela flamme.

maintenant Laloi met le corps B opaque et noir assi proche de laid vers la droite, en le faisant auancer peu a peu vers le milieu de laid, en sorte que son extremité vienne comme en, b, il est euident que la moitié de louuerture dela prunelle est cachè par ce corps, et quelle nest plus que dune figure circulaire par rapport au point lumineux A; cest adire quil nentre plus dans laid des rayons lumineux que par la moitié de louuerture dela prunelle, laquelle est vers C, ainsi la figure dela lumiere nest plus quun demi cone ou plustost demi cone joint les uns aux autres. la pointure dela lumiere demeurera sur le fond de laid,

~~obscur en mesme~~ sera donc en demi cercle, suiuant
ce que j'ay dit cy deuant, et ce sera vers le coté gauche
D que la lumiere demeurera sur le fond de l'œil ainsi
a mesure que le corps B s'auance de la droite vers la
gauche pour couurir la prunelle limage lumineuse
ED sur le fond de l'œil commence aussi a disparoitre
ou a s'eteindre, en allant aussi de la droite a la gauche
cest a dire de E en I. vers D. mais comme on juge que
la partie E de la peinture de la lumiere est la partie
gauche, et que D en la droite, on voit que la
lumiere commence a disparoitre du coté gauche qui
est opposé a celuy ou est le corps opaque B.

Quoyque le corps B intercepte les rayons de
la lumiere du coté de E ou il est placé, il ne laisse pas
pour cela de faire sa peinture en DF dans la partie
gauche de l'œil suiuant les loix de l'optique, puis qu'il est
placé au dehors en B vers la droite; comme pour cy la
peinture de ce corps obscur s'auancera sur le fond de
l'œil dans vn sens contraire a celuy de dehors, et si ce
corps est placé a la droite en B, et qu'il s'auance vers
le milieu de l'œil en b, sa peinture se fera en FD a
gauche dans le fond de l'œil, et s'auancera vers la droite
on verra donc d'abord une penombre qui paroitra sur
limage de la lumiere en s'auancant [illegible]

le corps obscur, car sa peinture ne sera dans le fond de l'œil dans vn sens contraire: mais aussitost que l'extremité du corps obscur sera paruenuë dans le rayon; AG; qui est le premier qui entre dans la prunelle, l'image ronde de la lumiere commencera a disparoitre du coté opposé, comme ie viens d'expliquer.

XL. ce qui arriue a l'œil myope par la meme cause.

Il n'arriue pas la meme chose a l'œil d'vn myope quoyque l'image de la lumiere A soit tres grande dans le fond de l'œil, et qu'elle soit de la meme figure que l'ouuerture de la prunelle, car le concours H des rayons lumineux qui viennent vers l'œil comme paralleles entre eux, se faisant au dedans de l'œil, ils doiuent rencontrer le fond de l'œil en ED, qui sera la base d'vn cone opposé a celuy qui est formé par le concours des rayons dans l'œil; et les cones opposez auront leur sommet commun au point H; ainsi la partie E de la base lumineuse, laquelle est a gauche dans le fond de l'œil, appartient au rayon AG, qui est a droit, on jugera donc quand le corps B touchera ce rayon, que ce sera la partie droite du corps lumineux qui en sera touchée, et a mesure que ce corps s'auancera vers le milieu de l'œil, en b, l'image



dela lumiere commencera a diminuer du coté gauche E, en allant en L vers D, ce qui fera juger que ce corps B obscurcit la lumiere suivant lordre naturel, le corps B ne fera point de penombre comme dans laïl dún presbyte, car quand son extremité B, touchera le rayon AG, la peinture de cette extremité sera formée au point E sur la retine, et il verra distinctement ce corps B, dont toute la peinture sera en FE, qui saparera sur elle dela lumiere ED suivant lordre naturel quoy quelle paroisse fort grande.

Les presbytes sont sujets a avoir des taches, des filets, et comme des mouches volantes qui sont toujours devant les yeux, mais principalement lorsqu'ils regardent un objet blanc ou fort clair. Les taches ne sont pas toutes de meme nature, il y en a que j'appelle permanentes a cause quelles ne changent pas de place aleguard de laxe dela vision, car on les voit toujours dans le meme endroit par rapport au point de lobjet quon regarde attentivement et quelquefois elles sont dans ce meme point et par consequent dans laxe dela vision, les autres sont flotantes et changent continuellement de place.

XLI. Des taches et mouches volantes qu'on voit toujours devant les yeux

Les unes et les autres de ces taches noir par une figure constante, et de plus les premiers ne sont que comme des taches obscures faites sur un corps blanc, et les derniers paroissent comme les nauds du bois de Sapin qui sont coupé sur une planche; elles-



ont une partie fort claire, qui est environnée de filets noirs et on y voit souvent plusieurs fils noirs irreguliers qui les accompagnent avec des espece de fils posé en differentes manieres dont le milieu paroit fort clair, et les deux bords obscurs comme on le peut voir dans cette figure. on trouve souvent des morceaux de verre et de glace de miroir qui ne sont point encore polis qui font voir des apparences toutes semblables quand on les expose aux rayons du soleil, et quon recoit sur un papier blanc les rayons qui ont passé au travers.

Cette experience m'a été d'une tres grande utilité pour reconnoitre de quelle facon se formoient la seconde espece de taches qui paroissent sur les objets comme je le dirai dans la suitte.

Les taches que j'appelle permanentes se font voir tout d'un coup, et sont ordinairement rondes, et quand on tient l'œil fixement attaché sur quelque partie d'un objet blanc on les voit aussi sur ce meme objet sans qu'elles changent de place, comme si l'œil en attaché a Considerez la lettre A qui on ecrite sur un papier blanc, on voit la tache comme en B, et elle accompagne toujours a meme distance, et dans le meme endroit cette lettre quon regarde attentivement, il y a de ces taches qui demeurent pendant toute la vie quelques unes ne durent que quelques mois et quand elles se dissipent on commence a s'apperceuvoir que le milieu se eclaircit, et cette partie claire s'augmentant peu a peu, elle s'etend vers l'un des bords et ne laisse plus qu'une partie de la tache en forme de croissant irreguliere, qui devenant de jour en jour plus foible se dissipe enfin tout a fait.

Il est certain que ce qui forme ces taches est avancé en quelque endroit dans l'œil, puisqu'elles paroissent toujours dans le meme place à l'égard de l'axe de la vision, il faut donc examiner en quel endroit il peut être avancé -

je dis que ce ne Scauroit etre dans lhumeur aqueuse, car les rayons ne paroitroient pas terminés par les bords a cause que les rayons qui entrent dans l'oeil par les côtés, empecheroient que l'obscurité ou lombre du corps qui forme les rayons ne fut terminée; ce ne Scauroit etre non plus sur la surface ny au dedans du cristallin, ny dans lhumeur vitrée pour la meme raison, outre que dans ces deux dernieres humeurs qui sont d'une consistance assez solide, il seroit difficile quil se put former un corps etranger et presque en un moment.

Il ne reste donc plus que la retine ou elles le puissent former, car aussi par un accident qui peut facilement luy arriver que je pretends rendre raison de cette apparence, on Scait que la retine est semée de plusieurs vaisseaux sanguins qui sont assez considerables, et il arrive quil se fasse un epanchement du sang de quelqun de ces petits vaisseaux sur la retine, il est certain que la partie ou ce sang s'etendra, ne pourra plus recevoir comme auparavant les impressions des objets, et pourquoy il paroitra une tache obscure sur tous les objets qu'on regardera et elle aura la figure terminée par celle de l'epanchement du sang

cette figure sera a peu près ronde ; car les rayons qui partent dun point s'etendent ordinairement en rond. ce sang extravasé se dissipe peu a peu dans la fuitte, comme il arrive aux autres parties du corps, et ainsi cette tache se dissipe aussi peu a peu, et enfin elle s'evanouit, mais quand les taches demeurent toujours, il faut que l'endroit de la retine ou elles sont soit affecté de telle maniere qu'il ne puisse plus se retablir. ces taches sont plus sensible a ceux qui ont l'ouverture de la prunelle fort petite, et surtout a ceux qui sont presbytes ou myopes ; mais plutot aux presbytes, qui ont ordinairement l'ouverture de la prunelle petite, car les impressions des objets sur la retine sont d'autant plus foibles, que l'ouverture de la pb prunelle en plus petite, et que la base des rayons qui partent de chaque point de l'objet en plus eloignés de son point de concours, comme il arrive a ceux qui sont fort presbytes. il arrive aussi que si l'œil presbyte se sert d'un verre convexe un peu fort pour voir les objets, la tache qu'il voyoit auparavant ne paroit presque plus, car par le moyen de ce verre il entre beaucoup de rayons dans l'œil, qui allant s'assembler autrement sur la retine la tache [illegible]

pour y faire vne impression sensible au travers
du sang extravasé.

XLIII
de la seconde espece des taches.

Il est plus difficile d'expliquer comment la forme
la seconde espece de taches avec ce qui les accompagne
ordinairement. j'ay dit cy devant que l'expérience que
j'avois faite de quelques morceaux de verre, m'avoit
beaucoup servi pour trouver la cause de ces sortes de
taches; quand on fait la verre il s'y rencontre souvent
de petits morceaux, comme des grains et des filets
d'une matiere transparente, mais toute differente du
reste, en sorte qu'elle fait vne refraction differente de
celle du verre dans laquelle elle est enveloppée. Ces
grains et ces filets étant ordinairement d'une matiere
trés dure, ils ne se fondent pas aussi facilement
que le reste; et pourquoy ils ne s'y mêlent pas
entierement, et il reste vn petit noyau tant dans les
grains que dans les filets. et comme ils ont du
rapport aux corps trés durs ils font vne plus grande
refraction que le reste; et par consequent les rayons
ayant passé au travers, font leur foyer plus court
que celuy de la matiere dans laquelle ils sont
repandus. ainsi en considerant tout l'œil comme s'il
estoit rempli que d'une seule humeur, et que la
forme de cet œil le rendit presbyte, on voit clairement

que les rayons de lumiere qui passeront au
travers des grains et des filets de matiere plus dense
feroient leur foyer a peu pres sur la retine, ou il le
feroit un point, comme il paroit quand on expose
au soleil un verre convexe qui fait son foyer
lumineux dans le milieu dun ombre tres forte
dont il est environné.

Ces taches et ces filets ne demeurent pas
toujours dans la meme place, on les voit changer
de position sur les objets quon regarde suivant
les differens mouvemens de l'œil, et quand il les
rencontre dans l'axe de la vision, si lon detourne
l'œil le plus qui est possible a droit ou a gauche
elles s'ecartent aussitot. on remarque encore que
lorsqu'on tient la tete droite, et qu'on regarde
quelque objet a meme hauteur que l'œil. on voit
descendre les taches peu a peu. pour expliquer
toutes ces apparences, je dis que les grains et les filets
qui forment les taches, doivent necessairement flotter
dans une des humeurs de l'œil puisqu'elles changent
de place si facilement, et il faut que la matiere
dans laquelle ils nagent ou flottent soit fort liquide
car pourquoy ce ne peut etre que dans l'humeur
aqueuse; les grains et les filets qui forment ces-

taches etant transportés en différens endroits des objets
qu'on regarde par rapport a la vue de la vision. mais
il faut remarquer, que quand l'œil est en repos, on
devroit les appercevoir qui s'éleveroient sur les objets -
et on ne les verroit pas descendre comme il arrive
ordinairement a cause du renversement de la peinture
sur la retine et que j'explique en cette sorte.

Si l'œil doit bien conformé, en sorte que les rayons -
des objets posés a une médiocre distance, s'unissent
sur la retine, il est certain que cet œil ne verra
que quelque ombre legere, quoyqu'il y eut des grains
et des filets dans l'humeur aqueuse; car les corps -
étrangers ne feroient qu'intercepter quelques rayons -
de ceux qui viendroient des objets, et qui n'empe-
cheroit pas que la plus grande partie ne fit son
foyer sur la retine, et leur image y etant bien peinte,
la vision ne paroitroit pas interrompue par ces -
obstacles, de la meme maniere que les objets se
representent distinctement dans une chambre obscure
par le moyen d'un verre convexe quoyqu'on ayt
fait sur ce verre plusieurs taches et traits avec
de l'encre; et si ce meme verre avec ces taches -
et le objectif d'une lunette, on ne laisseroit pas de
bien voir les objets, mais il paroitroient un peu obscurs

a cause quune partie des rayons seroient empechés par les taches. il nen seroit pas de meme si ces taches etoient sur le verre oculaire. car elles paroitroient toutes sur les objets quoyqu'elles soient tres delicées, et sur tout si louverture du verre objectif etoit fort petite. il arrive presque la meme a l'oeil presbyte qui a louverture de la prunelle fort etroite que lon peut comparer en quelque facon a louverture du verre objectif dune lunette; et les corps etrangers qui forment les taches, etant proche du cristallin - et le touchant feront a peu prés le meme effet que les traits et taches dancre sur le verre oculaire dela lunette; car lombre des grains et des filets - sera sensible sur la retine autant le concours des rayons.

Ces taches demeurent alte constamment dela meme figure; car on ne sapperceoit pas ordinairement quelles changent quapres plusieurs heures, et quelquefois dun jour a lautre. mais ce quil y a de plus considerable, est leur mouvement propre; car lors quon tient loeil finement attaché sur quelque objet clair, sur tout apres avoir remué loeil promptement vers differens coté, on voit que ces taches descendent sur les objets; il faut donc quil leur

arrive le contraire dans l'air, puis que la peinture des objets sur la retine en toujours dans une position contraire a celle ou nous la jugeons. j'ay dit cy-devant que les corps etrangers qui formoient les taches, faisoient un foyer plus court que celuy de la matiere dans laquelle ils nageoient: mais il n'est pas adire pour cela qu'ils soient plus pesans que cette matiere. au contraire ils peuvent etre plus legers, et faire plus de refraction, quoyque quils soient plus gras, comme la plupart des huiles, par rapport a l'eau; ainsi lorsque les corps sont agitez dans l'humeur aqueuse par un violent mouvement de l'air, ils sortent hors de leur position naturelle, qui est le haut. mais ensuitte quand l'air est en repos ils y remontent peu a peu, et par consequent doivent voir les taches qui descendent sur les objets, et quand les corps etrangers qui sont ordinairement auprez du crystallin le font arreter en quelque endroit, on voit les taches permanentes en cet endroit tant que on ne remue pas l'air.

XLIV. Experiences sur les refractions.

J'ai fait les experiences suivantes pour m'assurer des refractions des huiles par rapport a l'eau et a

l'air. on a fait vn tr̃s grand nombre d'experiences
sur la refraction du verre qui sera inutile de les
repeter, on ne peut donc prendre que le sinus de
l'angle d'incidence dans l'air, et au sinus de l'angle
de refraction dans le verre, comme 3. a 2. ou bien
comme 60 a 40, celles qu'on a faites dans l'eau en-
auſſi fort certaine, et l'ayant faites plusieurs fois
avec le meme vase qui m'a servi a faire les
autres, je l'ay trouvé a l'ordinaire de 4. a 3. ou de
60 a 45. celles que j'ay faites avec de l'esprit de
vin tres bien rectifié m'ont donné le sinus de l'angle
d'incidence a celuy de refraction, comme 60. a 44.
ce qui approche fort de celle de l'eau. enfin celles
que j'ay faites avec de l'huile d'olive fort legere
m'ont donné la proportion des sinus comme 60. a 42.
ce qui en vn peu plus proche de celle du verre
que de celle de l'eau, quoyque l'huile soit bien
plus legere que l'eau et que le verre soit plus
pesant.

Les Corps etrangers qui s'engendrent dans — XLV.
l'humeur aqueuse et qui font la seconde espece
des taches dont je viens de parler forment auſſi les
caracteres quand il s'en trouve vne grande quantité,

et quils sarretent les uns aux autres; car il sen fait
vn tissu Epais qui empeche la lumiere de passer;
ou sils la laissent passer elle en est fort foible, quelques
croyent que les Cataractes viennent des pellicules
dont le crisstallin est formé, quand celles qui sont
du coté de lhumeur aqueuse, deuiennent opaques
et sendurcissent; et ils apportent pour raison, que
tous ceux a qui l'on abbat des Cataractes, ont
besoin dun verre fort convexe pour voir distinctement
les objets apres l'operation, quoyquils voyent fort bien
sans lunettes ou verre convexe auant que la
Cataracte se fut formé. car ils disent que cette
pellicule qui faisoit partie du Crisstallin en estant
detachée le rend bien moins convexe quil netoit aupa-
rauant, et par consequent quil faut suppleer par-
dehors a ce deffaut, en mettant au deuant de l'oeil
vn verre convexe, et que si la Cataracte venoit
seulement de quelques corps etrangers formez dans
lhumeur aqueuse, lorsque les corps seroient detournez
de deuant louuerture de la prunelle, on deuroit voir
les objets comme on les voyoit auant la Cataracte,
l'oeil nayant pas changé de figure. toutes les raisons
sont fort bonnes, mais il en faut dire repondre par

ce que appris dun tres habile operateur. il dis- quil- on impossible de faire cette operation sans quil sorte beaucoup de lhumeur aqueuse par la piqueure, et cest ce qui me fait croire que la foiblesse de vüe que lon remarque a tous ceux aqui on a abbatu des cataractes, ne vient que de cet epanchemẽt qui rend l'œil plus plat quil netoit auparauant. je ne fais pas de doute que lorsquon fait loperation a des jeunes gens, l'œil ne se retablisse dans son premier etat apres quelque temps, puisque nous avons des experiences que lhumeur aqueuse ayant été tirée de l'œil de quelques animaux et l'œil paroissant tout flestri, peu de tems apres il soit retabli dans son premier etat.

Lorsquon a fait quelque effort ou en eternuant avec violence, ou en se mouchant fortement, on voit des etincelles de feu qui paroissent sortir dun cote et d'autre sur les objets. jay vu aussi une personne a qui il en paroissoit de semblable apres avoir regardé quelque temps un ciel fort clair avec grande attention; cet accident parut d'abord surprenant et il donne de la frayeur; car lon a des exemples de quelques personnes qui ont perdu la vüe apres des accidens a peu près semblables. XLVI des etincelles de feu.

On ne peut pas rechercher la cause de ce phenomene
en d'autre endroit que dans la retine; que l'on regarde
toujours comme le principal organe de la vision; —
mais comme nous ne pouvons pas connoitre ce qui
luy arrive avec autant d'evidence que aux autres nerfs
qui sont repandus dans quelques parties de notre corps,
nous n'en pouvons juger que par comparaison. —
quand on a tenu long temps le bras ou la jambe
dans une posture contrainte, la main et le pied
deviennent engourdis, et si les parties demeurent —
toujours dans la meme disposition on sent dans cet
engourdissement des elancements comme si on —
piquoit la chair en differents endroits ce qui cause
une douleur fort considerable. on sent aussi la
meme chose quand on recoit quelque coups aux
extremités du corps, et si l'oeil en blessé dans les
parties exterieurs on se persuade voir une grande
quantité d'etincelles de feu. il est facile de juger que
tous ces accidents viennent de la meme cause,
et que le cours des esprits etant interrompus dans les
nerfs, et coulant ensuitte par reprises et secousses, —
nous fait sentir dans les chairs des piqueures violentes
et dans l'oeil nous fait voir des etincelles de feu, les —

nerfs etant ebranlez de la meme maniere que si
les piquures etoient reelles, et si le feu etoit present.
ainsi en eternuant ou en se mouchant avec violence,
on ebranle tous les nerfs qui sont repandus dans
la teste, en sorte que bon sens fait sonner dans ce
meme moment ou une violente douleur de teste ou
une douleur d'oreille qui se dissipe promptement,
et l'on voit aussi des etincelles de feu qui se repandent
d'un coté a d'autre, mais qui ne durent au plus qu'une
demy minute. pour ce qui est des etincelles de feu -
qu'on voit apres avoir regardé quelque temps le ciel
fort eclairé je les compare aux piquures qu'on sent
dans les gouttes et sereine des mains ou des pieds.

L'oeil presbyte reçoit de bien plus grands avantages XLVII.
De l'usage des verres convexes pour l'oeil presbyte.
de l'usage des verres convexes, que l'oeil myope n'en
retire des verres concaves, un des plus considerable
est la grande quantité des rayons que les verres
font entrer dans l'oeil, en les detournant comme il
est necessaire pour faire une peinture distincte
sur la retine, car l'oeil presbyte n'ayant les humeurs
conformées que pour reunir au dela de la retine,
les rayons qui viennent a luy d'un objet proche,
il faut que les memes rayons entrent convergens

dans l'œil afin de pouvoir le reunir sur la retine.
or la proprieté des verres convexes etant de reunir
les rayons apres qu'ils ont passé au travers, il s'ensuit
que les rayons qui viennent d'un objet proche
apres avoir passé au travers d'un verre plus ou moins
convexe sont disposés en entrant dans l'œil pour
concourir sur la retine. mais lorsque les rayons ont
passé au travers du verre convexe, ils occupent moins
d'espace qu'ils ne faisoient auparavant, puisqu'ils
sont disposés pour concourir en un point; en pourquoy
l'ouverture de la retine en reçoit beaucoup plus apres
qu'ils ont passé au travers du verre convexe, que
s'ils n'y avoient point passé; et comme la plupart
de ceux qui y sont ~~passé~~ presbytes ont l'ouverture de
la prunelle fort petite, il s'ensuit que les presbytes
recoivent un double avantage de l'usage des
verres convexes, puisque par leur moyen la
peinture des objets en distincte sur la retine, ~~puisque~~
par ~~leur moyen~~ et aussi vive que s'ils avoient
l'ouverture de la prunelle fort grande.

La quantité des rayons qui entrent dans l'œil
rendent l'image plus vive et plus sensible et
[illegible] que le verre convexe est plus éloigné

de l'œil. mais il faut remarquer qu'un même objet
verre convexe ne peut pas servir pour un même œil
a toutes sortes de distances de l'œil et de l'objet, par
exemple, si la lentille ou verre convexe AB est placée
a une certaine distance de l'œil pour faire que les
rayons qui viennent de l'objet O s'etant rompus dans
ce verre, et ayant ensuite passé dans l'œil par -
l'ouverture de la prunelle CD aillent peindre sur la
retine en a j cette même lentille etant plus éloignée
de l'œil et etant placée comme en ER, les rayons -
qui viendront du même objet O après avoir passé
par ce verre, et par les humeurs de l'œil ne pourront
plus se reunir sur la retine.
Car si nous supposons que le verre
est placé en AB, et que les rayons
qui viennent de l'objet O puissent
concourir ou faire leur foyer dans
l'œil au point F, lorsque ce même
verre sera placé en ER, le point F.
ne sera plus le point de concours -
des rayons qui venant du point O,
de l'objet, se rompent dans ce verre,
sortis dans un cas seulement au la- à



au point O, ou la meme que celle de AB au point F, mais par tout ailleurs le foyer etant plus proche ou plus loin de l'oeil que le point F, les rayons qui entreront dans l'oeil feront des pions pour conconrir plus proche ou plus loin que le point F; lor l'oeil dans toujours dans le meme endroit, il faut que les rayons qui doivent conconrir sur la retine, tendent au point F auant que dantrer dans l'oeil, cen pourquoy ils ne feront pas sur la retine une peinture distincte de l'objet.

mais si l'on place un autre verre en ER, ou= sorte que sa figure soit propre pour faire que les rayons qui viennent du point O conconrent au meme point F ou le verre AB, les faisoit conconrir auparauant; il en endent que ce verre les detournera comme il faut pour faire une peinture distincte sur la retine, mais il y aura encore cet auantage cuil entrera dans l'oeil par le moyen de ce verre ER beaucoup plus de rayons quil nen entroit par le moyen du verre AB, car les lignes FC, FD, qui comprement tous les rayons qui peuuent entrer dans cet oeil pour faire une peinture distincte occupent plus de place sur le verre ER que sur le verre AB

et ER etant plus proche de lobjet O, que AB langle EOR, qui contient tous les rayons qui joignent en tres dans lail apres auoir passé par le uerre ER. en beaucoup plus grand que langle AOB.

Ce nest pas icy le lieu de determiner quelle doit etre la conuexité du uerre, la distance de lobjet a lail, et du uerre a lail etant donné dans une conformation de lail qui soit determinée, il suffit seulement de remarquer que si lobjet est fort eloigné, et que le uerre etant eloigné de lail de deux ou trois pieds au plus, on peut le voir au trauers les objets distinctement, on les uerra beaucoup plus grands que la uüe simple, et plus lail sera presbyte plus limage sera grande, ensorte que par le moyen dun seul verre convexe lail presbyte recoit le meme auantage que dune petite lunette composée de deux convexes verres. voicy de quelle maniere se fait cette augmentation.

XLVIII

Je considere lail comme etant dune matiere homogene qui est propre auec la figure spherique a faire que des rayons ordonnez qui tendent en un meme point proche ou eloigné en entrant dans cet ail, puissent conecurir au fond.

Soit donc l'œil CHCD de figure Spherique dont K soit le centre et le verre convexe ER placé a deux pieds de l'œil ayant son foyer absolu a la distance F1. C'est a dire que les rayons qui tomberoient comme paralleles entr'eux en rencontrant ce verre, iroient concourir vers la ligne F1. qui en plus eloigné du verre que l'œil, CD GH. posons maintenant que cet œil ne puisse faire concourir par son fond GH des rayons qui soient comme paralleles entr'eux a moins qu'ils ne tendent a des points de la ligne F1. s'il y a donc quelque objet TV, dont les rayons TE, TS, qui viennent du point T soient comme paralleles entr'eux et VR et VS, aussi paralleles, les quels viennent



au point V les ~~rayons~~ rayons ayant passé au travers du verre iront s'assembler au point I. et F sur leur rayon principal TSI. et VSF, qui passe par le centre du verre. Les deux rayons TS, VS comprennent l'angle TSV sous lequel on voit cet objet qui est compris entre les extremités T et V; car on ne tient point compte de la distance qu'il y a de l'œil au verre par rapport a l'objet, et qui fait que l'angle TSV est

ou un peu plus grand que celuy sous lequel on
verroit lobjet sans linterposition du verre si ces
rayons parallèles ayant passé au travers du verre
et etant devenus convergens vers les points I. et F,
rencontroient laxil ils le detournent pour aller s'assembler
sur le fond GH, mais tous les rayons qui entrent
dans laxil et qui tendent vers les points I. et F, doivent
s'assembler sur celuy qui passe par le centre K de
laxil qui doit etre considéré comme le principal
par rapport a laxil, en sorte que les rayons IK, FK,
qui rencontrent le fond de laxil en H et en G, ou le
fera la peinture des points T et V de lobjet; il est
facile a connoitre que langle HKG ou IKF sous
lequel on voit lobjet apres que les rayons ont passé
au travers du verre, est plus grand que langle ISF ou
TSV sous lequel on le verroit a la vüe simple puisque
dans les deux triangles FKI, FSI, le sommet K est plus
proche de la base comme IE que le sommet S,
et de plus langle TSV est un peu plus grand que TKV
qui seroit celuy sous lequel on verroit lobjet a la
vüe simple, les rayons principaux qui viendroient
a laxil des points T et V de lobjet, passeroient par le
centre K de laxil. Je ne tiens pas compte de la confusion
de limage a cause que laxil est presque, et qu'il ne

XLIX. Des presbytes qui ont la cornée fort conuexe.

Ceux qui sont presbytes, et qui ont la cornée fort conuexe doiuent auoir le cristallin fort plat, mais ils ne laissent pas de voir les objets fort distinctement en se seruant dun verre conuexe pour mettre au deuant de loil. Car ce verre conuexe detournant les rayons pour les faire conuenir en un poinct, ils rencontrent les humeurs de loil qui les detournent encore du meme sens et en trois temps differents, ainsi les rayons qui entrent dans loil se rompent du meme sens en quatre ou cinq tems differens; ce qui ne rend pas la vision moins distincte; car quoyque les refractions qui se font a lentrée de lhumeur aqueuse sur la cornée, la vision ne laisse pas detre distincte, les rayons rompus ne faisant pas des angles trop aigus, comme il arriueroit si-
toute la refraction des rayons se faisoit en deux
temps seulement.

Il seroit difficile, pour ne pas dire impossible
quun oeil fut presbyte ayant le cristallin fort
conuexe, car comme il se fait toujours deux
refractions sur le cristallin lorsque les rayons
[illegible] en sortent, et quil faut aussi-

que la figure delacornée soit convexe pour — faire mouvoir a elle de tout l'œil, il se fera ~~toujours~~ toujours trois refractions dont deux etant fort grandes l'œil sera plutot myope que presbyte. il se pourroit pourtant faire que l'humeur vitré seroit en si petite quantité que le cristallin touchant presque au fond de l'œil, les rayons ne pourroient pas convenir sur la retine ala sortie du cristallin, a cause quil ny auroit pas assez de distance; mais cet accident est fort rare, et il lest encore plus quun œil nayt point d'humeur vitré; et que le cristallin touche ala retine, ce qui se pourroit trouvé dans — quelques sujets et surtout dans des cheveaux, mais il nest pas possible dans des conformations si extraordinaires, que les organes de la vision soient demeurez bien sains; sur tout la retine si elle touche au cristallin.

De la vüe parfaite.

Ceux quon dit avoir bonne vüe voyent distinctement les objets a un pied de distance ou meme plus pris, de meme que ceux

eloigne. il semble que puisquils voyent distinctement
les objets fort eloignez, ils deuroient etre presbytes, car
on ne met pas dautre difference entre les presbytes et
les myopes, sinon que ceux cy voyent bien
les objets proches et ne voyent pas ceux qui sont
eloignez; au contraire ceux la voyent bien les
objets eloignez et ne voyent pas ceux qui sont
proches, car pourquoy si ceux quon dit auoir une
veüe parfaite voyent distinctement les objets eloignez
ils doivent etre mis au nombre des presbytes, et ils
ne doivent pas bien voir les objets proches. il est vray
que si lon donne le nom de presbytes a ceux dont
la conformation de l'œil est propre pour rassembler
sur la retine les rayons qui y entre comme
paralleles entre eux, et qui viennent par conse-
quent des objets fort eloignez, il sensuit que celuy
qui a la veüe parfaite comme je l'etablis, doit
aussi etre appellé presbyte en ce sens. mais
par les noms de myope et presbyte, on entend
deux excés opposez et par le nom de veüe
parfaite on entend celle qui tient le milieu entre
ces deux extremes. ainsi la veüe parfaite ne
dispose beaucoup dune des especes de myopes

et de presbyte. il faut seulement remarquer que la distance de trois pieds environ doit etre consi-
derée comme une tres grande distance, et l'un
œil presbyte ne peut pas voir un objet placé a cette
distance, il ne verra pas non plus ceux qui sont
plus eloignés.

Mais comme toutes les vûës peuvent bien
distinguer des objets un peu plus ou un peu moins
eloignés, celuy qui aura la vûë propre pour
voir distinctement les objets a deux pieds de distance,
les verra bien encore a un pied et a trois pieds et
par consequent il verra bien ceux qui sont tres
eloignés, qui est ce que j'appelle icy une vûë
parfaite. mais celuy qui aura la vûë propre
pour voir tres distinctement un objet a quatre
pieds de distance, il verra aussi assez bien celuy-
qui sera a trois pieds; mais il verra un
peu confusement celuy qui sera a un pied, il
plus confusement encore celuy qui sera plus
proche, il pourra voir distinctement ceux qui
seront plus eloignés que quatre pieds a quelque
distance qu'ils soient placés; qui est ce que j'ap-
presbyte, et ceux qui sont fort presbytes ne voyent
que tres confusement les objets qui sont placés a une

LI.
trois cas
differens qui
font les trois
sujets de vûë
dont on parle
icy.

mediocre distance, il ne voyent pas distinctement les objets eloignez quoyqu'ils les voyent mieux que ceux qui sont proches, au contraire celuy qui a l'œil disposé pour voir tres distinctement a vn demy pied de distance, pourra voir aussi bien vn objet eloigné seulement de trois ou quatre pouces et d'vn pied à peu prés mais il ne verra pas ceux qui seront plus eloignez, et c'est ce que j'appelle myope, et ceux qui sont fort myopes ne sauroient voir distinctement les objets s'ils ne sont tout proche de l'œil. Cette latitude de veüe vient en partie de ce que l'on peut etrecir ou elargir l'ouverture de la prunelle suivant que les objets sont proches ou eloignez de l'œil ce que j'examine fort au long dans la seconde partie de ce traité ou je donne la maniere de mesurer exactement la force de la veüe, en demontrant que l'œil ne change point de conformation pour regarder tant vers l'autre des objets proches et d'autres que les eloignez.

VI. De la bonne veüe dont l'ouverture de la prunelle est petite.

Il y a des veüs parfaites comme je les appelle qui ont la retine tres delicate et tres sensible qui peut et souffre la grande lumiere: celles qui y sont accoutumées a l'ordinaire lon-

nature dela prunelle, quand il le presente quelque
objet midiocrement eclairé et par cette habitude
lóuverture dela prunelle ne ordinairement une fois
petite. les soties de vüis quoyque tres bien conformées
d'ailleurs ne sauroient voir distinctement de petits
objets, ils ne sont exposés aux grands jours, afin que malgré
la petitesse dela prunelle il entre encore assés de rayons dans
l'ail pour faire une impression sensible sur la
retine, quoyqu'elles ne soient pas presbytes elles ne
laissent pas dele paroître, car elles sont obligés de le
servir de lunettes conuexes pour voir de petits objets
comme les presbytes, mais ce nest pas pour en detour-
ner les rayons; entorte qu'ils fassent leur foyer sur la
raine, mais seulement pour en faire entrer une plus
grande quantité dans l'ail; car les verres conuexes
ont ces deux proprietés toutes ensemble, comme je
l'ay remarqué cy dessus en parlant de leur usage. mais
il semble que les soties de vüis parfaites qui se servent
de verres conuexes pour faire entrer plus de rayons
afin d'en voir l'objet plus distinctement, en deuroient
receuoir vn tres grand desauantage, puis que les rayons
seroient detournés de telle maniere qu'ils ne concourre-
roient plus sur la retine de cet ail parfait a qui-
doit tout l'on arriuer puisque ces deux effets des
verres conuexes sont inseparables, mais on remedie

faitement a ce dessus en approchant un peu l'œil de l'objet. on en peut faire l'experience en prenant un livre fort ouvert, et en regardant au travers quelque objet, lors on trouvera une distance de cet objet a l'œil, ou lon verra toutes les petites parties fort distinctement.

j'ay vû une personne qui avoit l'œil de cette espece et qui etoit obligé de se servir de lunettes convexes pour voir de petits objets, il luy survint un jour une grande inflammation aux yeux, et il remarqua qu'il pouvoit dans ce temps la voir fort distinctement de tres petits objets sans le secours des lunettes convexes; mais quand il commencoit a regarder les objets eclairez il souffroit une grande douleur, qui diminuoit un peu dans la suite. il est facile d'expliquer cet effet par ce que j'ay dit cy devant. lors l'inflammation de ces yeux ne laissant pas la liberté au muscle de la prunelle de la fermer a l'ordinaire, il entroit alors dans l'œil une tres grande quantité de rayons pour rendre la vision fort distincte, les organes etant point malades. la grande douleur qu'il sentoit d'abord venoit de l'impression de ces rayons sur la retine qui [illegible] blessée avec une trop grande violence,

et de l'effort qu'il faisoit au muscle de la prunelle pour la fermer comme a son ordinaire, ce muscle etant affligé par l'humeur qui causoit l'inflammation. mais cette douleur diminuoit ensuite un peu car ce muscle ayant fait son effort demeuroit dans la meme disposition, ce qui est semblable a ce qu'on eprouve quand on veut remuer quelque partie affligée d'une fluxion; car la douleur n'en est sensible que dans le changement de position de cette partie.

Ceux qui n'ont pas accoutumé de regarder dans les lunettes d'approche y voyent ordinairement les objets bordez de bleu et de rouge, quoyqu'ils ayent la vüe fort bonne. la raison de ces couleurs vient de la grande refraction des rayons en entrant dans l'air, car tous les rayons d'une lumiere vive, ou d'un corps fort eclairé qui sont terminé par le noir, estant rompus, paroissent avoir sur leurs bords des couleurs rouges ou bleüis. mais quoyque les rayons rompus fassent les couleurs sensibles, car sans cela l'air ne pourroit pas les appercevoir; cependant ceux qui n'ont pas l'usage de regarder dans les lunettes d'approche, ne mettent pas — L III.

ordinairement le verre oculaire a la distance que
l'objectif demande pour conuenir a [illegible] ; et ils
voyent les objets un peu confus a cause de l'écart des
rayons, ce qui leur rend aussi les couleurs sensibles
et comme ils ne sont pas accoutumez a voir
distinctement les objets éloignez, ils font bien moins
dattention a la distinction de l'objet que les cou-
leurs, qui leur paroissent extraordinaires et sur-
prenantes. mais ceux qui sauent conuaincu par
l'experience que les objets nont pas toute la netteté
quils peuuent auoir, ils auancent ou ils reculent
le verre oculaire, tant quil soit a la distance de
l'objectif laquelle ni conuenable a la portée de
leur vüe, et alors ils ne voyent point de couleurs
ce nest pas quil ny en aye toujours mais elles ne
leur sont pas sensibles a cause du trop peu decart
des rayons. pour faire voir quil ny a pas dautres
raisons de cet effet, cest que ceux qui sont le
plus accoutumez a regarder dans les lunettes dapproche,
et qui ny remarque point de couleurs fils approchent
ou fils éloignent le verre oculaire de l'objectif plus
quil ne conuient alors vne ils verront aussi tres-
[illegible] cette experience suiuante seruira encore de
confirmation [illegible] que je viens de dire.

Quand on a rempli déau une petite phiole LIV.
bien ronde dun pouce de diametre ou environ
et quon lexpose au soleil dans une chambre
obscure, si lon regarde cette phiole un peu en
tournant le dos au soleil, on voit que les rayons
droits qui va de lail ala phiole font un angle
de 41. degrés environ avec celle qui vient du soleil
dans meme phiole on y verra un point dune couleur
rouge tres vive, et ensuite on verra du jaune, de
vert, dubleu et du pourpre en remuant un peu lail
dela place ou il voit le rouge. Cest par ce moyen
quon explique les couleurs de laire en Iris, mais
ce qui on de plus remarquable dans cette Experience
cest que ceux qui ont la vüe parfaite ou qui
sont un peu presbytes ne voyent presque pas ces
couleurs, quand la phiole nest eloigné que de
lail que de 3. ou 4. pieds au lieu que ceux qui
sont fort presbytes ou un peu myopes voyent ces
couleurs fort distinctes et fort vives. Les fort myopes
voyent tres distinctement les petites parties de la boule
dou la lumiere rompüe et reflechie vers lail ses rayons
ne font presque point d'ecart et par consequent les
couleurs ne sont point ou tres peu sensibles. mais quand
la phiole en si eloignée de ses yeux par rapport a
sa grosseur, quils ne peuvent plus en distinguer les
petites parties et les rayons qui font les couleurs

que les vües parfaites ne voyent pas toujours les couleurs de l'iris dans les phioles qui servent a en faire les experiences.

toujours de plus en plus au dela de ceux dela lumiere
pure ; ils y voyent des couleurs comme des autres yeux ;
et pourquoy ils voyent fort bien les couleurs de l'arc en
ciel dans les petites gouttes deau de la pluye.

LV. Or aussi par la meme raison que les forts de
quelques vûës ne voyent pas ordinairement les couleurs de l'arc en ciel, et les gouttes de rosée
ciel, dans les gouttes de rosée qui sont attachées sur les-
herbes, a moins que les gouttes ne soient tres petites ou
qu'elles ne soient fort eloignés de l'œil ; car a 4 pieds de
distance environ ils voyent tres distinctement les petites
couleurs de ces gouttes ; et pourquoy les rayons de la
lumiere ne faisant pas un assez grand effet dans
leurs yeux, ils ne peuvent appercevoir les couleurs
qu'elle y forme ; mais les mettent au devant de l'œil
un verre convexe ou concave, et qui les rend alors
myope ou presbytes, ils appercoivent les couleurs
comme s'ils estoient effectivement myopes ou presbytes.

De quelques accidens qui arrivent aux trois sortes de vûës.

LVI. Monsieur Descartes dit que lorsque les rides qui se font
Sentiment de Mr Descartes sur les rides qui paroissent aux chandelles.
a les surfaces des humeurs de l'œil sont droites et qu'elles
se croisent dans l'axe et qui se rencontrent comme
font des rais de grands rayons dans ça et la autour
des flambeaux : mais cette raison n'est pas trop semblable
car il faudroit qu'il y eut toujours de ces sortes de rides
a, les yeux ; ou qu'elles fussent formés par le clignotement
et qu'elles [illegible] ordinairement de haut en bas ; car toutes les-

fois qu'en regardant une chandelle ou flame presque l'œil on voit toujours de ces rayons qui s'etendent seulement en haut en bas.

LVII
Sentiment de m. Rohaut sur le meme sujet.

Mr. Rohaut explique ce phenomene d'une maniere fort differente de celle de m. Descartes, car il dit que les deux paupieres H et I etant fort proches l'une de l'autre ne laissent qu'a peine une petite ouverture entre deux, par laquelle les rayons qui partent de la chandelle BCD font tracer leur image dans l'endroit EFG, de la retine, et que les bords des paupieres qui se touchent ordinairement sont lisez comme



deux miroirs convexes qui reflechissent les rayons de lumiere qu'ils envoyent vers la retine aux endroits EK, GL, qui sans elle ne seroit ebranlez que par des objets qui seroient vers BM et CN ainsi l'impression qui se fait en EK cause l'apparence des rayons lumineux qu'on rapporte en BM; et celle qui se fait en GL, cause l'apparence des rayons qu'on imagine en CN. mais il ajoute que la partie B de la

flamme éclairant la paupiere inferieure 1. ses rayons
sont reflechis sur cette paupiere, et vont toucher la
retine en haut, dans sa partie LG, ce qui cause l'ap=
parence des rayons d'en bas. CN: si l'on met donc un
corps opaque OP, entre l'œil et le haut de la flamme,
on cessera de voir les rayons d'en bas et l'on continuera
de voir ceux d'en haut, par ce qu'ils sont formez par
les rayons CH, qui partent du bas de la flamme, et
que ne sont point interceptez, mais alors ils ne paroi=
ssent plus a la meme distance que la chandelle, mais
sur le corps opaque.

LVIII. Objections au sentiment de m.r Rohaut.

Cette explication a receu beaucoup d'applaudissem.ts
et elle paroit d'abord fort convaincante; mais il me
semble qu'en l'examinant de prés elle ne peut pas se
soutenir, m.r Rohaut remarque tres bien qu'il faut que
la chandelle soit eloignée de l'œil, et l'experience fait
voir que les rayons paroissent bien mieux lorsque la
chandelle en est eloignée, que lorsqu'elle en est proche.
mais en ce qui detruit entierement sa demonstration,
c'est alors on ne doit plus considerer dans la chandelle
ce partie haute ny de basse comme il fait, les
rayons qui en viennent a l'œil etant comme paralleles
entre eux.

De plus quand il dit que les rayons BI qui viennent
de la partie superieure B de la flamme, font l'apparence
des rayons CN en allant toucher la partie superieure

GL. de la retine, il ne considere pas que les rayons
du milieu de la chandelle, et meme ceux de la partie
inferieure ~~n'en parviennent~~ vont aussi rencontrer
la superficie concave de cette paupiere inferieure,
l; et par consequent quand on mettroit le corps
opaque OP, on ne cacheroit que quelques de ces
rayons qui feroit sur la retine immediatement au
dessus de la chandelle, leur extremité L, parvenant
toujours, laquelle seroit formée par la lumiere du
milieu et du bas de la chandelle, ce rayon ne disparoitroit donc pas entierement tant qu'il ne tombat
plus aucune lumiere sur la paupiere l. mais s'il n'y
avoit plus aucun rayon de lumiere qui put rencontrer
la paupiere l. il n'y en auroit point qui tombat sur
la paupiere H, car toute la chandelle leur seroit
caché par le corps opaque, et si l'on mettoit le corps
opaques proche de l'œil apres l'intersection des rayons,
il arriveroit le contraire de ce que dit m^r. Rohault
ce qui repugne a l'experience, il faut donc chercher
ailleurs la cause de cette ~~experience~~ apparence, mais
il faut auparavant rapporter plusieurs circonstances
que cet autheur n'a pas rapportées ou qu'il a negligées
et faire voir a meme temps qu'elles ne peuvent pas
favoriser son systeme.

LIX. observations sur l'apparence des rayons.

je remarque premierement que lorsque l'on panche
un peu la tete en bas et que l'on regarde la chandelle, on
n'en voit seulement le rayon d'en bas CN, et au contraire lorsqu'on

leue la tete on ne ne voit que des rayons en haut comme BM, et enfin que pour voir des rayons en haut et en bas il faut tenir la tete droite et fermer presque l'œil.

Pour expliquer ces effets, il faut considerer que la paupiere d'en haut a vn fort grand mouuement en comparaison de celle d'en bas qui n'en a que peu, et que lorsque la tete en vn peu baissée le globe de l'œil s'eleue en haut pour regarder la chandelle en sorte que l'ouuerture de la prunelle se trouue alors fort eloignée du bort de la paupiere d'en bas, qui ne peut pas s'eleuer iusques a l'ouuerture de la prunelle, et par consequent il ne peut pas reflechir dans l'œil aucun rayon du bort de la paupiere d'en bas; ou s'il en reflechit il ne peut estre que bien moins que lorsque l'œil est mediocrement ouuert, mais comme il n'y en reflechit point lorsque l'œil est mediocrement ouuert, ce qui est confirmé par l'experience, puis que l'on ne voit point de rayons, il n'y a donc point de rayons reflechis de la paupiere d'en bas dans cette position de la tete, et par consequent on ne verra point le rayon CN qui accompagne la chandelle vers le bas; car les rayons reflechis de la paupiere d'en bas 1. sont ceux qui font voir les rayons CN en bas dans l'explication de M^r. Rohaut a cause qu'ils frappent la partie superieure CL, de la retine ce qui est entierement contraire a l'experience.

Mais dans cette position de la tete qui est baissée,

l'ouuerture dela prunelle se rencontrant vis a vis
dabord dela paupiere dón haut les rayons qui viennent
dela chandelle vers laid deuroient se reflechir sur le
bord conuexe de cette paupiere, et aller occuper la
partie inferieure EK dela reline qui feroient voir
le rayon BM au dessus dela chandelle, ce qui est
entierement oppose a l'experience.

Tout le contraire doit arriuer lorsquon tiuera
la tete, car alors l'ouuerture dela prunelle se ren=
contrant proche du bord dela paupiere dm bas les
rayons dela chandelle qui y reflechiront, iront occuper
dans l'aid la partie superieure, et par consequent ils
feront voir le rayon de lumiere CN au dessous dela
chandelle, ce qui est encore contraire a lexperience
car la tete etant laissé on ne voit que le rayon den
haut BM.

On ne peut pas dire que les effets arriuent a
cause dela grandeur dela chandelle, qui marque
des rayons differens dela partie superieure et de
l'inferieure, car lorsquelle est eloignée de laid, et
quón met au deuant une carte percee dún petit trou,
on ne laisse pas de voir la meme chose, quoyque les
rayons qui viennent de toutes les parties soient comme
paralleles entr'eux,

On remarque auss quen regardant la lumiere dela
chandelle au trauers dun trou, la tete etant mediocrement
laissé on voit des rayons qui s'etendent au dessous dela
lumiere du trou, et que si on laisse [illegible]

les rayons disparoissent tout dún coupt quoyquonvoye encore la lumiere au travers du trou. cen ce qui fait tres bien connoitre que ce ne sont pas les rayons de la lumiere qui frappant sur le bord de la paupiere inferieure et le reflechissant vers la partie superieure de la retine, forment les rayons qui paroissent au dessous de la lumiere du trou, cen puis quon voit encore la lumiere du trou, rien nempeche que cette lumiere ne donne sur le bord de la paupiere. il faut donc chercher une autre cause de ces effets, et voicy celle que jón donne et qui satisfait egalement atous.

LX. Explication de lapparence des rayons.

Soit donc comme cy devant laíd A, et le point lumineux B a quelle distance on voudra pourveu quil aye encore assez de force pour toucher laíd vivement. on sçait que laíd est toujours humecté dúne eau glaireuse, qui se ramasse en plus grande quantité au bord des paupieres que dans les autres endroits a cause quelles prodent sur la cornée, cette liqueur qui sattache a la paupieres en se levant, forme une cauité entre la paupiere et la cornée, et les rayons qui viennent du point lumineux B en passant au travers de cette cauité vers H se detournent vers la perpendiculaire, et passent dans laíd vers la partie superieure de la retine, cen pourquoy si la paupiere H se trouve vis a vis louverture de la prunelle comme il arrive lors que la teste en un peu baissé il semble que les rayons de la lumiere qui se rompent vers le bord H de la paupiere superieure rencontrent la retine OL, et forment le rayon lumineux quón

voit au dessous du point B en BN, mais si on baisse
un peu trop la tête, et que la saillie du sourcil et de
la paupiere puisse empecher que les rayons de la
lumiere ne donnent plus sur la petite concavité de
formée par l'humeur de l'œil au bord de la paupiere
superieure H, le rayon lumineux qui paroit au
dessous du point B disparoitra comme il arrive en
effet, quelquun verra encore le point lumineux B
par le moyen des rayons qui tombent ordinaire sur
la partie de la cornée, qui est entre les deux paupieres
et qui peuvent entrer dans l'œil par l'ouverture de
la prunelle.

Il est evident qu'il ne sçauroit
paroitre de rayon au dessus du point B lorsque la tête
est baissée car la paupiere inferieure etant alors au des=



sous de l'ouverture de la prunelle les rayons qui
tombent sur la concavité faite par l'humeur qui est au

bord dela paupiere I. se detournent vers le bas de
l'ail sans pouvoir passer au dedans par l'ouverture
dela prunelle qui est au dessus et qu'est confirmé
par l'experience.

Mais si la tete est droite et que les deux pau-
pieres soient approchés l'une de l'autre la conexité qui
en formee entre deux par la quelle venant
les rayons du point lumineux B les detourne, insorte-
que ceux qui rencontrent la courbure vers la pau-
piere inferieure vont vers le bas de l'ail en K, et ceux-
qui rencontrent la courbure vers la paupiere superieure
H vont vers le haut en L et comme dans cette position
de l'ail et des paupieres, l'ouverture dela prunelle
R S, se trouve entre les deux paupieres, les rayons detour-
nez pourront penetrer au dedans de l'ail, et rencontrer
la retine au dessus et au dessous de l'axe de l'ail, et ainsi
ils feront voir deux rayons de lumiere B M, B N toute
ensemble au dessus et au dessous du point lumineux.

Si on leve maintenant la tete fort haute on
appercevra un seul rayon B M au dessus du point lumineux.
car le globe de l'ail se baissant pour mettre son axe
dans la ligne qui vient du point B, la courbure qui
couche la paupiere inferieure se trouvera vis a vis
l'ouverture dela prunelle, et les rayons qui se detourneront
sur cette courbure en descendant vers le bas de l'ail,
pourront penetrer au dedans, et rencontrer la retine en
K au dessous de l'axe, dou il arrivera qu'on verra un seul
rayon de lumiere B M au dessus du point lumineux B.
on ne verra point au dessous, car les rayons qui rencontrent

la courbure qui m. couure la paupiere superieure. H en se detournant vers le haut de lail ne scauroient entrer par louuerture de la prunelle qui en au dessous.



Quand les yeux sont plaureux; labondance des liqueurs forme vne plus grande concauité au bord des paupieres, dou il auriue que la refraction estant plus grande les rayons de lumiere paroissent plus vifs et plus longs.

il reste maintenant a expliquer ce qui arriue lorsquon met un corps opaque entre lail et la lumiere.

il faut premierement remarquer quon doit placer le corps opaque proche lail pour faire vn effet plus sensible. lorsque la tete est baissée et quon voit les rayons en bas, si lon place le corps opaque vers le bas de lail, les rayons qui paroissent en bas demeurent. ce qui paroit euident parce que jay expliqué cy deuant car les rayons de la lumiere qui sont interceptez par le corps opaque, n'apportent aucun changement a ce qui se passe au dedans de lail puis quils ny entroient pas auparauant. mais si lon place le corps vers le haut de lail en auancant son bord vers le bas, les rayons qui paroissent au [illegible] de la lumiere

disparoissent tout dun coup quoyquon voye encore la chandelle.

Celuy en aisé a expliquer, car le corps opaque P interceptant alors les rayons de la lumiere qui retomboient sur la concavité de la liqueur qui avoit amassé autour de la paupiere superieure H, n'entrent plus dans l'œil, et ne vont plus toucher la partie superieure de la retine, d'où pourquoy les rayons qui paroissent au bas de la lumiere d'i disparoissent, mais comme il y a encore des rayons de la lumiere qui rencontrent la cornée entre les deux paupieres, ils vont s'assembler au fond de l'œil, et y font a l'ordinaire une peinture exacte de l'objet lumineux.

Le Contraire arrivera par une meme cause pour le rayon BM, qui paroit au haut de la lumiere en tuant la tete et qui n'est pas necessaire d'expliquer plus au long.

Quoyque le sentiment de M. Rohaut sur les rayons qui paroissent aux chandelles ne puisse pas se soutenir, on ne peut pas nier pourtant que l'epaisseur des paupieres ne reflechisse la lumiere au dedans de l'œil dans quelques positions de l'œil et de la chandelle, mais cette lumiere reflechie fait une apparence fort differente des rayons dont nous avons parlé cy devant.

Apres avoir donné cette explication j'ay resolu de la faire imprimer en particulier, mais ayant rencontré le petit traité qui a pour titre Ophtalmographie par M. Briggs medecin Anglois j'ay vu en general la meme

explication de cette apparence.

LXI
dune espece de tache particuliere.

il y a vne espece de tache qui peut paroitre dans toute sorte déyeux, a dont je nay point parlé cy dessus, mais elle ne peut jamais apporter aucun dommage a lœil, car elle nest causée que par quelque glaire épaisse et irreguliere qui glisse sur la cornée sans luy donner la moindre incommodité, si ce nest de lempecher de voir distinctement lorsquelle se rencontre deuant louuerture de la prunelle mais en remuant un peu la paupiere on detourne ce corps etranger, et aussitot la tache disparoit. on ne sapercoit de ces taches que quand on regarde vne chandelle ou vne lumiere semblable dans vn lieu obscur, et il faut que limage de la lumiere paroisse confuse, car pourquoy si cette lumiere est a vne distance de 12. a 15 pieds, lœil qui la regarde doit etre myope ou fort presbyte pour voir cette sorte de tache. car alors la peinture de cette lumiere qui se fait dans le fond de lœil etant confuse, on voit la figure de louuerture de la prunelle, comme jay dit cy deuant et non pas celle de la lumiere; car pourquoy lorsque quelque corps opaque se met au deuant de cette ouuerture, il en change legalement la figure, et ce corps doit aussi paroitre sur la peinture de la lumiere qui est dans le fond de lœil puisque la figure claire qui est au fond de lœil, doit etre semblable a celle de louuerture et on auroit toutes les raisons du monde si lœil etoit bien conformé pour voir distinctement les objets a la distance ou a la chandelle on peut [illegible] voir cette

tache; car la peinture de la chandelle sera distincte
sur le fond de l'œil, de quelque figure que soit la prunelle
et quelques irregularités quelle puisse avoir. cependant
si elle est bien conformé pour avoir les fonds de taches
il ne faut prendre un morceau de verre ordinaire qui
soit un peu eclaté sur le bord, et approches en endroit
tout contre l'œil, alors ce petit eclat luy enverra dans
l'œil une lumiere comme s'il y en avoit une a l'endroit
même de cet eclat de verre. mais si l'œil n'etoit pas
disposé pour voir distinctement des objets qui sont
fort proches, il doit être considéré par rapport a cet
objet lumineux, comme un œil fort presbyte il verra
la tache sur la lumiere de cet eclat. il ne laissera pas
aussi de voir distinctement la lumiere de la chandelle
a coté de l'autre.

Cette sorte de tache qui paroit grande a pro=
portion de la grandeur du corps qui la forme sur la
cornée, disparoit aussitot qu'on fait mouvoir ce corps devant
la prunelle en remuant ou en fermant les paupieres.

Lorsque l'humeur qui enduit la cornée en fait vis=
queuse, si l'on ferme la paupiere de dessus en baissant
un peu la tete, ensorte que le cercle lumineux sous la
figure duquel on voit la chandelle paroisse coupé en
deux également par la paupiere, quand on releve la
paupiere tout a coup, on voit une ligne ou bande obscure
a l'endroit ou l'ombre de la paupiere coupoit la lumiere
apparente. cette ligne est formé par une elevation de
l'humeur glaireuse qui reste un peu de tems sur la cornée

a lendroit ou etoit le bord dela paupiere, mais ensuite, elle setend auec la retine et la ligne disparoit.

LXII. Des defauts dela vision lorsque le cristallin est suspendu obliquement.

jay dit cy deuant dans larticle 10, que lon a vn endroit dela retine plus sensible que les autres et que cet endroit ne soit pas dans laxe dela vision, on trouue



laid ensorte que la pointe du pinceau des rayons qui viennent de lobjet quon aura veu distinctement, tombe sur cet endroit, et alors il semble que chacun des deux yeux regarde on different endroits ce qui fait la veüe louche, mais ce defaut dela veüe peut venir aussi dun autre cause. car si le cristallin nest pas suspendu bien droit au deuant de louuerture dela prunelle, et quil soit plus incliné dun coté que dautre, comme on voit dans cet figure, la pointe des pinceaux des rayons AB, qui viennent directement a laid, et qui deuroient tendre au point P sur la retine dans laxe CP, se detourne en D vers lendroit ou le cristallin est le plus cleué. mais si le point P dela retine, lequel est dans laxe CP, est plus sensible comme il est ordinairement, les rayons qui viendront obliquement dans laid comme sont EB ayant passé au trauers des humeurs de laid iront sassembler sur la retine en ce point P, et lobjet qui enuoyera les rayons EB sera veu [illegible] de tous, et pourquoy cette veüe paroistra louche, car laid sera attentif a lobjet vers le [illegible] non diuine

et ce dessaut paroîtra encore plus grand si le
Cristallin n'est pas incliné d'un même côté dans
chacun de ces deux yeux.

J'ay supposé dans ce que je viens d'expliquer
que les rayons s'assemblent exactement sur la retine
quoyqu'il soit certain, que si le Cristallin etoit sus=
pendu obliquement dans l'œil, la vision ne le pourroit
jamais faire bien distincte, mais, si l'œil ne peut
voir l'objet que confusement, soit qu'il soit presbyte
ou myope, et que l'objet soit trop proche ou trop
loin, l'image de l'objet sera confuse mais d'une
maniere toute particuliere, ce qui paroîtra fort
clairement si l'on regarde un objet lumineux comme
une chandelle dans l'obscurité, car son image ne
paroîtra ouale, au lieu qu'on la devroit voir toute
ronde suivant la forme de l'ouverture de la prunelle.
Cette ouale aura son petit diametre dans la ligne
qui determine l'inclinaison du Cristallin et on
trouvera par ce moyen comment de quel coté
le Cristallin est incliné dans l'œil.

3.me On pourra aussi remarquer si le Cristallin est
incliné de la même maniere ou differemment dans
chaque œil: car en fermant alternativement les deux
yeux, et regardant toujours la même chandelle
ou ses fausses images de la lumiere sont toutes deux

ovales, et si ces ovales sont inclinés du même
sens ou diversement ou dun sens contraire, ce qui
fera connoitre les differentes inclinaisons du
cristallin ceux qui ont le cristallin incliné en
sens contraire dans les deux yeux verront la
lune comme deux ovales qui
s'entrecoupent, comme il paroit
dans cette figure et ils jugeront
dabord quils voyent cinq lunes
jointes ensemble; car la partie
du milieu qui en commune aux deux ovales
paroit au milieu des autres, et la plus claire ayant
double lumiere, mais les quatre extremités qui debor-
dent au dela dela partie du milieu, paroissent comme
quatre autres images dela lune dont les centres
seroient eloignés les uns des autres et qui seroient
en partie recouvertes par celles du milieu.



J'ay aussi demontré cy devant dans l'article LXIII.
xx. comment un seul objet pouvoit paroitre double
avec un seul oil qui on presbyte ou myope; mais il
faut faire voir presentement comment il se peut
faire que toutes sortes de vües puissent voir presen-
tement comment il se peut faire que toutes sortes
de vües puissent voir un meme objet redressé

plusieurs fois sans quil y ayt aucune chose exterieure qui detourne les rayons comme on le peut remarquer dans l'experience suivante.

Si l'on met au deuant de l'œil et tout proche vn papier ou vn carton mince, qui soit ouuert dune fente longue et fort etroitte, et qu'on regarde vne chandelle dans l'obscurité, il y aura peu de vûës qui ne voyent cette chandelle multipliée plusieurs fois selon la longueur de la fente; en sorte que si cette fente est placé horizontalement au deuant de l'œil.

on verra plusieurs chandelles rangées les unes aux costés des autres a peu prés comme en cette figure; et j'ay trouué des yeux qui en voyoient jusqua six.

Pour rendre raison de cette apparence. il faut dabord considerer que si l'œil a vne conformation propre pour voir tres distinctement cette chandelle a cette distance ou elle est placée, il ne doit voir qu'vne seule fort distinctement au trauers de la petitte fente, mais elle doit paroitre vn peu moins lumineuse que si la veüe estoit sans deuant de l'œil, car il entrera moins de rayons dans l'œil, et il est certain que

que la petite fente dela carte qui change la figure de louuerture dela prunelle, ne peut apporter dans ce cas aucun changement ala figure de lobjet, comme on le domontre dans loptique. mais quoyque laid ne puisse pas voir tres distinctement un objet dans une certaine distance, on ne pourroit presque sapperceuoir de ce deffaut sans le secours de cette experience, a cause dela grande ouuerture dela prunelle; car la plus grande partie des rayons qui entrent dans laid, sassemblant en vn endroit qui a peu de latitude lorsque lobjet est placé a vne distance propre pour faire que cet endroit se rencontre sur la retine, on croit voir lobjet fort distinctement, les rayons qui secartant dun coté et dautre nétant pas assez forts pour faire vne impression sensible sur la retine ainsi quoyquun ait ne soit ny presbyte ny myope il nen pas pour cela parfait.

mais sans considerer sy si laid en presbyte ou myope, ou parfait, comme je lay desiny dans le Commencement de ce discours, je suppose seulement quil ny a point dendroit au dela du crystallin, ou tous les rayons qui entrent dans laid sassemblent exactement. il semble dabord quon ne deuroit voir seulement quune lumiere confuse suiuant

la figure dela ferre, car l'ouverture de la prunelle etant alors changée, et etant longue, la lumiere qui-le peint sur la retine doit avoir la figure de louverture dela prunelle comme je lay demontré dans lart: XXXIX. mais la difficulté en despliquer comment cette lumiere longue se diuise en plusieurs parties qui reuiennent toute la figure de lobjet lumineux.

je dis donc quil se trouue peu de vües — dont les superficies du cristallin et dela cornée — soient de telle figure quelles puissent rassembler au dedans de laïl tous les rayons des objets qui sont placés a differentes distances, comme je lay obserué dans larticle XXI, et cest pour cette irregularité des surfaces des humeurs de laïl que jexplique lapparence dont il sagit icy.

Dans la figure suiuante soit ACDE la conexité dela cornée qui soit dune figure informe comme celle dune portion de cercle, GOH, la superficie anterieure du cristallin, ΠΦΩ, la superficie posterieure et que ces deux superficies soient irregulieres — enfortte quelles determinent les rayons dans quelques

ordre vers differens endroits.

Je suppose maintenant qu'il y ait un objet B d'où il vient des rayons à l'œil comme BA, BC, BF, et que ces rayons soient comme parallèles entre eux dans cet exemple, et j'examine premièrement, ce qui arrive à ces rayons sur un plan qui passe par l'axe de l'œil, ce qui en représenté dans cette figure; les rayons qui viennent de l'objet B, et qui rencontre la surface de la



Cornée, que j'ay supposé d'une courbure uniforme sont detournez comme pour les faire concourir à peu prés en un meme point: mais en rencontrant la surface anterieure du Cristallin qui en irreguliere ils se detournent en differens endroits, et en leur augmente, ou se diminüe suivant l'irregularité de la surface posterieure du meme Cristallin, j'ay suppose donc dans cet exemple, que rayons qui tombent autour du point O, lieu de la surface anterieure du Cristallin y forme

travers de cette humeur et estant encore detournez
sur la surface posterieure concourent au point
Y. sur laxe de l'oeil ; mais que les rayons qui
tombent autour de M et de N aux deux coten
du point O, apres avoir passé au travers de
cristallin concourent vers les points S T, ou ils
font leur foyer. enfin que les rayons qui tombent
vers G et H sur le cristallin, se detournent apres
avoir passé au travers pour aller concourir ensemble
au point I. dou il on evident que les rayons qui
viennent dun meme point de lobjet, tendant vers
differens endroits doivent faire de la confusion sur
la retine en quelque endroit quelle soit placée.
Car si la retine est en L K, on voit que les rayons
qui tombent sur le cristallin vers les points G et
H concourant au point I. sur la retine, y
presentant limage du point B, de lobjet, cette
image sera dautant plus vive quelle aura les rayons
de deux endroits differens qui se joignent ensemble,
et qui sont encore fortifiez par ceux du milieu qui
[illegible] point Y. mais qui font vn peu de
confusion [illegible] point I. a cause que les rayons du
milieu qui [illegible] au point Y. qui en plus-

Eloigné que la retine, Secartent un peu autour
du point 1. pour les rayons qui tombent au tour des
points M et N, qui font leurs foyers en S et en T, &
ils rencontrent la retine aux points L K, ou ils occupent
une petite place a cause que ces points L K sont
eloignez des foyers S T, il se fera donc sur la retine
L K, trois peintures differentes de l'objet B. une fort
vive au point 1. et deux autres aux deux coté
un peu plus foibles et un peu confuses aux points
L K.

MAINTENANT si la retine se trouve en S T, il
doit arriver par les mesmes raisons que je viens
d'apporter que l'objet B fera cinq peintures differentes
sur cette retine a savoir deux distinctes aux points
S T. et trois autres un peu confuses aux points
Q P R, ou les rayons qui font leurs foyers aux points
1. et y. font couper hors de ces foyers.

Enfin si la retine est placé en V Δ, il y fera
aussi cinq peintures de l'objet une distincte au
point y. et quatre autres aux points V X Z Δ un
peu confuses.

L'Oeil etant disposés comme [illegible]

on voit que l'ouverture de la prunelle etant ronde
au lieu des points SQRT. et dans chaque position
de la prunelle, il doit y auoir des cercles dont tous
les centres seront dans l'axe DY; et ces cercles
seront plus ou moins lumineux et plus et moins
larges a proportion de la lumiere qui se rencontre
aux points SQRT &c. Car ce n'est que cette meme
lumiere qui tourne autour du centre comme P —
et qui fait la grande confusion de la vision,
mais si l'ouverture de la prunelle n'est qu'une ligne
comme je l'ay supposée dabord on n'aura que
des points rangés sur une ligne dans le meme
sens que celle de l'ouverture de la prunelle;
et donc par ce moyen que j'explique la repetition
apparente de l'objet. Car quoyque dans l'une
des distances de la retine comme VA; les points —
circulez VXZ A, ayent quelque largeur a cause
que les foyers d'ou ils viennent sont en SI.T, ils
y sont pourtant si petits qu'ils font la meme chose
que des points; car alors l'ouverture de la
prunelle [illegible] chaque point n'aura de largeur
que celle de la [illegible] de la carte, et ne fotondra en
longueur qu'autant que la demande la difference

des courbures, et il arrive la meme chose pour
chaque point que l'œil regarde l'objet au travers
dun trou d'epingle. Or de quelque nature que
soit l'air, on voit toujours distinctement l'objet a
cause que les rayons qui passent par cette petite
ouverture et qui on la base des cones lumineux
n'ont pas un cart sensible quoyqu'ils soient
coupés beaucoup au dessus ou au dessous de leur foyer
ainsi la multiplication de l'objet se fait de la
meme maniere que si l'on mettoit une chandelle
au devant d'un carton percé de trous dune demy
ligne de diametre environ et que on reçut la
lumiere sur un papier blanc au dela du carton.

Il faut remarquer que dans tous ces cas il ne
laisse pas dy avoir des rayons entre tous les points
marqués sur la retine dans les differentes positions: mais
comme il y en a peu, ils ne causent qu'un peu de
lumiere dans ces endroits sans former aucune peinture
distincte qui ne peut paroitre que par le concours
des rayons vers une même endroit.

Les differentes irregularités des membranes
qui renferment les humeurs de l'œil [illegible] lesquelles
les rayons se rompent, causent [illegible]

foyers, qui peuvent avoir sur la retine des dis=
positions differentes ; dont je n'ay rapporté qu'un cas
pour exemple.

L'obscurité dans laquelle on fait l'experience
dont je parle icy, fera beaucoup a faire voir l'objet
repeté plusieurs fois, car l'ouverture etant alors plus
grande qu'au jour, il y entre dans l'œil une plus
grande quantité de rayons, qui rencontrant une
plus grande quantité des superficies du cristallin
et de la Cornée peuvent etre detournez en plus de
manieres par les differentes irregularitez de ces
superficies.

On peut observer dans cette experi=
ence, de quelle maniere les rayons s'écartent
sur la retine ; car si-tôt que la
petite fente qui est au devant de l'œil, on
aura diminuer le nombre des chandelles
jusqu'a ce que la petite fente touche l'ouver=
ture ronde de la ~~chambre~~ de la prunelle
il n'y aura plus qu'une ou deux flam=
mes plus grandes qui paroitront toutes a la fois, quand
la Carte sera entre la prunelle.

Il en Iuidente que cela doit arriver ainsi,
puis que la multiplicité des chandelles ne vient que
de la grande ouverture
de la prunelle, et qué mesure
quon donne cette fente, la
largeur de la prunelle qui-
y en comprise deuient plus
petite comme on le peut voir dans cette figure
ou, ab, en plus petite que cd, et e, encore plus petite
que ab, ce qui doit etre considere comme
louuerture de la prunelle. mais dans la figure
precedente si la reline en posée en LK et que la
fente soit placée au milieu de louuerture de la
prunelle, on verra dabord lobjet multiplié trois
fois; ensuitte la fente etant un peu eleuée
retranchera les rayons qui sont au tour de G et de
H et qui sassemblent en 1. en pourquoy la chan
delle qui paroissoit au milieu en 1. diminuera
beaucoup de lumiere, car il ne luy restera plus que
les rayons du milieu qui tombent en D. enfin la
fente etant encore plus eleuée les deux chandelles
formées en L et en K disparoitront et il ne restera

plus que celle du milieu toute seule.

Mais si la retine en en ST, où l'on voit cinq chandelles aux points SQPRT, on verra d'abord disparoître les deux chandelles qui sont en Q et en R. lesquelles sont formées par les rayons qui tombent vers les extremitez du Cristallin en G et en H ensuitte celles qui sont en S et T qui sont les plus éloignez disparoîtront etant formez par les rayons qui tombent en M et en N et il restera celle du milieu P toute seule,

Enfin si la retine en placée, en VΔ les chandelles disparoîtront dans l'ordre naturel, car d'abord en éloignant la teste on ne verra plus les deux plus éloignées en V et Δ les quelles sont formez par les rayons qui tombent vers les extremitez du Cristallin en Δ et H, ensuitte les deux autres en X Z, et il restera la derniere en Y au milieu.

LXIV. Solution de la difficulté sur le renversement des objets dans nos retines.

Il semble que les rayons qui tombent en G et en H se croisent au point I. quand ils se rencontrent la retine soit qu'elle soit placée en ST ou en VΔ, y devroient former des chandelles

renuersés mais on trouvera quelles doivent paroitre droites comme les autres, en considerant que leurs peintures seront renuersés sur la retine, car il n'arrive rien d'extraordinaire a ces rayons; si ce non le changement de coté de droit a gauche, la petite fente fait ans alors l'office de couverture de la prunelle. on aura donc seulement a faire du changement, que si l'on fait auancer quelque corps obscur sur la petite fente qui se placi dans le milieu de l'axe exterieur la partie vers F, soit cachés la chandelle V disparoitra d'abord ensuite celle qui se en Z. et le corps continuant a s'auancer vers A. celle du milieu s'en ira, puis celle qui se en X et la derniere en A. on peut juger par cette meme maniere; de ce qui arriuera sur la retine dans quelque endroit quelle puisse etre placé.

Enfin par les experiences de l'ordre dans lequel disparoitront les chandelles on peut connoitre en quelque façon la forme des surfaces du cristallin et de la cornié, je dis en quelque façon car il seroit difficile de debrouiller les complications des refractions de ces trois [illegible].

Ceux aqui les rayons de la lumiere posé a
vne certaine distance ne fait que tres peu d'ecart, ne
pourroient pas voir plusieurs chandelles, quand meme
les surfaces des humeurs auroient des irregularités
mais si ils mettent au deuant de l'œil entre la
fente et la cornée, vn verre convexe ou concave,
qui écarte beaucoup les rayons sur leur retiné, ils
appercevront aussitot la multiplicité des chandelles,
car par ce moyen ils pourront rendre leur veüe ou
myope ou presbyte; au contraire ceux qui —
voyent naturellement plusieurs chandelles au travers
de la fente, la chandelle etant dans vne certaine
distance de l'œil, ils n'en verront plus qu'vne au
travers de la fente s'ils donnent a leur veüe par le
moyen d'vn verre convexe ou concave, ce qui luy
est necessaire pour assembler les rayons de la chan-
delle a peu pres en vn point sur la retine quoy-
que effa ils ayent les superficies des humeurs —
irregulieres; car ils ne pourront appercevoir la
multiplicité des chandelles qui se confondent
jusqu'a ce que l'ecart que la surface exterieure
de la cornée et de celle du cristallin donne

etre irregulieres pour faire l'effet que je viens
d'expliquer, mais il pourroit aussi arriver la meme
chose par une autre cause, et qui en connoit de
ceux qui se sont appliquez a la dissection des yeux,
car ils savent que le cristallin est formé de plusieurs
enveloppes les unes sur les autres comme sont les oignons,
et que dans le milieu il y a un petit noyau. il
arrivera donc de la nature de ces enveloppes transparentes
cause de differentes refractions, que le
cristallin fera les effets que j'ay expliquez quoyque
sa figure exterieure soit fort reguliere. ce qui
en rend facile a connoitre.

Ce seroit icy le lieu ou je devois parler de
la multiplication des objets qui se fait en les
regardant au travers de plusieurs petits trous qui
sont percez dans un papier ou dans une carte
noircie et qui ne font pas plus eloignez les
uns des autres que la grandeur de l'ouverture de la
prunelle; mais comme ce phenomene ne depend
point de la conformation des yeux et n'enferme en
quoi cette multiplication ne se [illegible] par
laid qui on presbyte ou myope, j'ay cru etant placé

a la distance ou l'œil ne scauroit le voir distinctement et comme j'en tire une longue suite de consequences pour la conformation de l'œil, et pour la mesure de sa force ou de sa foiblesse, j'ay trouvé a propos d'en composer la seconde partie de ce traité.

LXVI. Des yeux du chat.

Il auroit été difficile que la membrane iris de la maniere qu'elle est disposé dans les hommes et dans la plus part des animaux, eut pû faire une aussi grande et aussi prompte contraction et dilatation que celle que nous apercevons dans les chats, cependant cet usage etant necessaire a ces sortes d'animaux qui cherchent ordinairement leur nourriture, dans l'obscurité de la nuit, la nature y a pourveu par une conformation toute particuliere. l'ouverture de cette membrane ne paroit que comme une fente de haut en bas



selon la ligne AB. les muscles qui ferment a l'ouvrir ne font que la tirer de chaque côté vers E et F, et elle peut la fermer ou par une vertu de ressort qui [illegible] muscles qui tirent en sens contraire des premiers vers A et vers B.

Ces sortes d'yeux ont donc vn grand auantage
si les humeurs sont bien conformées, car ils peuuent
appercevoir les objets distinctement dans l'obscurité, a
cause de la grande quantité de rayons qui entrent dans
l'œil, et ils ne sont point choqués par vne grande
lumiere, puisqu'ils peuuent facilement et subitement
fermer l'ouuerture de la prunelle, et faire en sorte
qu'il n'entre que peu de rayons de l'objet qui puissent
toucher la retine, enfin cette ouuerture peut etre
encore diminuée et reduite a vn petit trou quand
les paupieres viennent a se fermer, ce qui rend
la vision tres distincte de prés et de loin.

Mais cette Conformation de vüe n'a pas été
donnée aux hommes, et ceux qu'on dit auoir des
yeux de chat sont ceux qui peuuent voir distinctement
pendant la nuit, c'est a dire dans vne tres foible
lumiere, comme est seulement celle des Astres.
Car il est certain qu'il n'y a point d'yeux qui puissent
voir dans vne totale obscurité; ces sortes d'yeux ont
l'ouuerture de la prunelle fort grande et comme les
hommes ne peuuent pas retrecir beaucoup cette
ouuerture, au moins s'ils font vn peu auancer en auant

il luy arriue quils ne seauroient soeffrir la grande lumiere comme je lay deja remarqué cy deuant, parcequelle ebranle trop fortement la retine, ce qui cauze dela douleur.

LXVII. diminution de perte dela vuë par la grand jeune.

On aussi par la meme raison que ceux qui viennent dun lieu obscur ou ils ont demeuré long temps sils regardent subitement vne grande lumiere, ils perdent quelquefois la vüe; ou ils y-sentent vne tres grande diminution: car par le long sejour quils ont fait dans lobscurité, la prunelle etant toujours demeuré fort ouverte, la membrane iris a p[erdu] le vsage de pouuoir se resserrer et les rayons de lumiere entrant dans laïl en grande quantité, ebranlent si fortement le tissu dela retine quils le rompent a peu prés dela meme maniere quils feroient, si ayant passé au trauers dun grand [illegible] Comme ils se rassembloient sur quelque corps [illegible] tissure fut fort delicate. aussi ceux qui ont [illegible] long temps dans les neiges, croyent voir vne [illegible] Iaune les objets colorez comme sils [illegible] Crespe blanc, ce qui nous apuue [illegible] qui a eté trop fortement

ébranlée par la blancheur de la neige, qui réfléchit la lumiere reflechie sans aucun mélange.

Il arrive quelquefois par vne maladie particuliere de l'œil, que l'ouuerture de la prunelle se dilate extraordinairement, et qu'elle occupe toute la membrane iris, ce qui peut arriuer, ou parce que cette membrane perd entierement le ressort qui la tient étendüe ou parce que le muscle qui la resserre est entierement relaché, et n'agit plus contre celuy qui l'ouure, ou enfin parce que le muscle qui la dilate ne peut plus se relascher; d'où il arriue que ceux qui ont cette maladie ne sauroient soustenir la lumiere, d'autant qu'elle fait vne trop grande impression sur le nerf de la retine comme je l'ay remarqué cy deuant; et c'est peut etre pour cette raison qu'Aristote a dit qu'ils voyent les objets plus grands qu'ils ne les voyoient auparauant, parce que la grande lumiere ébranle plus de parties de la retine que ne fait vne moindre.

LXVIII. Dilatation extraordinaire de la prunelle.

Il arriue pour la même raison qu'vne petite chandelle

parvit pendant la nüit dans une tres grande distance.
mais cette grande augmentation d'image ne peut
etre que pour quelques petits objets lumineux; comme
une chandelle vüe dans une distance de 60 toises en-
viron: encore faut il supposer que l'oeil en parfait
pour voir distinctement la chandelle dans cette
distance: car autrement ce ne seroit plus augmenta-
tion de l'objet mais seulement limage de lou-
verture de la prunelle; ce que j'ay expliqué
cy devant.

LXIX.
des objets qu'on voit doubles.

Il arrive quelquefois qu'on voit les objets
doubles en les regardant avec les deux yeux; et
que quelque effort qu'on puisse faire pour
diriger l'une des yeux vers le meme endroit qu'on
regarde, on ne sçauroit les voir simples. Cet accident
n'arrive qu'a ceux a qui il arrive, mais il n'est pas
fort durable, et il ne dure pour l'ordinaire que
quelques jours, car il est causé que par quelque
petite obstruction qui se jette sur l'un des muscles de
l'oeil qui le fait mouvoir comme il a
coutume, et il a peu pres le meme effet

que si l'on contraignoit lun des yeux en appuy-
ant fortement le doigt sur lun de ses angles. mais
quand ce muscle demeureroit toujours immobile, cette
apparence ne laisseroit pas de se dissiper promptement, car l'œil qui en fait laccommoderoit en
peu de tems a linfirmité de laudit, et lhabitude
feroit bientot par la retine de nouvelles parties de
meme sensation comme il arriveroit si lon tenoit
pendant quelque tems deux doigts croisés lun sur
lautre, car alors les corps quon toucheroit ne paroi-
troient plus doubles comme ils faisoient dabord.

LXX.
Des apparences colorées des images du soleil.

Les images du soleil differemment colorés quon
voit de tout coté apres lauoir regardé, ne viennent
que dun trop fort ebranlement des parties de la
retine; car lendroit de la retine qui a été forte-
ment ebranlé, ne peut plus recevoir limpres-
des rayons qui viennent des autres objets
cest pourquoy il paroit une tache de la couleur
du soleil, ou de celle quil a prise en passant
par quelque ouverture où a vitres. ma-
là couleur de cette tache change peu a peu

a mesure que l'ebranlement des fibres de la retine
diminuë: car si l'on ferme d'abord les yeux apres
avoir regardé le soliel, on croit voir les taches de
couleur rouge a cause du violent ebranlement de
la retine; ensuite en tenant toujours l'oeil fermé
la tache paroit jaune, puis verte, et enfin bleüe
mais si lon regarde des objets differemment
colorez, les taches paroissent de differentes couleurs
par la comparaison de celles qui les environnent
et par leur melange avec elles, ce que lon
peut connoitre facilement; car il en certain
que ce qui paroit blanc lors que le fond en
noir paroitra noir ou brun quand le fond sera
blanc; et la tache qui paroissoit jaune ou
bleüe les yeux etant fermez paroitra verte
si lon regarde du blue ou du jaune; car le
vert se forme par le melange de ces deux
couleurs.

LXXI.
apparence de
l'ecriture
colorée.

L'ecriture quelquefois, quapres quon a fû
longtemps au grand soleil, on voit toutes les lettres
de couleur rouge sur vitre, cette apparence
[illegible] ebranlement de la

rotine par la reflexion du soleil sur le papier blanc, qui fait comme une grande lumiere au travers de laquelle on voit le noir des lettres. Les lettres paroissent rouges par la meme cause. qui fait que la planette de mars paroit rouge. Car son corps lumineux est couvert de plusieurs taches noires.

Toutes les experiences qui ont été faites sur les couleurs nous prouvent que les ~~couleurs~~ corps noirs un peu transparens paroissent rouges quand ils sont exposés contre une grande lumiere et les corps blancs paroissent bleus sur un fond noir, cest la raison quon rend ordinairement de la couleur bleüe qui paroit au ciel, et en outre celle quon peut donner de l'apparence rouge du soleil et de la lune, dans l'horizon car alors leur lumiere paroit au travers des corpuscules des vapeurs dont la partie obscure est tournée vers l'oeil. Il sera aussi par la meme cause que si l'on regarde longtems au soleil une lumiere blanche sur un fond noir cette lumiere paroitra bleüe.

LXXII.

pourquoy lon voit du dedans dune chambre les objets qui sont au dehors et non pas du dehors au dedans.

Il ya quelques opticiens qui croyent que la difference qui in entre laer libre et celuy qui on renferme dans vne chambre fait quon ne peut pas voir aubauers des vitres les objets qui sont au dedans lorsquon in dehors, et quau contraire quand on in dedans on voit tres distinctement ce qui on au dehors. Cette raison nest pas foisonable: mais pour deouurir la veritable cause de cet effet il ne faut que considerer ce qui arriue au verre au trauers duquel on voit les objets quoyquil nen soit pas la seule cause; pource quil in certain que quand il ny auroit point de vitres a la fenetre on ne pourroit pas voir de dehors les objets qui seroient dans la chambre, a moins quils ne fussent au= ssi eclairez que ceux de dehors, car ceux de dehors etant fort eclairez ebranlent li= vrement la retine quelle ne peut pas tirer [illegible] par ceux qui sont dans la chambre [illegible] la lumiere nest ordinai= [illegible] que [illegible].

Mais pour ce qui est du verre de la fenêtre, il est aisé de voir que la surface exterieure doit reflechir vne fort lumiere vers nos yeux quand on est dehors, ce qui empeche que les rayons d'une foible lumiere qui part des objets qui sont dans la chambre peuuent faire vne impression sensible sur la retine, on peut aussi dire que les rayons de la lumiere exterieure empeschent en quelque façon l'action de ceux qui sont plus foibles comme on le remarque aux lunettes d'approche lorsqu'il entre quelque lumiere dans le tuyau.

Il n'arriue pas la meme chose a ceux qui sont dans la chambre, et qui regardent les objets qui sont au dehors, car les rayons qui passent au trauers du verre viennent sans aucun empeschement vers l'œil, car la surface du dedans verre qui est tourné vers l'œil, ne peut renuoyer que peu de lumiere celle de la chambre etant fort foible en comparaison de celle qui [illegible]

et qui passe au travers. ce que je viens de dire ne doit s'entendre que lors qu'il en sort net; car s'il en couvert de poussiere comme il arrive sort souvent, il ne seroit pas possible de voir au travers quand on seroit hors de la chambre, a cause que les petites parties de poussiere sont bien plus propre a reflechir la lumiere que la surface du verre qui en polie et qui donne passage a les rayons, mais ceux qui sont dans la chambre ne s'apperceivent pas a peine de ce que la poussiere leur ote de la lumiere des objets exterieurs car il en passe toujours assez entre les particules de la poussiere pour faire une plus forte impression sur l'oeil que celle qui y en causé par les objets de dehors de la chambre.

L. XXIII. que la retine est le principal organe de la vuë.

Tous ceux qui avoient ecrit de l'optique jusqu'a nous, avoient regardé la retine comme le principal organe de la vuë, car ils ne pouvoient pas imaginer quoi du cheveux le principal [illegible] dans sens, ailleurs que dans

les nerfs, et la retine etant vn reseau des filets du nerfs optique qui se repand dans tout le fond de l'oeil, ~~etoient~~ etoit aussi tres grande raison quils la regardoient comme l'organe immediat de la vision. Mais m^r. Mariotte s'etant apperceu qu'il y avoit vn endroit dans le fond de l'oeil sur lequel les objets exterieurs ne faisoient point d'impression quoyque la retine y fut egalement repandue, et ayant fait voir par pluseurs experiences que cet endroit etoit celuy ou le nerf optique entre dans l'oeil ou bien ne peut pas croire que la retine soit moins sensible que par tout ailleurs, il soutient que la membrane choroide etoit l'organe immediat de la vue, parceque l'endroit ou la vision manquoit etoit celuy ou la choroide etoit percé par le nerf optique.

Cette opinion fut d'abord critiquée par Messieurs Perrault, et Cassini, qui ne pouvant pas nier le fait, cherchoient la cause de ce defaut de vision ailleurs que dans le

dessaut dela choroide, proposant quelques petites veines, et arteres qui étoient meleés dans la retine; mais leurs raisons ne parurent pas suffisantes pour détruire l'opinion de monsr. Mariotte. j'ne crois pas aussi qu'on puisse attribuer le dessaut de vision dans cet endroit de l'œil a autre chose qu'au dessaut dela choroide; mais j'ne pense pas pour cela qu'on doive regarder la choroide comme le principal organe dela vue.

Pour trouver quelque Eclaircissement dans cette difficulté, il faut considerer ce qui arrive aux autres sens, et il me semble que par comparaison on peut tres bien prouver que la retine est le principal organe dela vüe, quoyquelle aye un endroit qui ne soit pas sensible aux impressions des objets exterieurs.

J'e dis donc que la retine est le principal organe dela vüe comme etant une expansion du nerf optique, puisqu'on ne doit pas rechercher le sentiment autre part que dans les nerfs, mais que cet endroit recoit limpression dela lumiere dans laquelle sont les objets, que la vüe de l'objet, comme il arrive aux autres sens, dou il est evident qu'il

faut que ce soit la choroïde, puis qu'elle touche la retine, et qu'elle est d'une couleur obscure; elle en plus propre a etre ebranlée par les impressions de la lumiere que si elle etoit blanche et transparente. étoit aussi un des arguments de Monsr. Mariotte contre l'usage de la retine, ou il disoit qu'il n'etoit pas vraysemblable que les differentes modifications de la lumiere puissent faire aucune impression sensible sur la retine a cause de la transparence.

j'ay dis aussi qu'il etoit necessaire qu'il y eut dans l'oeil une partie qui put recevoir facilement toutes les differentes impressions de la lumiere pour les transmettre ensuitte au principal organe, et les luy rendre sensible par une modification propre a cet effet, et cette partie est la choroïde. ainsi la retine ne sera point touchée par la lumiere comme il est necessaire pour avoir le sentiment des objets car elle n'en recevra pas les impressions de la choroïde et par consequent il y aura un defaut de vision a l'endroit de la retine a laquelle

soutenüe par la choroide.

La nature agit de la meme maniere dans le fons de l'oüie, et c'est ce qui me sert de preuve pour la proposition que j'avance icy. Car la lame spirale est propre par sa nature et par la disposition à recevoir les ébranlements differens de l'air qu'elle communique aux ramifications du nerf auditif qui luy sont jointes.

Il arrive aussi la meme chose dans les autres sens, comme a observé monsieur de Verney dans la page 96. de l'organe de l'oüie, où les nerfs sont d'une nature trop tendre et trop delicate pour avoir a nud a l'action des corps exterieurs: C'est pourquoy il faut que les membranes qui recouvrent les nerfs, et qui sont comme un [illegible] moyen, reçoivent des impressions propres et particulieres pour les communiquer aux nerfs avec la disposition qui convient a la [illegible]

Dissertation

sur les differens accidens

de la vüe.

Seconde Partie.

1.

Distribution de cette seconde partie.

Après avoir Examiné dans la premiere partie de ce traité tout ce qui peut arriver a la vüe suivant les differentes Conformations de l'œil, il ne me reste plus icy qua refuter quelques opinions Communement receües sur la maniere dont se fait la vision; et a donner des reygles certains pour Connoitre la disposition des yeux, et mesurer exactement leur force ou leur foiblesse dans tous les changemens qui leur peuvent arriver tant a egard de ceux nées dans des temps differens que par rapport aux autres, ce qui n'avoit pas été fait jusqu'a present. C'est de cette mesure que je me sers pour faire voir quel n'arrive aucun changement a la Conformation de l'œil, pour

voir distinctement quelle maniere, distinctement des objets proches et éloignés ; ce qui en contraire au sentiment de ceux qui ont traité de l'optique et je demontre enfin qu'il n'est pas necessaire qu'il luy arrive les changemens qu'on a voit supposa pour voir des objets a differentes distances.

11. Explication de ce qui a donné lieu aux suppositions de la maniere dont se fait la vision.

Ceux qui connoissent la structure de l'œil, et la nature de toutes les parties qui le composent, auront de la peine a se persuader qu'il puisse luy arriver les changemens qu'on a été obligé de supposer pour rendre raison de la maniere dont se fait la vision, car aussi ce qui pourroit leur faire croire que ceux qui ont ecrit de l'optique n'ont eu en vüe que de donner un systeme qui put expliquer les apparences sans se mettre en peine si leurs suppositions convenoient en toutes choses avec la nature. Cependant la maniere dont ils [illegible] ont expliqué la vision avec la construction de l'œil artificiel dont ils se sont servis dans leurs demonstrations ont si fort [illegible] le monde en leur faveur, qu'il ne semble [illegible] plus guere de doute dans une chose [illegible] qu'ils ont avancé, on effa-

il ny avoit qui parvint plus convaincant pour
pour expliquer les differents effets de la vüe, que
de faire la comparaison des humeurs de l'œil avec
des verres convexes, puisque personne ne doute
que les rayons de lumiere ne reçoivent pas
d'autres alterations dans ces humeurs que dans
les verres. on a donc cru que tout ce qu'on
remarquoit dans l'œil artificiel devoit de même
dans l'œil sans faire aucune attention aux
mouvemens naturels des parties auxquels on en
a substitué d'autres qui sont connus et familiers
dans l'usage des lunettes d'approche, et qui
conviennent aussi a l'œil artificiel, on savoit
que dans la lunette d'approche et dans l'œil
artificiel, la peinture des objets proches se
faisoit plus loin du verre que celle des objets
éloignés, et pour quoy comme on jugeoit que
cette retine la même chose dans l'œil, on
croioit aussi qu'il falloit que la retine qu'on
representée par la surface sur laquelle se fait
la peinture dans l'œil artificiel, fût [illegible]
d'autant plus des humeurs de l'œil [illegible]
objets en étoient plus proches [illegible]

ne pouvant pas s'eloigner des humeurs de l'oeil il a fallu necessairement supposer que les humeurs s'allongeoient pour faire le meme effet, ou bien que le Crystallin qui en celle des trois humeurs - qui fait la plus grande refraction put changer de Conformation a l'aspect des objets differemment eloignez.

III. Deux opinions communes sur la vision.

Il y a donc deux opinions differentes sur le changement qu'on a cru qu'il devoit arriver a l'oeil. pour voir distinctement des objets placez a differentes distances, la premiere est l'allongement de tout le globe de l'oeil pour voir des objets proches, et l'applatissement pour voir ceux qui sont eloignez. la seconde est le changement de figure du Crystallin, qui doit applatir pour voir des objets eloignez et renfler pour voir ceux qui sont proches.

IV. Refutation de la 1.e opinion.

Il n'y a personne de ceux qui soutiennent la premiere de ces deux opinions, qui ayt avancé que la Cornée changeoit de figure, de quelque la pouvoir rendre ou moins ou plus convexe quand on veut voir des objets plus ou moins eloignez car elle est d'une nature qui ne luy -

permet pas ces changemens, et on ny remarque
point d'organes propres en effet. mais si la Cornée
ne peut pas changer de figure il ny a pas de
raison pourquoy la membrane Sclerotique
qui renferme toutes les humeurs de l'œil ne
pourroit changer, puisquelle est fort dure et
que les muscles qui l'environnent, et qui fer=
vent aux differens mouvemens de l'œil ne scau=
roient faire en effet.

Ceux qui tiennent le party du Cristallin V.
refutation de la 2e opinion.
donnent une raison qui paroit fort sensible
car ils disent que le ligament Ciliaire qui tient
le Cristallin suspendu entre les deux autres hu=
meurs est un veritable muscle. dont les fibres
tendent vers le centre du Cristallin, et qui
doit l'applatir quand le muscle se gonfle
puisqu'il le tire également par toute la
circonference. mais les plus habiles Anatomist
ne trouvent point rien de musculeux dans ce
ligament, et il ne semble pas que cette humeur
qui est assez solide et qui est [illegible]
de plusieurs pellicules les unes sur les autres

puissent facilement changer de figure sans que les superficies fassent des plis qui corrompent les images des objets sur le fond de l'œil.

Mais sans m'arrester à combattre ces opinions par la structure des parties je rapporteray seulement les experiences suivantes qui feront voir clairement qu'elles ne peuvent pas le soutenir.

VI. Experiences qui servent à refuter ces opinions.

On enseigne communement dans l'optique que si l'on regarde une chandelle ou un autre corps lumineux au travers de plusieurs petits trous faits dans une carte, on verra l'objet autant de fois multiplié qu'il y aura de petits trous, pourveu que la distance entre ces trous ne soit pas plus grande que l'ouverture de la prunelle. mais si l'objet est seulement à la distance de la veüe ou elle le peut voir distinctement on verra l'objet simple quoyqu'on le regarde au travers de plusieurs trous. il faut donc que l'objet soit hors de la portée de la veüe, par exemple pour les myopes qui ne pourroient bien

discerner les objets, fils nétoient a six pouces
de lail, il faudra, que lobjet soit plus eloigner
que six pouces, de meme si lail ne peut voir
distinctement un objet qua six pieds ou plus de
distance, il faudra, quil soit plus proche pour
paroitre multiplié.

Il est facile de donner la raison de cette
multiplication, car si les rayons qui partent de
chaque point de lobjet, vont se reunir exactement
sur la retine, chacun en un point, on verra toujours
lobjet simple, quoyquon le voye au travers de
plusieurs trous, puis que chaque point, ne peindra
quun point sur le fond de lail; car les petits cones
lumineux qui ont leur sommet dans le point de
lobjet, et leurs bases aux petits trous de la corne,
auront aussi tous leurs sommets opposez dans un
meme point sur la retine, ce qui doit faire
lobjet simple. mais si lail na pas la conformation
neccessaire, pour reunir les rayons sur la
retine, il arrivera que chacun des petits cones
au dedans de lail sera coupé par la retine
avant ou apres la reunion des rayons dans

point de l'objet touchera donc le fond de l'œil,
en autant de points différens qu'il y aura de
trous à la carte,, et par conséquent l'objet paroitra
multiplié selon le nombre des trous: il arrivera
aussi que chacun de ces objets multipliés paroitra
bien plus distinct que s'il doit vus sans interposition
de la carte, à cause que les cones des rayons au
dedans de l'œil, ayant alors pour base toute ou-
verture de la prunelle, feront une section sur le
fond de l'œil qui sera plus grande que celle
des cones qui n'auroient pour base que les trous de
la carte, ce qui feroit beaucoup plus de confusion
dans la peinture de l'objet. mais aussi chaque
objet multiplié par les petits trous paroitra
d'une lumière bien plus foible que celuy qu'on
verroit sans les trous, a cause que chacun de
ces objets ne sera formé que par une petite
partie des rayons de lumière.

Il est aussi évident que la distance
entre l'objet multiplié, sera d'autant plus grande
que les trous seront plus éloignés l'un de l'autre
ou que la réunion des rayons sera plus éloigné

du fond de l'œil ; car si les rayons sont fort éloignés l'un de l'autre leurs cones seront aussi plus écartés et semblablement leur rencontre sur la retine, de même si la reunion des rayons en fait le centre de la retine, la distance entre la rencontre des cones sur la retine sera aussi fort grande, car ces distances seront les bases des triangles qui auront leur sommet commun au point de reunion des rayons soit au deçà soit au delà de la retine.

ON pourra remarquer dans l'œil artificiel tout ce que je viens de dire en mettant une carté percée de trous au devant du verre qui représente la cornée, et en placant la surface blanche qui fait l'office de la retine dans plusieurs distances differentes du verre qui fait le cristallin soit dans le foyer des rayons lumineux soit plus proche ou plus loin,

Si l'on avoit trouvé qu'un peu trop convexe ou trop plat pour faire converger sur la retine les rayons d'un objet placé a deux pieds de distance de l'œil, il ne pourroit juger assurement

si cet objet luy paroit confus, a cauze que la
reunoitre des cones des rayons de cet objet confus
auec la retine, il occupe vn trop petite espace
pour causer dans limage vne confusion apparente.
mais si lon met au deuant de l'œil vne carte percée
de deux trous seulement on s'apperceura des
defaut de l'œil, par la duplicité de l'objet,
laquelle sera tres sensible pour peu que l'œil
n'ayt pas la conformation requise pour
rassembler exactement les rayons sur la retine.

On peut faire cette experience auec exac-
titude il faut regarder vn petit point lumineux
dans vn œil obscur, comme vn petit trou dans
vne carte, qui sera au deuant dune chandelle
ou bien il faut regarder vn petit objet noir contre
vne surface blanche.

On peut donc connoitre par cette
methode si vn œil est trop plat ou trop convexe,
pour voir distinctement vn objet placé dans vne
certaine distance, mais on se seruira de la maniere
suiuante pour mesurer auec exactitude les chan-
gemens de forme qui peuuent arriuer a vne

vüe en differens tems, et pour Savoir Sil en possible quil luy en arrive quelquún en differens rencontres.

VII. manière de mesurer la force ou la foiblesse de la vüe

je Suppose maintenant quún ait un trop plat ou trop convexe pour voir distinctement un objet, a une distance determinée comme de Six pieds; et je veux connoitre quelle est la quantité de Son defaut; cést a dire ce quil luy manque pour voir cet objet distinctement. il est certain que parceque je viens dexpliquer que cet oeil verra l'objet double au travers des deux trous d'une carte, qui Sera placée contre laid, mais Si laid et l'objet demeurant tous deux dans la meme distance; on met encore la carte ou vers laid, ou vers l'objet, on verre convexe ou concave de telle force que l'objet quil voyoit double auparavant, ne paroisse plus que Simple; on Sera assuré que ce verre est la mesure de ce qui manque a cet oeil pour voir distinctement un objet placé a Six pieds de distance.

ON ne doit pas dire que cette experience Soit defectueuse a cause que le meme verre

peut servir a voir distinctement le meme objet
placé a quelque distance que ce soit au dela
de six pieds ; car il arrive la meme chose a
toutes les vues qui voyent nettement les objets
à cette distance sans le secours de verre, ce qui
vient seulement de ce que les rayons qui viennent
des points de l'objet forment des cones si aigus
a la distance de six pieds et au dela n'ayant pour
base que l'ouverture de la prunelle qui en donne
ligne droite entr'eux, qu'ils peuvent passer pour
paralleles entr'eux et qu'ils doivent avoir le
meme foyer.

On peut donc connoitre exactement par
la le rapport d'une vue a une autre puisque
leur difference sera mesurée par la difference
des foyers des verres dont ils seront obligés de
se servir pour voir un objet eloigné de six pieds,
qui en a peu près la distance la plus courte, d'ou
les rayons entrent dans l'œil, comme paralleles
entr'eux. s'il y en avoit par exemple avoir besoin
d'un verre convexe d'un pied de foyer pour
voir les objets simples au travers des trous de la

carte a cette distance de six pieds, et qu'un autre ait les vit simple sans le secours du verre, a verre dun pied de foyer seroit la mesure de la difference de ces deux yeux pour voir des objets eloignez de six pieds au plus. mais si lautre avil avoit besoin dun verre Concave de quinze pouces de foyer, on diroit quil n'y auroit que trois pouces de difference entre la force de ces deux yeux par rapport aux foyers des verres. enfin si le meme avil avoit besoin dun verre Concave de dix pouces de foyer pour voir le meme objet, la difference entre ces deux yeux seroit mesuré par douze pouces ou un pieds de foiblesse a dix pouces de force, ce que je viens de dire pour la comparaison des deux yeux differens le peut dire aussi pour celle du meme avil dans des temps et dans des ages differens. car si un avil a l'age de 50 ans a besoin dun verre Concave de 15 pouces de foyer, a quá l'age de 60 ans il aura besoin dun verre de 10 pouces on peut dire que la vüe a diminué de 5 pouces

de meme si vn œil a besoin dun verre concaue
de 4 pouces de foyer a laage de 20 ans et
quá laage de 40 ans il en aya besoin dun
autre de 10 pour la meme experience on sera
assuré que cet œil se sera affoiblis de 2. pouces.
ce sera la meme. pour des temps differens comme
deuant et apres vne maladie. il en fort rare quúne
vüe deuienne presbyte, apres auoir été myope,
ou au contraire de myope deuienne presbyte
mais quand elle se reconnoit-roit, on pourroit le
reconnoitre par ce moyen, et mesurer auec exac-
itude le changement qui luy seroit arriué.

On pourroit aussi reconnoitre les differens
changemens qui seroient arriuez a vne vüe
sans le secours de verres, en mesurant seulement
la distance depuis lobjet jusqua-lœil ou lon
commenceroit a le voir simple au trauers des trous
de la carte mais cette methode ne seroit bonne
que pour quelques vües: car pour les presbytes
qui ne voyent pas les objets simples a
six pieds de distance ils ne pourroient pas

nus voier Combien lueil viii diminuoit dans la
fuite, puis quils verroient toujours les objets dou=
bles a quelque distance que ce fut.

Cest auffi par le meme moyen quon peut
jauoir si un oeil est presbyte ou myope par rapport
a une certaine distance de laid a lobjet, cest
adire si le concours des rayons de cet objet
se fait au deca ou au dela de la retine; car si
lon couure lun des trous de la carte et quun des
deux objets simble disparoitre du meme coté que
letrou qui on couure, on en assuré que le concours
des rayons est dans laid, au deça de la retine, mais
au contraire si lobjet disparoit de laitre coté
que le trou on couure, on connoit que le concours
des rayons est au dela de la retine, quoyque le
trou quon couure paroisse toujours du meme coté
ou il on en effet, par exemple si lon couure le trou
qui est a droite et que lobjet qui paroit
aussi a droite disparoisse, le concours des rayons sera
auant la rencontre de la retine et qui fait laid
myope; mais le trou quon couure etant a droite
toujours a droite, si lobjet qui disparoit est a gauche,
le concours des rayons ne doit etre quau dela de la
retine, et qui fait laid presbyte.

VIII.
Determiner la forme des verres pour l'usage de chaque vüe.

Il est facile de voir qu'un a'il de quelque conformation qu'il soit peut faire toutes les experiences des autres yeux par le moyen des verres de differentes convexités et concavités sans être obligé de les rapporter a d'autre pour faire une juste comparaison des differentes sortes de vüës. cette methode peut encore servir a determiner assurement, qu'elle doit être la convexité ou la concavité du verre dont une vüe doit se servir pour voir distinctement un objet sans forcer la nature, j'entens a une distance mediocre comme d'un pied et demy pour y lire de petits caracteres, car si l'on prend un verre plus fort qu'il n'est necessaire pour cet effet, on sera obligé d'approcher l'ecriture plus près de l'a'il pour la voir distinctement.

On connoitra aussi par la, si le deffaut de la vüe vient de la conformation de l'a'il ou d'une de ses parties, par exemple si la retine d'un a'il n'est pas fort delicate et que l'ouverture de la prunelle soit fort petite, il en certain, comme je l'ay remarqué dans la premiere partie de ce traité, que cet a'il ne verra les objets que confusement dans un grand eloignement quoyque d'ailleurs il soit bien conforme pour en faire convenir les rayons sur la retine dans la distance ou les objets

IX.
demonstration de l'impossibilité du changement de conformation de l'œil ou du cristallin.

Voyons maintenant s'il se peut faire que le globe de l'œil ou le cristallin change de conformation pour voir distinctement des objets différemment éloignés. ceux qui sont de cette opinion demeurent d'accord qu'il faut des conformations différentes pour voir un objet qui soit éloigné d'un pied et demy, et un qui soit éloigné de six pieds. ainsi l'œil qui s'attentif à considérer un objet éloigné d'un pied et demy, s'il a la conformation nécessaire pour le voir distinctement il n'aura pas celle qu'il faut pour en voir un à six pieds. mais s'il a la conformation nécessaire pour voir l'objet à un pied et demy de distance, on en sera assuré en mettant au devant de l'œil une carte percée de deux trous. cet objet paroitra toujours simple. maintenant que ce même œil s'applique à considérer un objet à six pieds de distance et comme il y est attentif et qu'il doit avoir pris la conformation qui le fait voir à cette distance, qu'il regarde autravers des trous de la carte, il doit le voir simple dans cette apparence, comme il le voyoit à un pied et demy, cependant l'expérience montre le contraire. car il le voit double. cet œil n'a donc pas pris la conformation qu'il faut pour

pour voir cet objet a six pieds de distance
quoyquil l'ait pour un pied et demi. et il ne la
pas pour six pieds, il ne la pas pour tout autre
distance au dessus; les rayons qui entrent dans laid
etant comme parralleles entreux dans ces distances.

Mais changeons d'experience et appliquons a
cet oeil qui ne peut pas prendre la conformation
neccessaire pour voir un objet a six pieds, un verre
qui puisse luy donner ce qui luy manque, comme quil
voye distinctement l'objet simple au travers des trous —
de la carte. il en certain qu'il considere cet objet avec le
verre sans l'interposition de la carte quil le verra
bien plus distinctement quil ne le voyoit alors
simple quoyquil n'ait luy avoit donné la confor=
mation propre pour cet effet En observant de
mettre toujours le verre a meme distance de l'oeil
dans toutes les experiences, car autrement l'ouverture
de la prunelle demeurant toujours la meme, les rayons
qui entrevoient dans l'oeil apres avoir passé au travers
des verres placez a differentes distances feroient plus ou
moins convergens ou divergens. mais quenfin cet
oeil regarde avec le meme verre l'objet a un pied de
distance, et qu'il change la Conformation
pour le voir distinctement, et quand il y sera attentif

s'il interpose la carte en laissant toujours le verre elle luy fera connoître qu'il voit l'objet double.

La meme chose arrivera encore si l'œil qui considere a nud un objet a six pieds, et qui le voit simple au travers des trous de la carte vient ensuite a considerer celuy qui n'en qua un pied et demy, car il le verra double. et s'il prend un verre pour voir cet objet simple a un pied et demy, il le verra double a six pieds avec le meme verre.

Ce que je dis de six pieds et d'un pied et demy sera de meme des autres distances ou plus petites ou plus grandes. on ne peut pas dire que l'interposition de la carte apporte du changement a cette experience puis que tout ce qui pourroit determiner l'œil a quelque changement ne pourroit venir que du manque de connoissance de la distance dont on juge toujours de meme, soit qu'on regarde l'objet a la vue simple ou au travers d'un ou de plusieurs petits trous, il n'en donc pas vray que l'œil ou le cristallin change de conformation pour voir des objets a differentes distances.

on ne doit pas juger de ce que j'avance icy par quelques experiences particulieres; car il se rencontrera de plus difficiles qu'elle ne

pourront pas faire celles dont je me sers, ou quelles les feront si imparfaitement qu'on aurait bien de douter de la verité, et qu'on pourroit en tirer des consequences tout a fait contraires aux loix de l'optique car si le Cristallin etoit obliquement posé par rapport a laxe de la vision, ou qu'il fut d'une figure tout a fait irreguliere, ou que la retine neut pas toute la delicatesse necessaire pour une vision distincte, ou que les humeurs fussent troubles, on feroit toujours fort mal les experiences que je propose. mais il sera facile de reconnoitre le deffaut de ces yeux, et ce qui fait que les Experiences communes ne leur reussissent pas, celles examinant suivant les remarques que j'ay faites dans la premiere partie de cet traité.

On doit prendre garde dans les experiences qu'on fait avec des verres comme sont ceux des lunettes ordinaires, de ne se servir pas de differents endroits d'un meme verre pour regarder un meme objet au travers des deux dela cote, et sans l'inclination dela dite cote, car les bottes de verre sont ordinairement de refractions tres differentes en differents endroits dou l'on ne pourroit tirer de consequence qui fut juste

Apres avoir demontré que l'air ne change pas de conformation, pour voir des objets differemment eloignez il faut faire voir qu'il ne pas besoin de ce changement

dans

X qu'il ne falloit rien supposer de changement de conformation dans l'air.

et q'il peut voir un objet a un pied et demy et a six pieds ou au dessus assez distinctement, pour ne pas s'apperceuoir qu'il ny ayt aucun deffaut dans la vision, sans qu'il soit besoin de recourir a un changement de conformation. je parle seulement dacree car dune vüe bonne comme je l'ay etablie. laquelle tient le milieu entre les myopes et les presbytes; car pour eux ~~qui~~ il on jugera par comparaison a l'autre.

la difference des conceurs des rayons dun objet eloigné dun pied et demy, et dún autre eloigné de six pieds nest pas assez considerable pour faire de la confusion dans la vision, quoyquon puisse voir l'objet double avec les trous de la carte. mais dans la supposition de laid que je fais icy, il doit voir l'objet double avec les deux trous de la carte a la distance d'un pied et demy ayant le conceurs des rayons et a la distance de six pieds apres leur conceurs. Comme pourquoy cette difference est si petite quon ne peut pas s'en apercevoir a la vüe simple et c'est ce qui fait quon croit voir egalement bien les objets a ces distances. on en peut faire l'experience avec une petite lunette composée de deux verres convexes dont l'objectif soit dun pouce de foyer qui est a peu pres le diametre de l'aid, et ne leur donnez d'ouverture qu'une ligne, comme [illegible]

prandle, l'ocilaire doit etre plus foible que
l'objectif, et ne luy donner que peu d'ouverture
puis qu'il ne doit servir icy qua detourner les
rayons comme il faut pour entrer dans l'œil.
et pour faire leur peinture sur la retine.
on verra avec cette petite lunette les objets a
vn pied et demy de distance aussi distinctement
que ceux qui seront a six pieds, sans qu'il soit
besoin d'allonger et de racourcir la distance entre
les deux verres.

mais on m'objectera que s'il n'etoit pas-
necessaire de donner a l'œil vne conformation
differente a vn pied et demy de distance, et vne
autre a six pieds doù vient donc qu'apres avoir
été attentifs a considerer vn objet a vn pied et
demy, on ne peut voir distinctement celuy qui
est a six pieds; quoyqu'ils paroissent le toucher,
et qu'ils soient a peu prés dans le meme rayon
sans demeurer vn peu de temps a accommoder l'œil
a cette distance, je reponds qu'il est vray qu'on sent
de la difficulté, mais que ce n'est pas a cause que le
globe de l'œil ou le Cristallin doit prendre differentes

Conformations pour voir les deux objets ; mais
qu'elle vient seulement de ce que la direction
des axes des deux yeux doit être différente pour un
objet éloigné d'un pied et demy, et pour un autre
éloigné de six, afin que les rayons lumineux
qui entrent dans chaque œil fassent leurs peintures
sur des points analogues de la retine. on me
dira que cette reponse n'est pas suffisante
puisque l'œil est toujours la même de figure
quelques regarde les objets a différentes
distances quand un seul œil. je reponds encore :
qu'il est vray ; mais que cette difficulté n'est
pas si grande quand on ne se sert que d'un œil
que quand on se sert des deux, et que ce qui la
fait naître en partie que l'accoutumance que
l'on a de diriger les axes des deux yeux tout
ensemble vers un même endroit, donne on peut
connoître d'ailleurs a peu près la distance. on ne
peut donc pas dire dans l'expérience des trois
de la carte que le changement de conformation
de l'œil le fait presque en un moment comme
quelque uns ont voulu soutenir, puisqu'ils sont

obligea dans celle cy d'auvrir que l'oeil demande un temps considerable pour s'accommoder a differentes distances.

Lors qu'on regarde dans la petite lunette dont je viens de parler, des objets proches a un pied d'eloignement et d'autres plus eloignez on ne sent point de difficulté pour passer des uns aux autres. Car comme on ne regarde qu'avec un seul oeil et que l'on n'a presque aucune connoissance de la distance de ces objets, on les voit tous comme s'ils etoient peints sur une meme superficie.

XI. Differentes causes de la membrane qui supplient a l'imperfection de l'oeil.

J'ai dit enfin que la difficulté que l'on a d'accommoder l'oeil pour voir des objets a differentes distances, n'est pas seulement la direction des axes, mais que c'est un resserrement et un elargissement de la prunelle. Car personne ne conteste que la membrane iris ne soit un muscle, et qu'elle se retrecit et s'elargit aisement a l'aspect des objets qui sont plus ou moins eclairez. or il est certain qu'il entre dans l'oeil plus de rayons d'un meme point de l'objet a proportion qu'il en est plus proche supposant toujours la meme ouverture de prunelle et que ces rayons ainsi assemblez sur la retine y doivent faire une impression bien plus vive que s'ils venoient d'un point

eloigner, et quils doivent y causer vn peu de doubeur,
ce qui obligea la membrane iris a le resserrer pour
fermer louuerture dela prunelle, et pour moderer
la viuacité dela peinture de lobjet; au contraire
si lobjet que laid considere est eloigné, il doit
entrer dans laid peu de rayons de chacun de
les pointz donc la retine nest touchée que
foiblement. il faü donc alors tous les efforts pour
donner entrée a vne plus grande quantité de
rayons. en elargissant louuerture dela
prunelle, pour appercevoir lobjet plus distinctement.
on en peut faire lexperience dans les enfans
qui ont vne grande facilité a ouurir et a
fermer la prunelle, et leur montrer quelque
petit objet en leur faisant tourner le dos a
la lumiere, afin quelle laisse toute la liberté
a la prunelle de se pouuoir ouurir et fermer
car on remarquera que lors que lobjet sera
proche de laid, louuerture dela prunelle
sera fort petite, au contraire elle sera
fort grande quand lobjet sera eloigné.

Ces differentes ouuertures dela prunelle

servent encore beaucoup a la distinction des objets
differemment eloignés ; sans qu'il soit besoin
de recourir aux differentes conformations de
l'oeil, car il est evident que si les cones des
rayons qui entrent dans l'oeil sont fort aigus,
la peinture des objets sera toujours distincte,
puisque la rencontre de chacun de ces cones
sur la retine, ne peut etre considerée que comme
un point, et si l'oeil a la conformation neces-
saire pour voir distinctement un objet a six pieds
de distance, d'ou les cones des rayons sont fort
aigus, quand il regardera ensuite un objet a
un pied et demy, il resserrera la prunelle pour
ne laisser entrer dans l'oeil que peu de rayons
qui feront aussi a cette distance des cones assez
aigus pour ne point faire de confusion
sensible sur la retine. ainsi les effets qu'on
attribue aux differentes conformations de
l'oeil ; doivent etre rapportés aux differentes
ouvertures de la prunelle qui a toujours une
action assez considerable dans les yeux qui
sont naturellement grands ou petits

pour pouvoir moderer un peu l'action de la lumiere, et pour faire voir par meme moyen ceux qui sont doüez avec assez de force, et ceux qui sont proches avec assez de netteté pour les usages ordinaires de la vie; en sorte que toute la latitude que l'on remarque dans toutes sortes d'yeux vient seulement des differentes ouvertures de la prunelle, et non pas des differentes conformations du globe de l'œil, ou du crystallin, comme on avoit crû jusqu'à present.

Fin.

Si la 1re fille a 1 an de plus que la 2e
2x — 6 pour la 1re fille
4x — 12 — 6
8x — 24 — 12 — 6
8x = 42 — 24
8x = 18
x = 18/8 = 9/4 = 2 1/4 ans

Cette proposition ne vaut pas 6 francs
2x + 6
Je vais expliquer le problème il ne faut pas dire
cette puisque

Monsieur
Marchal d'Aimely
Inspecteur Général des Domaines
et Bois Rue des Toffes
Monmartin à Paris
A Paris